I المستقيم

DÉFINITION

بعض المستقيم

ترمز إلى المستقيم بـ:

- حرف بين قوسين $(C), (P), (A)$ .....
- الرمز دالتا (Δ).
- $(D_1), (D_2), (D_3)$ عندما يكون عدة مستقيمات.

DÉFINITION

المقاطعة

نقول عن نقطة أنّ المقاطعة إذا كانت تنتمي إلى نفس المستقيم.

EXEMPLES

- النقطة B و C و A على استقامة واحدة لأنها تنتمي إلى المستقيم (D).
- النقطة B و M و A ليست على استقامة واحدة لأن M لا تنتمي إلى (D).



المستقيم هو خط مستقيم ليس له بداية ولا نهاية.	
تصف المستقيم هو خط مستقيم يكون محدود من جهة واحدة فقط.	
قطعة المستقيم هو خط مستقيم محدود من طرفيه بحيث يمكن قياس طوله.	

1 الأوضاع النسبية لمستقيم

DÉFINITION

مستقيمان يكونان إما متقاطعان أو متوازيان.

كلّ (Y) و(X) مستقيمان متقاطعان

متقاطعان غير متعامدان المستقيمان المتقاطعان هما مستقيمان اثنان يشتركان في نقطة واحدة تسمى نقطة التقاطع.	 M هي نقطة تقاطع (Y) و (X)
متعامدان يكون مستقيمان متعامدان إذا كانا متقاطعين ويحدثان زاوية قائمة.	نقول أن: $(X) \perp (Y)$

كلّ (Y)و(X) مستقيمان متوازيان

المستقيمان المتوازيان هما مستقيمان غير متقاطعان. **خاصية المستقيمات المتعامدة** هما أيضا مستقيمان متوازيان	 نقول أن (X) يوازي (Y) ونكتب: $(X) \parallel (Y)$

A RETENIR

إذا كان مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فإن هذه المستقيمات متوازيان.

2 إنشاء مستقيم يشمل نقطة معلومة ويعامد مستقيم معلوم

MÉTHODE

يمكننا أن نستخدم الكوس أو المدور

- باستعمال الكوس

لتكن (X) مستقيم و A نقطة لا تنتمي إليه.	
نضع الكوس على المستقيم بحيث يشكل زاوية قائمة ونرسم من A.	
نرسم المستقيم الذي يشمل النقطة A باستعمال الكوس.	
نحصل على المستقيم (AB) الذي يعامد (X) في النقطة B. نقول AB هو المسافة بين A والمستقيم (X).	

- باستعمال المدور

نشئ القوس الأصغر من الدائرة التي مركزها A وتقطع المستقيم(X) في النقطتين B و C.	
نشئ القوس الأكبر من الدائرة التي مركزها النقطة B.	
نشئ القوس الأزرق من الدائرة التي مركزها C وتقبل قيمة المدور نفسها والتي يقطع القوس الأخضر في نقطة نسميها M.	
نصل بين النقطتين A و M ونسمي المستقيم(Y) فنحصل على: $(Y) \perp (X)$	

المستقيمين العموديين على نفس المستقيم

لقد تأكدنا سابقا أن المستقيمين العموديين على نفس المستقيم متوازيين، لدينا:

$(D_1) \perp (D_3)$

$(D_2) \perp (D_3)$

إذن $(D_1) \parallel (D_2)$

ملاحظة يمكن إنشاء مستقيمان متوازيان باتباع هذه الخاصية، وذلك بإستعمال الكوس



3 كيفية الإنشاء: سنستهل بإنشاء مستقيم يشمل نقطة معلومة و يوازي مستقيم معلوم باستعمال المدور

لتكن (X) مستقيم و A نقطة لا تنتمي إليه	
أولا نشئ قوس من الدائرة التي مركزها A بحيث يقطع المستقيم (X) في النقطة B	
نشئ قوسين الدائرة التي مركزها B بنفس قيمة المدور بحيث يقطع المستقيم(X) في النقطة C.	
نشئ قوس من الدائرة التي مركزها C بنفس قيمة المدور التي يقطع الدائرة التي مركزها A في نقطة نسميها M	
نصل بين النقطتين M و A فنحصل على المستقيم(Y) الذي يوازي (X) و يمر من النقطة A و نكتب: $(X) \parallel (Y)$	

II المضلعات الخاصة

1 المثلثات

أنواع المثلثات

المثلث القائم المثلث الذي هو أحد مثلثاته الثلاثة زاوية قائمة. الوتر هو أطول ضلع في المثلث القائم. $BC>AC$ و $BC>AB$	
المثلث متساوي الساقين المثلث الذي يكون له ضلعان لهما نفس الطول. B هو رأس الأساسي. و AC و AB	$AB = AC$
المثلث المتقايس الأضلاع هو المثلث الذي أضلاعه متساوية أي لهم نفس الطول. $AB = AC = BC$ كل رأس يمثل رأسا لمثلث كل ضلع يمثل قاعدة	

2 الرباعيات

تميز بين شبه المنحرف ومتوازي الأضلاع

شبه المنحرف شبه المنحرف هو رباعي له ضلعان متقابلان متوازيان. والضلعان الآخران متبقايسا غير متوازيان. $[AB]$ و $[DC]$ هما القاعدتان. $[AD]$ و $[BC]$ هما الضلعان المتقابلان.	
متوازي الأضلاع هو رباعي فيه كل ضلعان متقابلان متماثلا متوازيان. $AB = DC$ $AD = BC$	

3 أشباه المنحرف الخاصة

يوجد نوعين هما

شبه منحرف قائم شبه المنحرف القائم هو شبه منحرف حيث أحد زاويتيه قائمتين. $\widehat{BAD} = \widehat{ABC} = 90°$ $(AB) \perp (AD)$ $(AB) \perp (CB)$	
شبه منحرف متساوي الساقين هو شبه منحرف زاويتاه المتقابلتان لهما نفس القيس. $(AD) \parallel (CB)$ و $AB = CD$ $\widehat{ABC} = \widehat{BCD}$ $\widehat{CDA} = \widehat{BAD}$	

4 متوازيات الأضلاع الخاصة

المستطيل المستطيل هو متوازي أضلاع له زاوية قائمة. نستنتج أن: $AB = CD$ $BC = DA$ $\widehat{DAB} = \widehat{ABC} = \widehat{BCD} = \widehat{CDA} = 90°$	
المربع المربع هو متوازي أضلاع له زاوية قائمة وضلعان متتاليان متقايسان. نستنتج أن: $AB = BC = CD = DA$ و: $\widehat{DAB} = \widehat{ABC} = \widehat{BCD} = \widehat{CDA} = 90°$	
المعين المعين هو متوازي أضلاع له ضلعان متتاليان متقايسان. نستنتج أن: $AB = BC = CD = DA$ $AC \perp BD$	