العلاقات الغذائية بين عناصر الوسط الحي

تمهيد: تتنوع الكائنات الحية ضمن الوسط الحي بفضل العدد الحيوي الجغرافي، إلى جانب ذلك فهي تتواجد في توازن من حيث العدد رغم تفاوتها باستمرار.

- فما الذي يتدخل في تنظيم عدد الكائنات الحية بحيث يجعلها في توازن مستمر؟

توضح الوثيقة (1) العلاقة بين الكائنات الحية في وسط بحري.



الوثيقة(1): سلسلة غذائية بحرية

نلاحظ أن سمك الرنكة يتغذى على سمك الطوبة وهذا الأخير يتغذى على سمك الشبوط أو السردين والشبوط يتغذى على السردين الذي يتغذى على القشريات وهذا السردين يتغذى على العوالق النباتية وبذورها، على العوالق النباتية والحيوانية.

إن ترتيبا هذه الأسماك فيما بينها يمثلها علاقات تغذية حيث أن وجود أحداها مشروط بوجود الأخر وهذا ما يعرف بالسلسلة الغذائية التي تتكون من حلقات تربط المنتج الأول بعدي المستهلك بالمفترس الأعلى عبر طرق التركيب الغذائي وهي العلاقة التي تتشابك بالمفترس الأعلى عبر المستهلك الثاني (السردين) عبر المستهلك الثالث سمك الشبوط أو الطوبة وأخيرا المستهلك الرابع والأخير سمك الرنكة.

يمكن تمثيل السلسلة الغذائية وفق مخطط شكلي بالتالي:

عوالق نباتية ← سردين ← شبوط ← طوبة ← رنكة

حيث يعني اتجاه السهم : يؤول من طرف...

ما دامت الكائنات الحية في السلسلة الغذائية تأكل بعضها فكيف يمكن تفسير ثبات عددها ونوعها في كل حلقة؟

- من الناحية العددية: يمكن التصريح بوجود عدد أكبر من سمك الشبوط في حلقة الشبوط من العدد الموجود في حلقة السردين، لأن السردين يتغذى على بذور وعدد أكبر من عدد الضربان، وهو عدد المعقول أن يجد عددا كبيرا من أسماك القرش مقابل عدد قليل من سمك الطوبة أو الشبوط.

- من عدد الأفراد: في كل حلقة يكون الأول أكثر عددا من عدد أفراد الحلقة السابقة له، وأقلها تتغذى عليها.

- من ناحية الحجم : إن سمك القرش أكبر وأقوى من سمك الطوبة وهذا الأخير أكبر من سمك الشبوط والسردين وهذا الأخير أكبر من الضربان.

إن كفى تستطيع الأفراد في كل حلقة أن تتغذى على أفراد الحلقة السابقة لها عن طريق الافتراس ويمكن أن نقول أكثر عددا وأكبر حجما وأقوى منها.

يمكن تمثيل السلسلة الغذائية السابقة في شكل هرم الأعداد كما يلي:



الوثيقة(2): هرم الأعداد

إذا اعتبرنا أن مجموع الكائنات الحية في حلقة محددة ينتج كتلة بوظيفة عضوية معينة، نلاحظ أن هذه الكتلة تتناقص عبر السلسلة الغذائية انطلاقا من المنتج وصولا إلى المستهلك الثالثي، فما هي أسباب هذه الظاهرة؟

إن ما يتناوله الحيوان المستهلك من مادة غذائية يستفيد منها سوى 10% فقط والباقي يذهب في شكل فضلات إلى جانب البقايا التي يتركها للمفترس والموتى والجلد...

ومنه نصل إلى النتيجة التالية: إنتاج 1kg من سمك القرش فإنه يلزمه من غذاء مقدار 10kg من سمك الشبوط، وإن انتاج هذه الأخيرة من الطوبة يلزمها 10kg من سمك السردين أما هذا الأخير فإنه يلزمه 10kg من القشريات وهذه الأخيرة من الضربان يلزمها 10000kg من العوالق.

إن قيمتي 1 kg و 10kg من سمك القرش يلزم 10000 kg من العوالق.

ويمكن التعريف بهذا حسب قيمة الكتلة الحية المتكونة عبر السلسلة الغذائية التالية:

أوراق النبات الأخضر ← الفريسة ← القرش

- إذا كانت الكتلة المنتجة في السلسلة الغذائية هي 100 kg من أوراق النبات فما الذي يعاد هذه الكتلة المتنبهة؟



الوثيقة(3): هرم الأوزان

- إذا كانت الكتلة المنتجة هي المصدر الأول لتغذية الكتلة المستهلكة، فما الذي يعاد هذه الكتلة المتنبهة؟

تشكل الكائنات الحية التي تعيش في التربة من بكتيريا والفطريات والبكتيريات تقوم بتحليل الكائنات الحية الميتة والبقايا والفضلات التي يتراد عضوية ذات مواد معدنية متصوبة عنها النباتات الخضراء مع الماء لتركيب مادة عضوية جديدة مشكلة مخزونا في الدرنات والبذور وتشكل وتقوم بتغذي عليها المستهلكة الأول من تحلل من جديد في السلسلة الغذائية.

هل السلاسل الغذائية الموجودة في الوسط الواحد تكون معزولة عن بعضها؟

للإجابة عن هذا السؤال ندرس مجموعة الوثيقة (4) والتي تمثل العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية في وسط غابي:



الوثيقة(4):الشبكة الغذائية

من هذه الوثيقة يمكن استخراج السلاسل الغذائية (Chaine alimentaire) التالية:

1- ثوت بري ← أرنب بري ← صقر

2- ثوت بري ← صقر دوري ← صقر

3- ثوت بري ← ضربان ← صقر دوري

4- حشيش ← جرادة ← ضربان ← صقر دوري

5- حشيش ← جرادة ← ضربان ← يرقة

6- حشيش ← فأر ← فأر الحقول ← صقر

7- حشيش ← أرنب ← صقر

8- حشيش ← فأر ← ثعلب

نلاحظ في هذه السلاسل الغذائية أن جيوان مستهلك مثل الدوري هو مستهلك الدرجة الثانية في السلسلة الغذائية الثانية ومستهلك من الدرجة الثالثة في السلسلة الغذائية،وهذين الأخيرين يمثلان مستهلك الدرجة الأولى.

إن السلاسل الغذائية في الوسط الواحد ليست خطية بحكم ليست معزولة عن بعضها بل متداخلة ومتشابكة.

(Réseau alimentaire) الشبكة الغذائية

النتيجة:

يعود نجاح توازن عدد الكائنات الحية في الوسط الحي أساسا إلى العلاقات الغذائية التي تربط كائنات هذا الوسط بعضها ببعض إن كل فرد ينتظر على فرد أخر يكون بدوره مصدر غذاء لكائن أخر في شكل سلسلة غذائية.

- هل العلاقات الغذائية هي العلاقة الوحيدة التي توجد بين مستهلك من مختلف الدرجات؟

الجواب: لا

المثل الصغير الذي ليست له عقل إذا وجد أنها وكلن له دماغ يتعلم في قصين مثل دماغ الإنسان بل ليس له عقول ولا يتكلمون لكن يتصل ويرى عن طريق العيون لإدراك الأخطار حيث تقرر دماغ بتصفها المثل الأخر فهم هذا يطلب منه (الوثيقة 6).

يقدم مجتمع المثل التي:

العقدة 1: عين تفتح المجتمع وعين تغمض الجوع، يكون جوهها أخر من بقية المثل.

العقدة 2: عين تغمض المجتمع وعين تفتح الجوع، تقوم بإخطار الدماغ بوجود الطعام.

العقدة 3: عين تغمض المجتمع وعين تفتح المثل الأخر فهم هذا يطلب منه (الوثيقة 6).

يقدم مجتمع المثل التي:

العقدة 4: عين تفتح المجتمع وعين تغمض الجوع، يكون جوهها أخر من بقية المثل.

العقدة 5: عين تغمض المجتمع وعين تفتح الجوع، تقوم بإخطار الدماغ بوجود الطعام.

العقدة 6: عين تغمض المجتمع وعين تفتح المثل الأخر فهم هذا يطلب منه (الوثيقة 6).



تجمع المثل داخل فرد المعدة الطرف رقيقة

الوثيقة(5)

دورة حياة النملة

المثل مثله مثل نحوه من الحشرات كالفراش والنحل ثم خلال نموها بمراحل تشكل دورة حياة كاملة.

تضع النملة بويضة صغيرة جدا وذات شوكة رقيقة ويخفف بعيث بصعب رؤيتها بالعين المجردة، من هذه البويضة تنمو يرقات كثيرة جدا لا ترجل ولا تسير عليها مثل الحشرات الكاملة، تتغذى هذه اليرقة كثيرة حتى تنمو، ثم تبدو وكأنها نمت بشكل لا تتحرك، ومن هذه الشرنقة تخرج النملة الجديدة الكاملة النمو.

تقدر النظير تختلف من نوع لأخر وفي الفصول المختلفة من السنة، فمثلا في الصيف تكون دورة حياة النملة تكتمل بعد ثلاث أو أربع أسابيع. ويمكن أن يعيش النمل لمدة عشرين سنة أو أكثر.



النمل في حالة نمو داخل وعاء زجاجي مسدود

الوثيقة(6)

النتيجة:

بالإضافة إلى العلاقات الغذائية،تربط بين أفراد النوع الواحد عدة بعض العلاقات الجماعية تعاونية تنظيم فيها كل فرد بدوره مهام الأعمال الأخرى تشكل في مجملها مجتمعا طبيعيا ويمثل النمل والنحل مثالا نموذجيا عن ذلك.

الخلاصة:

ترتبط الكائنات الحية علاقات أهمها العلاقات الغذائية والتي يمثل كل منها في شكل سلسلة غذائية تتركب من حلقات وهي:

1- الكائنات منتجة: وهي النباتات الخضراء التي تركب المادة العضوية.

2- الكائنات مستهلكة: وهي التي تتغذى على هذه المادة العضوية سواء مباشرة من النباتات فسمى مستهلكة من الدرجة الأولى، أو تتغذى على هذه الأخيرة فسمى مستهلكة من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة وهكذا...

3- الكائنات محللة: وهي التي تعمل على تحليل الكائنات بعد موتها والبقايا والفضلات وتحويلها إلى عناصرها الأولى لتستعمل النباتات وتركب منها المادة العضوية من جديد وتمثل أساسا في البكتيريا والفطريات والحشرات.

- تسير الكائنات الحية في كل منطقة بعدد لم تكن معين أي من كائنات الحلقة السابقة لها التي تتغذى عليها، فعدد يمكن تمثيلها في شكل هرم سمي هرم الأعداد.

إن فصل الكائنات المستهلكة في حلقات من السلسلة الغذائية هو إذا وجد بين نظير عليها الكتلة الحية تمثل فقط 10% من كتلة الحلقة السابقة التي تتغذى عليها.

- الشبكة الغذائية هي عبارة عن تداخل عدة سلاسل غذائية في الوسط الواحد بحيث أن الكائن المستهلك في سلسلة غذائية يمكن أن يكون حلقة في سلسلة أخرى.

- ليست العلاقات الغذائية هي الوحيدة التي تربط بين الكائنات الحية في الوسط الحي بل هناك العلاقات الاجتماعية حيث يعيش أفراد النوع الواحد لبعض الحيوانات في تجمعات معينة ولدى فيها كل فرد دوره عدة للتعاون وهذا ما يعرف بالمجتمع مثل مجتمع النمل والنحل ...

WWW.DZPEN.COM - قلم الجزائر