البشمة عند الأبقار

إشكال هضمي ناتج عن إرتفاع الحموضة بالكرش



ما هي أسباب البشمة ؟

- عليقة غنية بالأعلاف المركزة للأبقار الحلوب مرتفعة الإنتاج
- تغيير فجئي للعليقة
- عدم إنتظام إستهلاك الأعلاف الخشنة مصدر الألياف
- عدم توفر الظروف الملائمة لراحة البقرة (إكتظاظ ، غياب التهوية ...)
- حرارة الصيف، خاصة عندما تتوافق مع مرحلة بداية الإدرار لدى البقرة





ما هي أعراض البشمة ؟

- مشاكل في الإجترار
- فواضل غير مهضومة
- مشاكل في التنقل ، أظلاف طويلة
- هبوط نسبة المواد الدهنية بالحليب
- تدهور الحالة العامة للبقرة ، ضعف ، لحس الحائط و البول



كيف نتفادى إرتفاع الحموضة بالكرش ؟

- توفير من 5 إلى 10 كلغ أعلاف خشنة (قرط أو تبن) يوميا للبقرة و ذلك حسب توفر الأعلاف الخضراء
- توزيع العلف المركز على عدة وجبات في اليوم (3 – 4 في اليوم)
- التدرج في تغيير العليقة لمدة قد تصل إلى 15 يوما
- إضافة مواد معدلة للحموضة مثل بكروبونات الصودا
- عدم إعتماد فواضل الخبز في تغذية البقر الحلوب
- تفادي خلط العلف المركب بالماء
- توفير ظروف الراحة للبقرة: الفراش الجيد ، إحترام المساحة المخصصة لكل بقرة ، توفير التهوية

أكيـــــــد

ينصح عند ملاحظة بعض العوارض الإتصال بالبيطري أو المختص في التغذية الحيوانية

قلم الجزائر | WWW.DZPEN.COM

الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي