يا بكالوريا بكالوريا بكالوريا بكالوريا بكالوريا بكالوريا بكالوريا بكالوريا

BAC

ملخص بسيط في
مادة الرياضيات



إعداد : محمد عبعوب

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الإهـــــداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى روح أبي الطـــاهرة

والى أرواح موتى المسلمين الطـاهرين وكما أهديه

لطلبة النهـــــائي والمتمثل في طرق بسيطة في

فهم مادة الرياضيـــــات التي تعد من ضمن المواد

التي ينفر منها بعـــض الطلبة ولعل هذه الطرق

تساعدك على تـــذوّق مادة الريـــاضيات و أتمنى

لكم التوفيق والنجـــــــــــــــــاح في

شـــــهادة البكـــــــــــــــــالوريا

هذا الكتيب مـــــوجّه للتلميذ

ولـــــــــــــــــــيس للأستاذ

لكم مني خالص التقدير والاحترام

mohammed aboud

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الفهرس :

الدوال.....01

المتتاليات العددية.....09

الاحتمالات.....13

الأعداد المركبة.....18

الهندسة الفضائية.....21

...حقوق الطبع محفوظة...

mohammed aboub

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الـــــــــــدوال

1. الدوال الأســـــــــية :

1. عفايس نتاع النهـــــــايات:

دير في بالك هذو الصوالح نتاع النهايات صحيت

$$\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{e^x} = 0$$

$$\lim_{x\to-\infty} e^x = 0 \qquad \lim_{x\to0} \frac{e^x-1}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to-\infty} xe^x = 0$$

مثال:

$$\lim_{x\to+\infty} (e^x - x + 1) = +\infty - \infty \text{ ع.ع.ث}$$

$$\lim_{x\to+\infty} e^x\left(1 - \frac{x}{e^x} + \frac{1}{e^x}\right) = +\infty$$

لأن

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{e^x} = 0 \text{ و } \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{e^x} = 0$$

ملاحظة بيناتنا :

كي تجيك حالة عدم التعيين أخرج e^x عـــــاملا مشتركا أو أخرج x عاملا مشتركا في بعض الحالات

2. عفايس نتاع الخـــــــواص:

1) $e^0 = 1$
2) $e^{\ln x} = x$
3) $e^x = 2$ يكـــــافئ $x = \ln 2$
4) $e^x = -2$ مستحيـــل

3. الاشتقـــــــــاق:

$$f(x) = e^{5x+1}$$
$$f'(x) = 5e^{5x+1}$$
$$g(x) = 2xe^{3x+1}$$
$$g'(x) = 2e^{3x+1} + 6xe^{3x+1}$$
$$g'(x) = (2+6x)e^{3x+1}$$

2. الدوال اللوغـــــاريتمية :

1. عفايس نتاع النهـــــــايات:

دير في بالك هذو الصوالح نتاع النهايات صحيت

$$\lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\lim_{x\to0} \ln x = -\infty \qquad \lim_{x\to0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to0} x\ln x = 0$$

مثال:

$$\lim_{x\to+\infty} (\ln x - 2x - 1) = \text{ع.ع.ث}$$

$$\lim_{x\to+\infty} x\left(\frac{\ln x}{x} - 2 - \frac{1}{x}\right) = +\infty(-2) = -\infty$$

$$\lim_{x\to-2^+} \left(\frac{4}{x+2} + \ln(x+2)\right) = \text{ع.ع.ث}$$

$$\lim_{x\to-2^+} \frac{1}{x+2}(4 + (x+2)\ln(x+2)) = +\infty(4)$$
$$= +\infty$$

ملاحظة بيناتنا :

كي تجيك حالة عدم التعيين عند ∞ أخرج ماداخل ال ln عاملا مشتركا أما إذا كـــانت حالة عدم التعيين عند عدد أخرج مقلـــوب ماداخل ال ln عاملا مشتركا وتبقى ملاحظة نسبـــــــية

2. عفايس نتاع الخـــــــواص:

1) $\ln 1 = 0$
2) $\ln e^x = x$
3) $\ln x = 2$ يكـــــافئ $x = e^2$
4) $\ln x = -2$ يكـــــافئ $x = e^{-2}$

3. الاشتقـــــــــاق:

$$f(x) = \ln(5x+2)$$
$$f'(x) = \frac{5}{5x+2}$$
$$g(x) = 2x\ln x$$
$$g'(x) = 2\ln x + 2x.\frac{1}{x} = 2\ln x + 2$$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM
mohamed abou

ملاحظة خطيرة:

رد بالك ديرهم حالات عدم التعيين

$$\frac{0}{\infty} = 0 \quad . \quad \frac{\infty}{0} = \infty$$

$$\frac{A}{\infty} = 0 \quad . \quad \frac{A}{0} = \infty$$

3. لعفايس اللي لازم تعرفها :

1. إثبات $y = ax + b$ هو مستقيم مقارب مائل بجوار ∞ :

$$\lim_{x\to\infty}[f(x) - (ax + b)] = 0$$

2. الوضعية النسبية بين المستقيم والدالة:

لازمك تدرس إشارة الفرق

$f(x) - (ax + b) < 0$ (c_f) تحت (Δ)

$f(x) - (ax + b) > 0$ (c_f) فوق (Δ)

مثال: $f(x) = x - 2 + \frac{\ln x}{x}$

- اثبت أن $y = x - 2$ هو مستقيم مقارب مائل بجوار $+\infty$ .....نطبق القانون

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x) - (x - 2)]$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\left[x - 2 + \frac{\ln x}{x} - (x - 2)\right] = \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{\ln x}{x}\right] = 0$$

ومنه $y = x - 2$ هو مستقيم مقارب مائل

- ادرس الوضعية النسبية

نقوم بدراسة إشارة الفرق .....شوف معايا

$$f(x) - (x - 2) = \frac{\ln x}{x}$$

$\ln x = 0$ يكافئ $x = e^0 = 1$

x	0	1	$+\infty$
$f(x)-(x-2)$	$\|$	$-$ 0 $+$	
الوضعية	$\|$	(c_f) تحت (Δ) / تقاطع / (c_f) فوق (Δ)	

ملحوظة:

كي يكون $\ln x < 0$ يعني أن $0 < x < 1$

كي يكون $\ln x > 0$ يعني أن $x > 1$

3. المستقيم المقارب العمودي وإثباته:

$$\lim_{x\to a} f(x) = \infty$$

نقول في هذه الحالة أن $x = a$ هو مستقيم مقارب عمودي وتلقاه في مجموعة التعريف وهو العدد موش معرفة فيه الدالة..... بيناتنا

مثال: $f(x) = \ln x$

$$\lim_{x\to 0} \ln x = -\infty$$

إذن $x = 0$ هو مستقيم مقارب عمودي

4. المستقيم المقارب الأفقي وإثباته:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = a$$

نقول في هذه الحالة أن $y = a$ هو مستقيم مقارب أفقي وتلقاه في النهايات كي تجي رايح تحسب النهاية عند ∞..... بيناتنا

مثال: $f(x) = 2 + \frac{\ln x}{x}$

$$\lim_{x\to+\infty}\left[2 + \frac{\ln x}{x}\right] = 2$$

اذن $y = 2$ هو مستقيم مقارب أفقي

5. الفروع اللا نهائية:

$$\lim_{x\to\infty}\left[\frac{f(x)}{x}\right] =$$

0 فرع قطع مكافئ باتجاه محور الفواصل

∞ فرع قطع مكافئ باتجاه محور التراتيب

باه متنساش برك 0 يشبه لدويرة تاع حرف الفاء ف..وال ∞ تشبه لحرف التاء..ت....بيناتنا برك

mohamed aboub

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

6. معادلة المماس:

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

مثال: $f(x) = x^2 + 7x + 5$

أحسب المماس عند $x_0 = -2$

نحسب المشتق $f'(x) = 2x + 7$

$$y = f'(-2)(x - (-2)) + f(-2)$$
$$y = 3(x + 2) - 5 = 3x + 1$$

إذا قالك أحسب المماس عند $y_0 = -2$ في هذه الحالة لازمك تحوس على x_0 روح حل المعادلة $f(x) = -2$ كي تلقى x_0 هذيك الساعة أحسب المماس عند x_0.. هكا هو

7. نقطة الانعطاف:

$f''(x) = 0$ نجد النقطة $\omega(x_0, f(x_0))$

مثال: $f(x) = x^3 + 6x^2 - 11$

نحسب المشتق الأول $f'(x) = 3x^2 + 12x$

نحسب المشتق الثاني $f''(x) = 6x + 12$

$f''(x) = 0$ يكافئ $6x + 12 = 0$

يكافئ $x = -2$

$\omega(-2, f(-2))$ إذن $\omega(-2, 5)$

والمشتق الثاني يغير إشارته عند ω

ملحوظة: إذا انعدم المشتق الأول عند ω ولم يغير اشارته فنقول أن ω هي نقطة انعطاف

8. نقاط تقاطع المنحنى c_f مع المحورين:

أ. مع محور الفواصل: ساوي الدالة بالصفر $f(x) = 0$ تلقى قيم x لي تقطع فيه

ب. مع محور التراتيب: عوض x بالصفر في الدالة $f(0) = y_0$ تلقى قيمة y_0 لي تقطع فيها

9. التناظر:

أ. مركز تناظر: $\omega(\alpha, \beta)$

$$f(2\alpha - x) + f(x) = 2\beta$$

مثال: مثلا كون يقلك أحسب $f(6 - x) + f(x)$ كي تحسب وتلقى النتيجة مثلا تساوي 8 اقسمهم على 2 وقولّو نستنتج بلي النقطة $\omega(3, 4)$ هي مركز تناظر

ب. محور تناظر: $x = \alpha$

$$f(2\alpha - x) = f(x)$$

10. شفعية دالة:

يعني نقولو زوجية ولا فردية طبق القانون برك

$f(-x) = -f(x)$ نقول أنها دالة فردية

$f(-x) = f(x)$ نقول أنها دالة زوجية

مثال: $f(x) = x^3 + 7x$

$$f(-x) = (-x)^3 + 7(-x)$$
$$= -x^3 - 7x = -f(x)$$

ومنه f دالة فردية

مثال: $f(x) = x^2 + 7$

$$f(-x) = (-x)^2 + 7 = x^2 + 7 = f(x)$$

ومنه f دالة زوجية

11. الانسحاب:

$$g(x) = f(x + a) + b$$

في هذه الحالة نقول (c_g) صورة (c_f) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{v}(-a; b)$

مثال: شرح كيفية إنشاء (c_g) انطلاقا من (c_f)

$f(x) = \ln x$ و $g(x) = \ln(x + 2) + 3$

(c_g) صورة (c_f) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{v}(-2; 3)$

12. عفاريس المعاملات: a و b و c

1. كي يقلك أوجد المعاملات a و b و c ويقلك بلي (c_f) يشمل النقطة مثلا $A(4; -2)$ ويقبل مماس عند A معامل توجيهه 6 ويشمل ذروة أو قيمة حدية هي $B(3; 5)$ ولديه مماسا موازيا لمحور الفواصل أي أفقي عند الفاصلة -1..

شوف معاياواش تكتب:

$f(4) = -2$ ...معناه يشمل النقطة $A(4; -2)$

$f'(4) = 6$...معناه يقبل مماسا عند النقطة A

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM
mohamed abou


الذروة $B(3;5)$ فيها زوج معادلات تشملها الدالة وتعدم المشتق $f(3)=5$ و $f'(3)=0$

$f'(-1)=0$ ...معناه يقبل مماسا أفقي عند -1

2. كي يعطيك العبارة ويقولك جيب a و b و c هابين توحّد المقامات وتطابق مكلاه نريدو نفصلو

3. كي يعطيك بيان ويقلك (c_f) يقبل مماسا D_1 عند الفاصلة 1 ويقبل مماسا D_2 عند الفاصلة 0 ويقلك عين من البيان :

$f(2)$ و $f'(1)$ و $f'(0)$ كما هو موضّح هنا



بما أن المماس D_1 موازي لمحور الفواصل عند 1 فان المشتق عند 1 معدوم يعني $f'(1)=0$

نحسب ميل المماس D_2 نختار نقطتين يفوت بيهم فنلاحظ $A(0;1)$ و $B(1;-2)$ فنقوم بالحساب

$$f'(0)=\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}=\frac{-2-1}{1-0}=-3$$

ومنه $f'(0)=-3$ و $f(2)=3$

13. القيمة المطلقة والتناظرات :

ا. كي يقلك $g(x)=|f(x)|$

روح للمنحنى (c_f) أجزء لي فوق محور الفواصل عاود أرسمو ولي تحت محور الفواصل طلعوا لفوق ديرلو تناظر بالنسبة لمحور الفواصل يجيك منحنى (c_g)

ب. كي يقلك $g(x)=f(|x|)$

روح للمنحنى (c_f) أجزء لي $g(x)=f(x)$ عاود أرسمو وزيد هو نفس أجزء ديرلو تناظر بالنسبة لمحور التراتيب يجيك منحنى (c_g) لأنها دالة زوجية

ج. كي يقلك $g(x)=-f(x)$

روح لمنحنى (c_f) أجزء لي فوق محور الفواصل أرسمو لتحت ولي تحت محور الفواصل أرسموا لفوق ديرلهم تناظر بالنسبة لمحور الفواصل يجيك منحنى (c_g)

د. كي يقلك $g(x)=f(-x)$

روح لمنحنى (c_f) أجزء لي $x>0$ أرسمو في أجهة نتاع $x<0$ وأجزء نتاع $x<0$ أرسمو في أجهة نتاع $x>0$ ديرلهم تناظر بالنسبة لمحور التراتيب يجيك منحنى الدالة (c_g)....

14. الاستمرارية :

$$\lim_{x\to 2} f(x)=f(2)$$

نقول في هذه الحالة أن f مستمرة عند 2

كل دالة مستمرة على مجال تعريفها

15. الاشتقاقية :

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(x_0)$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(h+x_0)-f(x_0)}{h}=f'(x_0)$$

أخدم بالقانون لي يعجبك المهم التفسير الهندسي للاشتقاق هو أن الدالة تقبل مماس عند x_0 أو تقبل نصف مماس هاك عارف القيمة المطلقة

ملحوظة إذا جاتك النتيجة 0 قولو المماس أفقي يوازي محور الفواصل واذا جاتك ∞ قولو المماس عمودي موازي لمحور التراتيب

16. المعادلات التفاضلية :

نقترح الحل هو $f(x)$ يعني حلولها عبارة عن دالة

ا. الشكل $y'=ay$

الحل هو $y'=ay$ $f(x)=ce^{ax}$

الحل هو $y'=2y$ $f(x)=ce^{2x}$

ب. الشكل $y'=ay+b$

الحل هو $y'=ay+b$ $f(x)=ce^{ax}-\frac{b}{a}$

الحل هو $y'=2y+3$ $f(x)=ce^{2x}-\frac{3}{2}$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

مثال: الهدف هو حل المعـــــــــادلة (1)

$y' - 2y = (x-3)e^x$ ..... (1).

1. أوجد a و b حتى تكون $u(x) = (ax+b)e^x$ حلا للمعادلة (1) ..... نعوض ونطابق فقط

$u' - 2u = (x-3)e^x$

روح اشتق u وزيدها $-2u$ وعوضـــــهما في المعادلة وطـــابقهما مع الطرف الأخر رايح تلقى

$a = -1$ و $b = 2$

إذن $u(x) = (-x+2)e^x$

2. حل المعادلة $y' - 2y = 0$.....(2) إذن $y' = 2y$ الحل هو $y(x) = ce^{2x}$

3. نعتبر حلول(1) هي $y + u$ اذن استنتاج الحلول $f(x) = y(x) + u(x)$

$f(x) = ce^{2x} + (-x+2)e^x$

4. استنتج الحل الخاص حيث $f(0) = 5$

نعوض $f(0) = ce^0 + (-0+2)e^0 = 5$

ومنه نجـــــــــد $c = 3$

ومنه حلـــــــــــول(1) هي

$f(x) = 3e^{2x} + (-x+2)e^x$

تحب تزيد تبسطها أخرج e^x عـــــاملا مشتركا


$f(x) = (3e^x - x + 2)e^x$

17. كيفية رسم منحنى دالـــــــة :


عندنا جدول تغيرات حبينا نرسمو منو منحنى الدالة تبـــــــــــع معايا واش رايحين نديرو

x	-2	-1	1	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	0 ↗	$\frac{3}{2}$ ↘	0

نرسمو معلم ونعينو عليه احداثيات النقط شوف معايالي فوق جدول التغيرات الي راهم في خانة نتاع x هذوك عبارة على فواصل ولي راهم لتحت في خانة نتاع $f(x)$ عبارة على ترتيبات بمـــــعنى هذيك -2 ترتيبة تاعها $+\infty$ وال -1 ترتيبتها 0 ومنبـــعد عندنا 1 ترتيبتو $3/2$ والاخيرة $+\infty$ ترتيبتها 0 الخطوة المهمة حنا حبينا هذيك $+\infty$ نديروها شغل عدد حقيقي يساوي5 ولا 8 كيما تحب انت مثلا في هذا المثال نديروها تساوي 5 باه نسهلو العملية هيـــــــــــا نبدو المنحنى يبدأ من $(-2;+\infty)$ و هي كيمـــــا تفـــــاهمنا نكتبوها هكا $(-2;5)$ يعني$+\infty$ نبدلـــــوها نديروها 5 ومنبعد يهبط المنحنى الى النقطـــة $(-1;0)$ومنبعد يريد يطلع $(1;3/2)$ ومنبعـــد يهبط في الاخير الى $(-2;5)$.روح علم النـــــقط في المعلم كيما هكا شوف النقط السوداء



منبعد نوصلو بين النقط بالحنانة شوف كيفاه يولي



أيا خلاص فيها براك ـــــــــــــة

18. الوسيـــــــــــــط m :


ا. كي تكون عندك $f(x) = m$.....

في هذه الحالة أرسم مستقيمات ذو المعـــــــادلة $y = m$ وتكون موازية لمحور الفواصل يعني أفقية وتقاطعهم مع الدالة هذيك هي الحلـــــــــول

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

مثال: أنظر المنحنى لي في الصفحة رقم 5 $0 < m < 1.5$ هنالك ثلاث تقاطعات يعني ثلاث حلول بالنسبة لإشارة الحل دير إسقاط على محور الفواصل تعرف الإشارة إذا كانت جهة الموجب أو جهة السالب

نعطيك مثال لو ترسم مستقيم اوفقي معادلته $y = 1$ تلقاه يقطع الدالة ثلاث مرات مرة في الجهة الموجبة كي تسقط تجيك 2.5 والثانية تجيك مع محور الترتيب نقولو معدومة والأخيرة في الجهة السالبة كي تسقط تجيك -1.5 شوف الرسم المستقيم الأحمر معادلته $y = 1$




ب. كي تكون عندك..... $f(x) = m + 1$

تبقى نفس المناقشة السابقة روح للحلول السابقة ونقصلهم 1 مثلا $0 < m + 1 < 1.5$ نقص 1 للأطراف تصبح $-1 < m < 0.5$


ج. كي تكون عندك..... $f(x) = x + m$

روح جيب المستقيمات لي كيفو في معامل التوجيه مثلا تلقى كاين مستقيم معادلتو $y = x + 1$ ومنبعد دير مطابقة $y = x + 1$ و $y = x + m$ ودير $m = 1$ و $m < 1$ و $m > 1$ فقط تكون المناقشة مائلة كيما المستقيم $y = x + 1$

شوف المثال عندنا زوج مستقيمات مقاربة متوازيين واحد معادلتو $y = x + 1$ ولوخر $y = x - 1$



كي نجو ندیرو في مناقشة $m < -1$ لايوجد حلول و $-1 < m < 1$ كاين حل وحيد و $m > 1$ لا يوجد حلول شوف الخطوط الحمورة كيفاه مرسومين



د. كي تكون عندك.... $f(x) = mx$


يسموها المناقشة الدورانية يعني المستقيم يدور حول نقطة ثابتة لازم تعرف تحسبها اولا مثلا يعطيك مستقيم معادلتو $y = mx - 2m - 3$ يقولك جيب المستقيمات لي تمر بنقطة ثابتة يطلب تعيينها شوف واش دير اجعلها صفرية

$$y - mx + 2m + 3 = 0$$
$$y + 3 + m(-x + 2) = 0$$

منبعد دير $\begin{cases} -x + 2 = 0 \\ y + 3 = 0 \end{cases}$

ومنبعد تحسب تلقى النقطة $(2; -3)$


ندیرو مثال باه تقدر تفهمني بيا شوف المنحنى



لو اعتبرنا كل المستقيمات تمر بالنقطة $(0; 2)$

والمستقيم(Δ) معادلتو $y = -4e^{-1}(x - 2)$

ندیرو المناقشة $f(x) = m(x - 2)$



قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

يدور كيما الدائرة المثلثية تخيل دور فيه لتحت $-\infty$ حتان للمستقيم لي معامل توجيه تاعو $-4e^{-1}$ يعني كاين حل واحد ومن المستقيم لي معامل توجيه تاعو $-4e^{-1}$ حتان لصفر يعني حتى يكون أفقي يقطع ثلاث مرات يعني ثلاث حلول وعند الصفر يعني افقي يقطع مرتين عند 0 وعند 2 ومن الصفر الى $+\infty$ حتى يولي عمودي يوجد حل واحد

19. الدوال الأصلية :

أ. Ax^n الدالة الأصلية هي $\frac{Ax^{n+1}}{n+1}+c$

x^2+7 الأصلية هي $\frac{1}{3}x^3+7x+c$

و c هو عدد ثابت يمكن حسابه

ب. $\frac{f'}{f}$ الدالة الأصلية هي $\ln f+c$

$\frac{3}{3x+2}$ الأصلية هي $\ln(3x+2)+c$

ج. e^{ax+b} الدالة الأصلية هي $\frac{1}{a}e^{ax+b}+c$


e^{5x+1} الأصلية هي $\frac{1}{5}e^{5x+1}+c$

د. $f'f^n$ الدالة الأصلية هي $\frac{f^{n+1}}{n+1}+c$

$5(5x+2)^2$ الأصلية هي $\frac{1}{3}(5x+2)^3+c$

د. $\cos(ax+b)$ الدالة الأصلية

هي $\frac{1}{a}.\sin(ax+b)+c$



ه. قانون التكامل بالتجزئة

ماننسوهش هذا هو القانون

$$\int f'.g\,dx = f.g - \int g'.f\,dx$$

باه تحسب بالتكامل بالتجزئة لازمك تقسم الدالة إلى دالتين اطلعهم أسهل طريقة للحساب هوأجزء لي دالته الأصلية تجيك ساهلة هولي ديرو المشتق

مثال: نحسب التكامل $2x\ln x$

نورماطوا $2x$ هي لي دالتها الأصلية تجينا ساهلة مالا هي لي نديروها المشتق شوف معايا

$f'(x)=2x$ ..... $f(x)=x^2$

$g(x)=\ln x$ ..... $g'(x)=\frac{1}{x}$

هيا نعوض وهم في القانون

$$\int 2x\ln x\,dx = x^2\ln x - \int \frac{1}{x}x^2dx$$

$$\int 2x\ln x\,dx = x^2\ln x - \int xdx$$

$$\int 2x\ln x\,dx = x^2\ln x - \frac{1}{2}x^2 + c$$

ومنه الدالة الأصلية نتاع $2x\ln x$ هي $x^2\ln x-\frac{1}{2}x^2+c$

ولي مافهمنيش يروح يدير رقية شرعية عند كاش طالب ملييح.....بالشفاء .

20. حساب مساحة حيز بالتكامل :

$$S=\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a)$$

كي يقلك احسب مساحة الحيز لي يحصر الدالة $f(x)=x^2$ والمستقيم $y=x-1$

والمستقيمين $x=2$ و $x=1$ من الإنشاء نلاحظ المنحنى نتاع الدالة مربع فوق المستقيم يعني نديرو الدالة ناقص المستقيم والناتج نحسبولو التكامل تاعو شوف معايا عارفلك مافهمتنيش

$$S=\int_1^2 (f(x)-y)dx =$$

$$S=\int_1^2 \left(x^2-(x-1)\right)dx = \frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+x$$

نعوضو بال2 ومبعد نقصولو النتيجة تاع 1 شوف

$$S=\left(\frac{1}{3}2^3-\frac{1}{2}2^2+2\right)-\left(\frac{1}{3}1^3-\frac{1}{2}1^2+1\right)$$

$$S=\frac{11}{3}\ us$$

بعد أحساب اضرب النتيجة في وحدة الرسم

mohammed abou

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

21. عفاس اسئلة الدوال الاصـــليـة :

نعطيوكم شوي أمثلة لي تكرر في البكالـــوريا

مثال(1): بين أن g أصلية لـــــدالة f

$$\begin{cases} g(x)=\dfrac{-1}{x+1}[1+\ln(x+1)] \\ f(x)=\dfrac{\ln(x+1)}{(x+1)^2} \end{cases}$$

في هذه الحالة تشتق الدالة الأصـــليـة g ولازم تجيك الدالة f هيا عاونوني يالهاربين في الاشتقاق

$$g'(x)=\frac{1}{(x+1)^2}[1+\ln(x+1)] + \left[0+\frac{1}{x+1}\right]\left(\frac{-1}{x+1}\right)$$

ننشرو ونشوفو واش يخرجلنا إن شـــاء الله خير

$$g'(x)=\frac{1}{(x+1)^2}+\frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}-\frac{1}{(x+1)^2}$$

$$g'(x)=\frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}=f(x)$$

أيا بيوو ومنه نقول صح g هي أصلية لدالة f

مثال(2): ساعات يقولك أوجد الأعداد الحقيقة a و b و c حتى تكون g أصلية لدالة f

$$\begin{cases} g(x)=(ax^2+bx+c)e^{-x} \\ f(x)=(x^2+3x+2)e^{-x} \end{cases}$$

في هذه الحالة نشتقو الدالة الاصلية g ونديروها مطابقة مع الدالة f ونخرجو المعاملات a و b و c

$$g'(x)=(2ax+b)e^{-x} + (-e^{-x})(ax^2+bx+c)$$

$$g'(x)=(2ax+b-ax^2-bx-c)e^{-x}$$

$$g'(x)=(-ax^2+(2a-b)x+b-c)e^{-x}$$

بالمطـــــــابقة مع الدالة f فنجد

$$\begin{cases} -a=1 \\ 2a-b=3 \\ b-c=2 \end{cases} \quad \text{فنجد} \quad \begin{cases} a=-1 \\ b=-5 \\ c=-7 \end{cases}$$

ومنه $g(x)=(-x^2-5x-7)e^{-x}$

اذا حبيت تتحقق عاود اشتقها الـــــــدالة g

دوك تجيك الدالة f نتمنى راك فهـــــــمتني

مثال(3): ساعات يقولك اوجد الدالة الأصلية لدالة f ويعطيـــــك عبارتها كيما هاك مثلا

$$f(x)=x^2-e^{2x}+\frac{2x}{x+1}$$

بالنسبة لـ x^2 و e^{2x} طبق قوانينهم مشكلتنا في دالك الكسر السامط ايا نعطيك عفسة بينـــاتنا ضيف للبسط $2+$و -2

$$f(x)=x^2-e^{2x}+\frac{2x+2-2}{x+1}$$

$$f(x)=x^2-e^{2x}+\frac{2x+2}{x+1}-\frac{2}{x+1}$$

$$f(x)=x^2-e^{2x}+\frac{2(x+1)}{x+1}-\frac{2}{x+1}$$

$$f(x)=x^2-e^{2x}+2-\frac{2}{x+1}$$

بدلناها الشكل دوكا نقدرو نحسبوها اصـــليتها

$$F(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}e^{2x}+2x - 2\ln(x+1)+c$$

ساعات يريدك شرط باه تحسب قيمة c مثـــــلا يقولك حيث $F(0)=\frac{3}{2}$ نروحو نعـــــوضو

$$\frac{1}{3}0^3-\frac{1}{2}e^0+0-2\ln(0+1)+c=\frac{3}{2}$$

$$c=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}=2$$

ومنه بعد التعويض تصبح عندنا

$$F(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}e^{2x}+2x - 2\ln(x+1)+2$$

سر النجاح

هو المحافظة على الصلوات ففي سجودك ارفع مشاكلك وهمومك إلى رب السماوات

تفكر ربك في الرخاء يتفكرك في الشدة

mohamed aroub

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

المتتاليات العددية



دير هذو العفايس في راسك عزيزي

المتتالية الهندسية	المتتالية الحسابية
$v_5 = v_2 . q^3$	$v_5 = v_2 + 3r$
$(5-2) = 3$	$(5-2) = 3$
إذن القانون	إذن القانون
$v_n = v_p . q^{n-p}$	$v_n = v_p + (n-p)r$
$v_1 . v_3 = {v_2}^2$	$v_1 + v_3 = 2v_2$
إذا كانت عندك	إذا كانت عندك
ثلاث معادلتين عوضها	ثلاث معادلتين عوضها
في معادلة الضرب	في معادلة الجمع

المجموع

$$s_n = v_0 + v_1 + v_2 + \cdots + v_n$$

عدد الحدود $n - 0 + 1 = n + 1$

$s_n = v_0 \frac{q^{\text{عددالحدود}} - 1}{q-1}$	$s_n = \frac{\text{عددالحدود}}{2}(v_0 + v_n)$
$s_n = v_0 \frac{q^{n+1} - 1}{q-1}$	$s_n = \frac{n+1}{2}(v_0 + v_n)$

1. البرهان بالتراجع:

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1 \end{cases}$$

برهن بالتراجع أن $u_n > 2$

أولا نثبت صحة الشرط الابتدائي $u_0 = 3$ ولدينا $3 > 2$ ومنه محقق إذن صحيحة

ثانيا نفرض أن $u_n > 2$ ونبرهن صحة u_{n+1}

أي نبرهن أن $u_{n+1} > 2$

نديرو عفسة نتاع أكحص ننطلق من $u_n > 2$

نضرب الطرفين في $\frac{1}{2}$ ..... $\frac{1}{2}u_n > \frac{1}{2}2$

نضيف لطرفين 1 ..... $\frac{1}{2}u_n + 1 > 1 + 1$

إذن تصبح ..... $u_{n+1} > 2$ ومنه صحيحة

إذن $u_n > 2$ صحيحة مهما يكن n طبيعي

ملحوظة:

كل استنتاج يأتي بعد البرهان بالتراجع نقول بلي (u_n) محدودة من الأسفل أو الأعلى شوف كيفاه

$u_n > 2$ هنا نقول محدودة من الأسفل بـ 2

$u_n < 2$ هنا نقول محدودة من الأعلى بـ 2

2. اتجاه التغير:

متناقصة $u_{n+1} - u_n < 0$

متزايدة $u_{n+1} - u_n > 0$

مثال السابق :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n + 1 - u_n$$

$$u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{2}u_n + 1$$

نخرج $-\frac{1}{2}$ عاملا مشتركا فيصبح الفرق

$$u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{2}(u_n - 2)$$

شوف نديرو أكحص ونعرفوه موجب أو سالب

نقولو لدينا $u_n > 2$

نضيف العدد -2 لطرفين

$$u_n - 2 > 0$$

نضرب في العدد $-\frac{1}{2}$ ورانا عارف يتغير الاتجاه

$$-\frac{1}{2}(u_n - 2) < 0$$

إذن $u_{n+1} - u_n < 0$ ومنه (u_n) متناقصة

mohammedaboub

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

3.التقـــــــــارب:

1. إذا لقيت (u_n) متناقصة ومحدودة مـــن الأسفل نقول أن (u_n) متقـــــــــــارية

2. إذا لقيت (u_n) متزايدة ومحـــــــدودة من الأعلى نقول أن (u_n) متقـــــــــــارية

3 النهاية : روح لعبارة أحد العام

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = L$$

u_n هي عبارة أحد العـــــــــــام

عفسة ال L : روح للعبارة التراجعية

$$\lim_{n\to+\infty} u_{n+1} = \lim_{n\to+\infty} u_n = L$$

مثال السابق : نحسب النهاية L

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$$

$$\lim_{n\to+\infty} u_{n+1} = \lim_{n\to+\infty} u_n = L$$

بما أن لديها نفس النهاية نروحو نديرو عفسة ال L

$$L = \frac{1}{2}L + 1$$

$$L - \frac{1}{2}L = 1$$

$\frac{1}{2}L = 1$ يكافئ أن $L = 2$

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 2$$

وهو العدد لي تلقاه في البرهان بالتـــــــــراجع

ملاحظة :

كل استنتاج يجي بعد حساب نهاية عبـــــارة أحد العام يقصد به التقـــــــــــارب

4.المتتالية الثـــــــابتة:

$$u_0 = u_1 = u_2 = \cdots = u_n = u_{n+1}$$

أي أن:

$$u_{n+1} - u_n = 0$$

5.كيفية إثبات متتالية هندسية:

$$v_{n+1} = v_n . q$$

ننطلق من v_{n+1} لنصل الى $v_n . q$ وفي هذه الحالة نقول أن (v_n) هندســـــــية وأساسها q

مثال1 : اثبت $v_n = e^{2n+1}$ هندســـــية

نضع في بلاصة n نضع $n+1$ فنصـــــبح

$$v_{n+1} = e^{2(n+1)+1}$$

$$v_{n+1} = e^{2n+2+1}$$

نحـــافظ على $2n+1$ والعدد 2 أجديد نخرجوه

$$v_{n+1} = e^2 . e^{2n+1} = e^2 . v_n$$

ومنه هندســـــــية وأساسها e^2

مثال2 : شوف شكل آخر في إثبات الهندسية

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 2 \end{cases}$$

اثبت أن $v_n = u_n - 6$ متتالية هندسية

تقدر تعرف الأساس قبل ماتبدا تبرهن وهو العدد لي مضروب في u_n اللي هو $\frac{2}{3}$ خليها بينـــــاتنا

نفس الطريقة ننطلق من v_{n+1} لنصل $v_n . q$

$$v_n = u_n - 6$$

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 6$$

نعوض u_{n+1} بقيمتها فيكون عندنا

$$v_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 2 - 6 = \frac{2}{3}u_n - 4$$

نخرج $\frac{2}{3}$ عـــــــــــاملا مشتركا فيصبح لدينا

$$v_{n+1} = \frac{2}{3}(u_n - 6)$$

ومنـــــــه $v_{n+1} = \frac{2}{3}v_n$

إذن هندسية أساسها $\frac{2}{3}$

وتقدر دير الطريقة نتاع القسمة $q = \frac{v_{n+1}}{v_n}$

دير راسك أنت حر دير الطريقة لي تعجبك

mohammed aboub

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

6.كيفية إثبات متتالية حسابية:

$$v_{n+1} - v_n = r$$

مثال : اثبت $v_n = 2n + 1$ حسابية

نحسب v_{n+1} ونديرو الفرق بينها وبين v_n إذن

$$v_{n+1} = 2(n+1) + 1 = 2n + 3$$

نطبق القانون

$$v_{n+1} - v_n = 2n + 3 - (2n + 1)$$

$$v_{n+1} - v_n = 3 - 1 = 2$$

ومنه حسابية أساسها 2

وهو العدد لي مضروب في n متقول كتي واحد

7.عفسة أجملة:

$$\begin{cases} v_1 + v_2 + v_3 = k & \dots\dots(1) \\ v_1 \times v_2 \times v_3 = k' & \dots\dots(2) \end{cases}$$

أ. إذا كانت المتتالية هندسية:

الوسط الهندسي : $v_1 \times v_3 = {v_2}^2$

عوضها في المعادلة(2) نتاع الضرب تلقى v_2

$$v_1 \times v_2 \times v_3 = v_2 \times {v_2}^2 = k'$$

$${v_2}^3 = k' \quad \text{يكافئ} \quad v_2 = \sqrt[3]{k'}$$

باه نحسب الأساس q :

نكتب v_1 و v_3 بدلالة v_2

$$v_3 = v_2 q^{3-2} = v_2 q^1$$

$$v_1 = v_2 q^{1-2} = v_2 q^{-1} = \frac{v_2}{q}$$

نعوض قيمة كل من v_1 و v_3 بدلالة v_2 و q في المعادلة (1)و بمأن v_2 عندك قيمتها يبقى المجهول هو q بعد التعويض تجيك معادلة من الدرجة الثانية $aq^2 + bq + c = 0$

بعد ما تفتحها بالمميز يجوك زوج قيم لـ q

خذ الأساس q :

1. إذا قالك متناقصة هز الأساس $0 < q < 1$

مثلا $\frac{2}{3}$ او $\frac{1}{2}$ او $\frac{1}{4}$ او $\frac{3}{4}$ .....

2. إذا قالك متزايدة هز الأساس $q > 1$

مثلا 2 او 3 او $\frac{3}{2}$ او $\frac{4}{3}$ او .....

ب. إذا كانت المتتالية حسابية:

الوسط الحسابي : $v_1 + v_3 = 2v_2$

عوضها في المعادلة(1) نتاع الجمع تلقى v_2

$$v_1 + v_2 + v_3 = v_2 + 2v_2 = k$$

$$3v_2 = k \quad \text{يكافئ} \quad v_2 = \frac{k}{3}$$

باه نحسب الأساس r :

نكتب v_1 و v_3 بدلالة v_2

$$v_3 = v_2 + (3-2)r = v_2 + r$$

$$v_1 = v_2 + (1-2)r = v_2 - r$$

نعوض قيمة كل من v_1 و v_3 بدلالة v_2 و r في المعادلة (2)و بمأن v_2 عندك قيمتها يبقى المجهول هو r بعد التعويض تجيك معادلة من الدرجة الثانية $ar^2 + br + c = 0$

بعد ما تفتحها بالمميز يجوك زوج قيم لـ r

خذ الأساس r :

1. إذا قالك متناقصة هز السالب $r < 0$

مثلا -2 او -3 او $\frac{-1}{4}$ او $\frac{-5}{4}$ .....

2. إذا قالك متزايدة هز الموجب $r > 0$

مثلا 2 او 3 او $\frac{1}{4}$ او $\frac{5}{4}$ .....



نتمنى إن شاء الله فهمتوني.

8.متتاليتان متجاورتان:

نقول على أن (v_n) و (u_n) متتاليتان متجاورتان إذا كانت إحداهما متزايدة والأخرى متناقصة ولهما نفس النهاية يعني

$$\lim_{n \to +\infty} v_n = \lim_{n \to +\infty} u_n$$

$$\lim_{n \to +\infty} (v_n - u_n) = 0 \quad \text{اي}$$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM
mohamed aboub

9.عفايس المجمـــــــوع:

$$s_n = v_0 + v_1 + v_2 + \cdots + v_n$$

(v_n) متتالية هندسية طبق قانون المجموع

$$s_n = v_0 \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$$

إذا كانت : لتكن المتتالية (u_n) المعرفة بالعبارة

$$u_n = v_n + 3$$

نحسب المجموع s_n' بـــــــدلالة n

$$s_n' = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$$

بمـــــأن $u_n = v_n + 3$

$$s_n' = s_n + 3(n+1)$$

عدد الحدود

إذا كانت : ليكن المجموع k_n حيث (v_n) هندسية

$$k_n = v_0^2 + v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2$$

قم بتربيع الحد الأول والأساس وطبّق نفس القانون

$$k_n = v_0^2 \frac{q^{2(n+1)} - 1}{q^2 - 1}$$

نفس الشيئ بالنسبة للمجمـــــــــــوع L_n

$$L_n = v_0^3 + v_1^3 + v_2^3 + \cdots + v_n^3$$

قم بتكعـــــــــــيب الحد الأول والأساس

$$L_n = v_0^3 \frac{q^{3(n+1)} - 1}{q^3 - 1}$$

نفس الشيئ بالنسبة للمجمـــــــــــوع T_n

$$T_n = \frac{1}{v_0} + \frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} + \cdots + \frac{1}{v_n}$$

قم بقـــــــــــلب الحد الأول والأساس

$$T_n = \frac{1}{v_0} \cdot \frac{\left(\frac{1}{q}\right)^{n+1} - 1}{\frac{1}{q} - 1}$$



كان فهمتني وجدلي

باه نبعثك للجامعة



النجـــــــــــاح

1. تريد أن تكون مبدعاً في هذه الحياة؟؟ أول خطوة هي الاحتكاك بالناجحين و استمع لأفكارهم و حاورهم هذه أول خطوة للنجاح
2. بعضنا ينجح بذكائه وبعضنا ينجح بغباء الآخرين
3. إذا عرفنا كيف فشلنا نفهم كيف ننجح
4. إن النجاح لا يحتاج إلى أقدام بل إلى إقدام
5. المثابرة و النجاح توأمان الأولى مسألة نوعية و الثاني مسألة وقت
6. النجاح هو الإنتقال من فشل إلى فشل دون أن نفقد الأمل
7. الخوف من أي محاولة جديدة طريق حتمي للفشل
8. عليك أن تتعلم قواعد اللعبة أولاً ، ثم عليك أن تتعلم كيف تلعب أفضل من الآخرين
9. فشل من حولك لا يعني بالضرورة فشلك ، لكن لا تتوقع منهم مساعدتك على النجاح
10. من الملاحظ أن الناجح هو من أحسن استغلال الوقت ، في حين ضيعه غيره
11. الناجحون يقدرون على النجاح لأنهم يعتقدون أنهم يقدرون
12. اعزمْ وكدَّ فإن مضيتَ فلا تقفْ ... واصبرْ وثابرْ فالنجاحُ محققٌ إن شاء الله

mohammedaboub

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الاحتمالات

كي يعطيك مجموعتين ويقلك w هي المجموعة الكلية و A هي المجموعة الجزئية و تمثل الأعداد الزوجية و B هي مجموعة جزئية من w

$$w = \{1.2.3.4.5.6.7.8.9\}$$
$$A = \{2.4.6.8\}$$
$$B = \{7.8.9\}$$

احسب الاحتمالات التالية : $P(A)$ و $P(B)$ و $P(\bar{A})$ و $P(A \cup B)$ و $P(A \cap B)$ و $P_A(B)$

$$P(A) = \frac{\text{عددعناصر A}}{\text{عددعناصر w}} = \frac{4}{9}$$

$$P(B) = \frac{\text{عددعناصر B}}{\text{عددعناصر w}} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$P(\bar{A})$ يمثل الاحتمال العكسي لـ $P(A)$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$$

بطريقة أخرى يعني مجموعة $\bar{A}$ هي عكس الأعداد الزوجية وهي الأعداد الفردية $\bar{A} = \{1.3.5.7.9\}$

$$P(\bar{A}) = \frac{\text{عددعناصر } \bar{A}}{\text{عددعناصر w}} = \frac{5}{9}$$

نروحو نحسبو المجموعتين $A \cap B$ و $A \cup B$

$$A \cap B = \{8\}$$
$$A \cup B = \{2.4.6.8.7.9\}$$

$$P(A \cap B) = \frac{\text{عددعناصر } A \cap B}{\text{عددعناصر w}} = \frac{1}{9}$$

$$P(A \cup B) = \frac{\text{عددعناصر } A \cup B}{\text{عددعناصر w}} = \frac{6}{9}$$

بطريقة اخرى لحساب $P(A \cap B)$

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$
$$P(A \cap B) = \frac{4}{9} + \frac{3}{9} - \frac{6}{9} = \frac{7-6}{9} = \frac{1}{9}$$

نحسبو $P_A(B)$ اذا كانت عندك $P(A)$ و $P(A \cap B)$ نقولولك بصحتك ديرك لافير هاوليك القانون

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$P_A(B) = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{4}{9}} = \frac{1}{9} \cdot \frac{9}{4} = \frac{1}{4}$$

كوايح لي لازم تعرفهم

العاملي والترتيبة والتبديلة والقائمة والتوفيقة

1. العاملي:

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \ldots \times\times .. n$$

مثال أحسب عاملي 5!

$$5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$$

متنساش

$$0! = 1 \text{ و } 1! = 1$$

2. الترتيبة:

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

مثلا باه نحسبو A_5^2

$$A_5^2 = \frac{5!}{(5-2)!} = \frac{5!}{3!} = \frac{120}{6} = 20$$

متنساش

$$A_1^1 = 1 \text{ و } A_1^0 = 1$$

3. التوفيقة: شوف كيفاه نحسبو توتو

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$$

مثلا باه نحسبو C_5^2

$$C_5^2 = \frac{5!}{2!\,(5-2)!} = \frac{5!}{2! \times 3!} = \frac{120}{12} = 10$$

متنساش

$$C_n^1 = n \text{ و } C_n^n = C_n^0 = 1$$

4. التبديلة:

$$A_n^n = n!$$

هذا هو القانون

mohamed aboub

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

5.القائمة:

هذا هو القـــــانون n^p

مثال صندوق به 9 كريات نسحب منه ثلاث كريات و بإرجاع الكرية المسحوبة إلى الصندوق أحل هو عدد الكريات في الصندوق أس ثلاثة

$$9^3 = 729$$

6.لعفايس تاع الأسئلة:

أ. أجمعيـــــــــات:

كي يقلك تجمعية مكونة من مدير ومراقب وووو وساعات ميذكرلكش الوظيفة شوف بواه تحدم

إذا ذكر وظيفة الأشخاص اخـــدم بالترتيبة A_n^p

إذا لم يذكر الوظيفة اخـــــدم بالتوفيقة C_n^p

ب. السـحب:

لـــدينا n كرية و نســـحب p كرية

كي يقلك نسحب في آن واحد ولا نسحب ونرجع ولا نسحب و منرجعش شوف بواه تحدم

إذا قالك نسحب في آن واحد تخدمو بالتوفيقة C_n^p

إذا قالك نسحب على التوالي و بدون إرجاع هنا تخدمـــــــو بالترتيبة A_n^p

إذا قالك نسحب على التوالي بالإرجاع هنـــا تخدمـــــــو بالقائمة n^p

7.كيفاه تحسب بالآلة أحاسبة:

كاين رمز $X!$ يقصد به العاملي تروحلو بـ SHIFT كاين خانة مكتوب عليها ncr هذيك معناها التوفيقة باه تحسب مثلا C_5^2 شـــوف واش دير كليكي على 5 ومنبعد ncr ومنبعد كليكي على 2 كاين خانة مكتوب عليها npr تروحلها SHIFT هي نفس أخانة نتاع ncr هذيك معناها الترتيبة باه تحسب مثلا A_5^2 شوف واش دير كليكي على 5 ومنبعد SHIFT ومنبـــــعد ncr و كليكي على 2 كاين نوع تلقى الرمز ncr و npr في خانة $\times$ و $\div$ عارفكم هاربين في الآلة أحاسبة أكيد فهمتوني

8.تمرين بسيط وشامل :

صندوق به 12 كرية 5 حمراء و3 صفراء و4 سوداء نسحب 3 كريات في آن واحد

- ماهو عدد السحبات الممكنة
- ماهو احتمال ظهور 3 كريات حمـــــراء فقط
- ماهو احتمال ظهور كرية سوداء واحـــــدة عـــــــــــلى الأقل
- ماهو احتمال ظهور كريتين صفراء على الأكثر
- ماهو احتمال ظهور كريتين حمراء وكرية سوداء

ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبـــــة عددالكريـــــــــــــــات أحمراء

- حدد القيم التي يأخذها X
- حدد قانون الاحتمال
- احسب الأمل الرياضي
- احسب التباين
- احسب الانحراف المعياري

الإجـــــــابة

أول حاجة تخدمو بالتوفيقة C_n^p على خاطر قالك نســـــــــحب في آن واحد

السحبات الممكنة هو من 12 نهزو 3 يعـــني

$$C_{12}^3 = 220$$

- احتمال ظهور 3 كرات حمراء فقط يعني من 5 نهزو 3 يعني $C_5^3 = 10$ ونقسمهم على أحالات الممـــكنة $P(A) = \frac{10}{220}$
- احتمال ظهور كرية سوداء واحدة على الأقل يعـني واحدة أو اثنان أو ثلاث

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM
mohamed aboub

شوف كي تلقى او يعني الجمع

كي تلقى و يعني الضرب

C_4^1 يعني من 4 سوداء نهزو واحدة و نكملو من 8 لخرين لي بقاو نكملو زوج يعني C_8^2 نستعملو الضرب شوف الخدمة لي نديروها سا!!!

معناه لي غلط في قيمة الأمل الرياضي نقولولو عظم الله أجرك وربي يعوضهالك في الفلسفة

9.تمرين ثاني ابسط من الأول :

صندوق به 12 كرية 5 حمراء و3 صفراء و4 سوداء نسحب 3 كريات على التوالي بدون إرجاع

- ماهو عدد السحبات الممكنة
- ماهو احتمال ظهور 3 كريات حمراء فقط
- ماهو احتمال ظهور كرية سوداء على الأقل
- ماهو احتمال ظهور كريتين صفراء على الأكثر

الإجابة

نفس الخدمة نتاع مقبيل غير نخدمو بالترتيبة

عدد السحبات الممكنة $A_{12}^{3} = 1320$

$$P(A) = \frac{A_5^3}{1320} = \frac{60}{1320}$$

$$P(B) = \frac{3A_4^1A_8^2+3A_4^2A_8^1+A_4^3A_8^0}{1320} = \frac{984}{1320}$$

$$P(C) = \frac{3A_3^2A_9^1+3A_3^1A_9^2+A_3^0A_9^3}{1320} = \frac{1314}{1320}$$

10.دستور ثنائي أحد :

اسمو كبر منو متخافش غير قانون برك

$$(a+b)^n = \sum_{P=0}^{P=n} C_n^p a^{n-p}b^p$$

$$(a+b)^n = C_n^0 a^{n-0}b^0 + C_n^1 a^{n-1}b^1 + C_n^2 a^{n-2}b^2 \ldots + C_n^n a^{n-n}b^n$$

ندير مثال باه تفهموني مليح مليح هيا تبع معايا

$$(a+b)^3 = C_3^0 a^{3-0}b^0 + C_3^1 a^{3-1}b^1 + C_3^2 a^{3-2}b^2 + C_3^3 a^{3-3}b^3$$

يعني n تبقى تساوي 3 وأما P قيمتها تتغير من 0 إلى 3 عاود شوف القانون دوك تفهم

$$(a+b)^3 = 1a^3 1 + 3a^2b^1 + 3a^1b^2 + 1a^0b^3$$
$$= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

11.شجرة الاحتمال:

مع احتراماتي للشجر هذه أسمط شجرة

اطلعم عمتي الشجرة تقولكم كي نسحبو عشوائيا بإرجاع ولا بدون إرجاع أحاجة المسحوبة

هههههه تبع معايا نعطيكم مثال... ابتسم

ندير مثال أحسن باه تفهموني قولو بسم الله

المثال الأول

صندوق به 7 كريات منها 4 حمراء و3 سوداء نسحب عشوائيا كرية نسجل لونها ثم نعيدها إلى الصندوق ثم نسحب مرة أخرى كرية ونسجل لونها حاب يقول نسحب كريتان بإرجاع الكرية المسحوبة

الأسئلة

- أنشئ شجرة الاحتمالات
- ماهو احتمال الحصول على كريتين حمراوين
- ماهو احتمال الحصول على كريتين سوداوين
- ماهو احتمال الحصول على كريتين مختلفتين في اللون

الاجابة


شوف معايا أنت كي تسحب مرتين وترجع الكرية المسحوبة معناه العدد تاعهم يبقى نفسو نرمزو للكرية الحمراء R والسوداء N

$\frac{3}{7}$ نقصدو بيها 3 كريات سوداء من العدد الكلي 7

$\frac{4}{7}$ نقصدو بيها 4 كريات حمراء من العدد الكلي 7

شوف معايا كي تسحب الأولى ممكن تكون حمراء ولا سوداء يعني إما $\frac{3}{7}$ او $\frac{4}{7}$ كي ترد تسحب الثانية يعني تكون أنت رجعت الأولى يعني يبقى العدد نفسو معناه الثانية قد تكون $\frac{3}{7}$ او $\frac{4}{7}$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM
mohammedaboup



باه تعرف روحك صحيح كي تجمع زوج أعضان احمر مع اسود يجيك الناتج واحد يعني $\frac{3}{7}+\frac{4}{7}=1$

- ماهو احتمال حصـــــول على كريتين حمراوين او احتمال حصول على سوداوين يعني إما الزوج حمورة ولا الزوج سوداء مثلا كي شغل تقول الأولى حمراء و الثانية حمراء نديرو الضرب نتبعو الغصن لي فيه R

اذا كانو زوج حمراء R——R

$$P(\mathrm{R})=\frac{4}{7}.\frac{4}{7}=\frac{16}{49}$$

اذا كانو زوج سوداء N——N

$$P(\mathrm{N})=\frac{3}{7}.\frac{3}{7}=\frac{9}{49}$$


- ماهو احتمال حصـول على كريتين مختلفتين في اللـون نشوفو الاغصان وين تكون R مع N يعني إما الأولى حمراء والثانية سوداء او الاولى سوداء والثانية حمراء يعني أجمع R——N N——R

$$P(\mathrm{B})=\frac{3}{7}.\frac{4}{7}+\frac{4}{7}.\frac{3}{7}=\frac{24}{49}$$

تحقق من أحساب باستخدام القـــــائمة n^p

المثال الثاني

نفس الاسئلة بصح نسحب كريتان بـــــدون ارجاع الكرية المسحوبة شوف يعني اذا كـــــانت الاولى سوداء ففي السحبة الثانية يكونو ناقصـــين كرية وحدة سوداء واذا كانت الأولى حمراء يعـــــني في السحبة الثانية يكونو ناقصين حمورة وحـــــدة على خاطر تسحب وماترجعش معناه يبـــقو 3 كي ماترجعش الكرية المسحوبة يعني الصندوق في السحبة الاولى يكونو فيه 7وفي السحبة الثانية يكونو فيـــه 6 ياااااااو رااك مترجعش لمسحوبة



نفس طريقـــــــــــــــــــة الإجابة

اذا كانو زوج حمراء

$$P(\mathrm{R})=\frac{4}{7}.\frac{3}{6}=\frac{12}{42}$$

واذا كانو زوج سوداء

$$P(\mathrm{N})=\frac{3}{7}.\frac{2}{6}=\frac{6}{42}$$

اذا كانو مختلفين في اللون

$$P(\mathrm{B})=\frac{4}{7}.\frac{3}{6}+\frac{3}{7}.\frac{4}{6}=\frac{24}{42}$$

تحقق من أحساب باستخدام الترتـــــيبة A_n^p

....كان فهمتني مليح وجد الشخشوخة....

وعرضني متنسـانيش



.....

الثقة بالنفس بعد التـــــوكل على الله مطلوبة شرعا ، فالمسلم يتعين عليه أن يحسن الظن بالله تعـــــــــــالى وأن يتفاءل لنفسه الخير والنجـــــاح دائماً ويسعى باستمرار في سبيـــــل الارتقاء لتحصيل الكمـــــــــال

mohammed aboud

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الأعـــــــداد المركبة

ماعليش دخل في راسك بلي $i^2 = -1$

1.طويلة عدد مركب $|Z|$:

ليكن العدد المركب $Z = -4 + 3i$

$$|Z| = \sqrt{(-4)^2 + (3)^2} = \sqrt{25} = 5$$

أطونسيو دخّل i تحت الجذر راك دير كـــارثة


2.عمدة عدد مركب $\theta = arg(Z)$:

علابالي بيك تكره $\sin\theta$ و $\cos\theta$ أصبر معايـــا لازمك تعرف تحسب الطويلة باه تحسب العمدة

مثال : ليكن العدد المركب $Z = -1 + \sqrt{3}i$

نحسبو الطويلة تجينـــا

$$|Z| = \sqrt{4} = 2$$



$$\begin{cases} \cos\theta = \frac{-1}{2} \\ \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

من الدائرة المثلثية الربع لي cos سالب و sin موجب هو الربع الثاني يعني هي الزاوية $\frac{\pi}{3}$ في الربع الثاني نـــــولّي $\pi - \frac{\pi}{3}$ نعطيك عفسة مليحة شـــــوف كيفاه تعرف الزوايا الشهيرة $Z = x + yi$

$x > y$ يعني الزاوية $\frac{\pi}{6}$ مثلا $Z = \sqrt{3} + 1i$

$x < y$ يعني الزاويـــة $\frac{\pi}{3}$ مثلا $Z = 1 + \sqrt{3}i$

$x = y$ يعني الزاوية $\frac{\pi}{4}$ مثلا $Z = \sqrt{3} + \sqrt{3}i$

$x = 0$ يعني الزاويـــة $\frac{\pi}{2}$ مثلا $Z = \sqrt{3}i$

أما الإشارة تدل على الربع روح لـــدائرة المثلثيـــة كيما ديرنا المثال السابق عرفنا الزاوية والربع وحسبنا

3.مرافق عدد مركب $\bar{Z}$:

$Z = 4\sqrt{3} + 4\,i$ مرافقه $\bar{Z} = 4\sqrt{3} - 4\,i$

الطلعم أعكس إشارة الجزء التخيـــــــلي

4.الشكل الأسـي :

كي نحسب الطويلة والعمدة طبّق $Z = |Z|e^{\theta i}$

العدد المركب السابق $Z = -1 + \sqrt{3}i$ طويلته 2 وعمدته $\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$ نعوض في القانون يصبح $Z = 2e^{\frac{2\pi}{3}i}$ متقوليش برك هذه صعيبـــة

5.الشكل المثلثي :

كيـف نخوه طبق القـــــــــانون هـــذا

$$Z = |Z|(\cos\theta + i\sin\theta)$$

من المثال السابق $Z = -1 + \sqrt{3}i$ عندك الطويلة والعمدة طبّق $Z = 2(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3})$

6.الشكل الجبري :

هذا راهو مكتوب كتابة جبرية $Z = -1 + \sqrt{3}i$

المشكل كيفاه نروح من الأسي والمثلثي إلى الجبري

دير في بالك هذو $\frac{1}{2} = 0.5$ و $\frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866$ و $\frac{\sqrt{2}}{2} = 0.707$ هذو الزوايا الشهيرة باه تجينا ساهلة الانتقال من الأسي والمثلثي إلى الجبري شوف المثال

$$Z = 2e^{\frac{2\pi}{3}i} = 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$Z = 2(-0.5 + i0.866)$$

$$Z = 2\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -1 + \sqrt{3}i$$

7.عفايس الشكل $\frac{Z_A - Z_B}{Z_C - Z_B} = a$:

أ. إذا كان $\frac{Z_A - Z_B}{Z_C - Z_B} = ai$:

a سالب فإن الزاوية هي $-\frac{\pi}{2}$

a موجب فإن الزاوية هي $\frac{\pi}{2}$

1. إذا كانت $a = 1$ أو $a = -1$ في هذه الحالة نقول أن المثلث ABC قائم في B و متساوي الساقين

2. إذا كانت $a \neq 1$ و $a \neq -1$ في هذه الحالة نقول أن المثلث ABC قائم في B فـــــــقط

mohammed abound

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

ب. إذا كان $i+\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}=\frac{Z_A-Z_B}{Z_C-Z_B}$:

باين المثلث ABC متقايس الأضلاع

ج. إذا كان $a=\frac{Z_A-Z_B}{Z_C-Z_B}$:

إذا لقيت a عدد حقيقي يعني أن النقط C. B. A على استقامة واحدة يعني $\overrightarrow{BA}=a\overrightarrow{BC}$

د. إذا كان $a=\frac{Z_A-Z_B}{Z_C-Z_B}$

نقدرو نكتبوه من الشكل $z_A-z_B=a(z_C-z_B)$

نقولو يوجد تحويل نقطي وطبيعته حسب السيد a

ملحوظة: $\frac{Z_A-Z_B}{Z_C-Z_D}=\pm 1$

تلقاه 1 نقولو ABDC متوازي أضلاع $\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{DC}$

تلقاه -1 نقولو ABCD متوازي أضلاع $\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CD}$

8. تفسير الهندسي لشكل $\frac{Z_A-Z_B}{Z_C-Z_B}=a$:

1. الطويلة : $|BA|=a|BC|$

2. العمدة : $arg(a)=(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BA})$

9. دستور موافر:

$$Z^n=|Z|^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$$

ساعات يقلك اوجد قيمة n حتى يكون:

يكون Z^n حقيقي صرفا: يعني $\sin n\theta=0$

وهذا يكافئ $n\theta=k\pi$ ومنبعد جيب قيمة n

إذا كان k زوجي يولّي Z^n حقيقي موجب

إذا كان k فردي يولّي Z^n حقيقي سالب

يكون Z^n تخيلي صرفا: يعني $\cos n\theta=0$

وهذا يكافئ $n\theta=\frac{\pi}{2}+k\pi$ ومنبعد جيب n

إذا كان k زوجي يولّي Z^n تخيلي موجب

إذا كان k فردي يولّي Z^n تخيلي سالب

متنساش بلي n عدد طبيعي يعني k يكون طبيعي

ساعات يقلك أحسب مثلا: $Z=2e^{\frac{2016\pi}{3}i}$

$$Z=2e^{\frac{2016\pi}{3}i}=2(\cos\frac{2016\pi}{3}+i\sin\frac{2016\pi}{3})$$

$$Z=2(1+i0)=2$$

10. التحويلات النقطية:

العبارة المركبة

$Z'=\alpha Z+\beta$

α عدد حقيقي — α عدد مركب

نعرف الطبيعة حسب السيد α

$\|\alpha\|=1$ دوران	$\alpha=1$ انسحاب
$\|\alpha\|\neq 1$ تشابه مباشر	$\alpha\neq 1$ تحاكي

العناصر المميزة لتحويلات :

1. نسبته هي $|\alpha|$ بالنسبة لدوران والتشابه

أما بالنسبة لتحاكي والانسحاب النسبة هي α

2. الزاوية هي $arg(\alpha)$

3. المركز هو w حيث $z_w=\frac{\beta}{1-\alpha}$

ملاحظة : المركز w هو النقطة الصامدة يعني تحويلها هو نفسها معناه $Z_w=\alpha Z_w+\beta$

كي يقلك اوجد Z_C حيث C صورة A بالتحويل النقطي الذي مركزه B (دير في بالك بلي Z_C تجي في بلاصة Z') اكتب مباشرة الجملة

$$Z_C=\alpha Z_A+\beta$$

بالطرح تجيلك $Z_B=\alpha Z_B+\beta$

$$Z_C-Z_B=\alpha(Z_A-Z_B)$$

إذا عطاك مثلا دوران وقالك مركزه O دير في بالك بلي $\beta=0$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$ متنساش بلي $|\alpha|=1$ أي العبارة المركبة بالشكل الأسي هي $Z'=1e^{\frac{\pi}{2}i}Z$

وإذا حبيت تكتبها على الشكل الجبري $Z'=iZ$

11. المرجح G : $\{(A,-1)(B,2)(C,2)\}$

$$Z_G=\frac{-Z_A+2Z_B+2Z_C}{-1+2+2}$$

إذا قالك مركز ثقل مثلث هز المعاملات 1.1.1

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM
mohamed aboub

12. طبيعة الربـــــاعيات:

ليكن الرباعي ABCD



حيث قطراه $[AC]$ و $[BD]$

أ. متوازي أضـــــلاع:

يكفي أن نثبت أن القطران متناصـــــــــفان

أو $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ يعـــني $Z_B - Z_A = Z_C - Z_D$

ب. مستطـــــيل: لازم يكون فيه $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

إما أن تثبت أن القطران $[AC]$ و $[BD]$ متساويان

وموش متعامدان أو $AB \neq BC$ وزيد متعامدان

ج. المربـــــــع: لازم يكون فيه $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

إما أن تثبت أن القطران $[AC]$ و $[BD]$ متساويان

ومتعامدان أو $AB = BC$ وزيد متعامدان

د. المعـــــــين: لازم يكون فيه $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

إما أن تثبت أن القطران $[AC]$ و $[BD]$ مـــــوش

متساويان ومتعامدان أو $AB = BC$ وزيـــــد

مـــــــــــــوش متعامدان

ملاحظة: كي يكون عندك $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ وزيد

عندك هذا الشكل $\frac{Z_A - Z_B}{Z_C - Z_B} = ai$

نقدر نعرف الرباعي من طبيعة التحويل النقطـــي

الـــــــــدوران:

مـــربع $= \frac{\pi}{2}$

مـــعين $\neq \frac{\pi}{2}$

التشابه المبـــاشر:

مستـطيل $= \frac{\pi}{2}$


متوازي أضلاع $\neq \frac{\pi}{2}$

13. المثلثـــــــات:

أحسب الأطوال $AB = AC = BC$

باين نقول أن المثلث ABC

متقايس الأضلاع



وإذا كان $AB^2 + AC^2 = BC^2$ نقولو أن

المثلث ABC قائم في A وإذا كان $AB = AC$ زيد

متساوي السـاقين

14. مجموعات النقط:

1. إذا لقيت $GM = 3$.....

نقولو مجموعة النقط M هي دائرة مركزها G

ونصف قطرها 3 .. (ياو رانا في الأعداد المركبة

رد بالك تقـــــــــول سطح كرة)

2. إذا لقيت $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BM} = 0$.....

نقولو مجموعة النقط M هي دائرة قطرها $[AB]$

3. إذا لقيت $\overrightarrow{GM}.\overrightarrow{AB} = 0$.....

نقولو مجموعة النقط M هي مستقيم الذي يشمل

النقطة G والشعاع $\overrightarrow{AB}$ ناظمي عليه

4. إذا لقيت $|Z - Z_A| = |Z - Z_B|$ .....

يعني $AM = BM$ نقولو مجموعة النقط M هي

مستقيم الذي هو محور القطعة $[AB]$ أو نقول

هو المستقيم الذي يشمل منتصف $[AB]$ والشعاع

$\overrightarrow{AB}$ عمـــــــــــــــــودي عليه

5. إذا لقيت $arg(Z - Z_A) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ....

نصف مستقيم $[AM)$ مبدؤه النقـــــطة A

6. إذا لقيت $Z - Z_A = 2e^{\theta i}$ .....

هنا الطول ثابت وهو 2 ولكن الزاوية متغيرة يعني

راح ترسملنا دائرة مركزها A ونصـــــف قطرها 2

....

أكثروا من الصلاة والسلام على النبي

المختار يفتح الله عليكم أبواب رحمته

ويشرح صدوركم ويزيل همومكم ويرفع

مقامكم إلى الدرجات العلى والمنازل

الشريفة

mohamed abdo

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الهندسة الفضائية

1. المسافة بين نقطتين:

$A(2;3;5)$ و $B(-1;4;2)$

$$AB = \sqrt{(-1-2)^2 + (4-3)^2 + (2-5)^2}$$

$$AB = \sqrt{(-3)^2 + (1)^2 + (-3)^2}$$

$$AB = \sqrt{19}$$

المسافة AB هي نفسها BA كيف كيف

2. المسافة بين نقطة ومستوي:

لتكن النقطة $A(-2;3;4)$ والمستوي (P)

$$(P): x + 2y - 3z - 6 = 0$$

$$d = \frac{|1(-2) + 2(3) - 3(4) - 6|}{\sqrt{(1)^2 + (2)^2 + (-3)^2}}$$

$$d = \frac{|-14|}{\sqrt{14}} = \frac{14}{\sqrt{14}} = \sqrt{14}$$

3. شرطي التعامد والتوازي:

هما قلب الهندسة الفضائية

أ. شرط التعامد : $\vec{u}(2;3;-2)$ و $\vec{v}(1;2;4)$

نقول على أن $\vec{u}$ و $\vec{v}$ متعامدان إذا كان $\vec{v}.\vec{u} = 0$

$$1(2) + 2(3) + 4(-2) = 0$$

ومنه الشعاعان $\vec{u}$ و $\vec{v}$ متعامدان

ب. شرط التوازي : $\vec{u}(2;-1;4)$ و $\vec{v}(6;-3;12)$

نقول على أن $\vec{u}$ و $\vec{v}$ متوازيان إذا كان $\vec{v} = k.\vec{u}$

$$\frac{6}{2} = \frac{-3}{-1} = \frac{12}{4} = 3$$

ومنه الشعاعان $\vec{u}$ و $\vec{v}$ متوازيان

ملحوظة:

نقول على أن النقط A ، B و C تعين مستو أو ليست على استقامة واحدة يكفي فقط أن تثبت بلي $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ غير مرتبطين خطيا يعني غير متوازيان

4. معادلة ديكارتية لمستوي:

أ. يشمل A و $\vec{n}$ ناظمي له :

المستوي يفوت بالنقطة $A(-2;1;4)$

و $\vec{n}(5;-4;3)$ ناظمي عليه شوف اكتب الشكل العام للمستوي وعوض

الشكل العام $(p): ax + by + cz + d = 0$

عوض الناظمي فتجد $5x - 4y + 3z + d = 0$

عوض النقطة A تلقى قيمة d

$$5(-2) - 4(1) + 3(4) + d = 0$$

يكافئ $d = 2$ ومنه المعادلة هي

$$(p): 5x - 4y + 3z + 2 = 0$$

ب. يشمل النقط A ، B و C :

$A(1;1;-1)$، $B(2;3;2)$ و $C(-1;2;4)$

نفرض الناظمي $\vec{n}(a;b;c)$ و لدينا $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ شعاعي توجيه المستوي وديما يكونو معامدين لناظمي $\vec{n}$ معناه كي تظربهم في الناظمي الناتج 0

$\vec{n}$ يعامد $\overrightarrow{AB}$ يعني أن $\overrightarrow{AB}.\vec{n} = 0$

$\vec{n}$ يعامد $\overrightarrow{AC}$ يعني أن $\overrightarrow{AC}.\vec{n} = 0$

$$\begin{cases} a + 2b + 3c = 0 \\ -2a + b + 5c = 0 \end{cases}$$ افرض a او b او c

وساويها مثلا بـ 1 ثم حل الجملة تلقى البقية


كي تلقى الناظمي $\vec{n}$ وعندك واحدة من هذوك النقط A ، B و C نفس خطوات المستوي لي قبلو (p)

ج. يشمل A ويعامد مستقيم (Δ) :

دير في بالك بلي $\vec{u}$ شعاع توجيه المستقيم (Δ) هو يعتبر الناظمي $\vec{n}$ تاع المستوي وعندك النقطة A

هاواش قاعد تستنى !!!!

د. مستوي يحوي مستقيم (Δ) ويوازي (D) :



يعتبر $\vec{u}_\Delta$ و $\vec{u}_D$ هما شعاعي توجيه المستوي (p)

mohamed aboub

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

روح جيب بيهم الناظمي $\vec{n}$ ومنبعد افرض قيمة للوسيط t وعوضها في المستقيم (Δ) تلقى نقطة يفوت بيها (Δ) ويريد يفوت بيها المستوي (p) أيا كمل الخطوات يريك السماطة

5.تمثيل وسيطي لمستوي:

لازم يكون عندك زوج أشعة توجيه ونقطة مثلا $\vec{u}(2;3;-2)$ و $\vec{v}(1;2;5)$ و $A(-1;7;4)$ نقولو نفرض أن $M \in (p)$ ومنبعد نكتب

$$\overrightarrow{AM} = t\vec{u} + k\vec{v}$$

$$(t \in R)(k \in R) \begin{cases} x = 2t + k - 1 \\ y = 3t + 2k + 7 \\ z = -2t + 5k + 4 \end{cases}$$

6.تمثيل وسيطي لمستقيم (Δ):

أ. يشمل A و$\vec{u}$ توجيها له:

لازم يكون عندك شعاع توجيه ونقطة مثلا $\vec{u}(5;3;-2)$ و $A(3;-2;4)$ أيا نقولو نفرض أن $M \in (\Delta)$ ومنبعد نكتب $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$

$$(t \in R) \begin{cases} x = 5t + 3 \\ y = 3t - 2 \\ z = -2t + 4 \end{cases}$$

ب. يشمل النقطتين A وB:

دير في بالك بلي $\overrightarrow{AB}$ هو نفسه $\vec{u}$ شعاع توجيه المستقيم (Δ) وعندك زوج نقاط A وB عوض واحدة فيهم وربي يعوضلك الأيام الحلوة

ج. يشمل A ويعامد مستوي (p):

منبقاوش نعاودو في الهدرة عندك الشعاع الناظمي $\vec{n}$ نتاع (p) يعتبر شعاع توجيه المستقيم (Δ) وعندك النقطة A أيا توكل على ربي

7.معادلة سطح كرة (S) :

اذا كان عندك المركز و القطر راك ديرت لافير


أ. مركزها W ونصف قطرها R :

لازم تكون $M \in (S)$ ولازم تقلو بلي $WM = R$

نفرض المركز $W(5;3;-7)$ ونصف القطر $R = 2$

$$(x-5)^2 + (y-3)^2 + (z+7)^2 = 2^2 = 4$$

ب. عندك قطرها مثلا هو $[AB]$:



لازم تكون $M \in (S)$

في هذه الحالة يولي الشعاعان $\overrightarrow{AM}$ و$\overrightarrow{BM}$ متعامدان أي

$$\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BM} = 0$$


إذا حبيت أحسب المركز W وهو منتصف القطعة $[AB]$ وأحسب الطول AB وأقسمو على 2 هو نصف القطر وأحدم بالقانون الأول

8.عفايس المستوي و المستقيم:

$\vec{u} \;//\; \vec{n}$ يعني $(\Delta) \perp (p)$


$\vec{u} \perp \vec{n}$ يعني $(\Delta) \;//\; (p)$

وإذا قالك بيّن أن المستقيم (Δ) يعامد المستوي (ABC) شوف معايا



اثبت أن الناظمي $\vec{n}$ نتاع المستوي يوازي التوجيه نتاع $\vec{u}$ المستقيم أو اثبت بلي $\vec{u}$ التوجيه نتاع المستقيم يعامد $\overrightarrow{AB}$ و$\overrightarrow{AC}$ شعاعي توجيه نتاع المستوي...اسمحلي إذا كسرتلك راسك

9.إحداثيات المسقط العمودي أو تقاطع مستقيم ومستوي أو نقطة تماس سطح كرة مع مستوي:



في الحالات الثلاث نجيبو تمثيل وسيطي للمستقيم

mohammed abdoun

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM


ونعوضوه في معادلة المستوي (p) نلقاو قيمة t ومنبعد نعوضو t في التمثيل الوسيطي نتاع المستقيم نلقاو النقطة H لازمك دير في بالك بلي المستقيم يعامد المستوي معناه الناظمي نتاع المستوي هو التوجيه نتاع المستقيم ....هكا هو

10. المسافة بين نقطة ومستقيم:

هنا لازمك تحط راسك معايا قول بسم الله

أ. إذا كان المستويان متعامدان ومتقاطعان وفق مستقيم:

حسب نظرية الشيخ فيثاغورث $d^2 = {d_1}^2 + {d_2}^2$




حيث أن d_1 هي المسافة بين A والمستوي (p_1) و d_2 هي المسافة بين A والمستوي (p_2) و أن d هي المسافة بين A والمستقيم (Δ)

ب. إذا كان معندكش المستويان:

1. الطريقة الأولى : روح أكتب المستقيم على شكل نقطة M شوف معايا وتعلم واش راح نديرو

$M \in (\Delta)$ وعندك $\begin{cases} x = 5t + 3 \\ y = 3t \\ z = -2t + 4 \end{cases}$ (Δ)

يعني تولّي M هكا $M(5t+3; 3t; -2t+4)$




راك تشوف الشعاع $\overrightarrow{AM}$ يعامد شعاع $\vec{u}$ توجيه المستقيم (Δ) مالا روح أكتب الشعاع $\overrightarrow{AM}$ بدلالة t ومنبعد طبق قانون التعامد $\overrightarrow{AM}.\vec{u} = 0$ تلقى قيمة الوسيط t ومنبعد عوض t في النقطة M تلقى النقطة M ومنه المسافة هي الطول AM

2. الطريقة الثانية : هنا لازمك تكتب ديغاكت الطول AM بدلالة t تجيك دالة نتاع جذر روح اشتقها والقيمة أكبر هي المسافة بين A و (Δ)....اسمع متقول كتى واحد خليها بيناتنا

11. مساحة مثلث ABC :

إذا كان المثلث كيفي ABC

وعندك زاوية من زواياه



طبق القانون

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} AB.AC.\sin\alpha$$

أما إذا كان $\alpha = 90^0$ فان المثلث يصبح قائما يكفي أن نكتب $S_{ABC} = \frac{1}{2} AB.AC$

12. حجم رباعي الوجوه DABC :

مساحة القاعدة وهي مساحة المثلث في الارتفاع و يكون عمودي على المثلث نقسمهم على 3

نفرض أن AD عمودي على المثلث ABC اذن

$$V_{DABC} = \frac{S_{ABC} \cdot AD}{3}$$

13. الأوضاع النسبية :

أ. الوضع النسبي لمستقيم ومستوي:

نعوض التمثيل الوسيطي للمستقيم في المعادلة الديكارتية للمستوي

1. إذا لقيت قيمة للوسيط t معناه يتقاطعو في نقطة تقدر تروح تجيبها

2. إذا لقيت تناقض مثلا تجيك $0 = 3$ باين بلي مايتقاطعوش وتقاطعهم مجموعة خالية

3. إذا لقيت أن المعادلة محققة دوما مثلا تجيك $0 = 0$ يعني أن المستقيم محتوى في المستوي أو نقول بلي هو أحد مستقيمات المستوي

4. روح اقرا العنوان 8 عفايس المستقيم والمستوي

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

ب. الوضع النسبي لمستقيم وسطح كرة:

ياحليلو لي نسى المميز Δ لازماتو عقوبة في حق طاط

نعوضو التمثيل الوسيطي للمستقيم في معـــادلة سطح كرة تجينا معادلة من الدرجة الثانية بدلالة الوسيط t نحسبها بالمميز Δ المميز نتـــاع بكري

1. إذا لقيت المميز $\Delta < 0$ لا يوجد تقـــاطع
2. إذا لقيت المميز $\Delta = 0$ نقولو بلي المستـــقيم يمس سطح الكرة في نقـــطة واحدة
3. إذا لقيت المميز $\Delta > 0$ باين تقاطع في نقطتين تقدر تروح تحسبهم متكسرليش راسي من فضلك

ج. الوضع النسبي لمستوي وسطح كرة:

نحسب المسافة بين المستوي ومركز سطـح الكرة

1. إذا لقيت المسافة أكبر من نصف القطر معناه مكانش تقاطع أي تقاطعهم مجموعة خـــالية
2. إذا لقيت المسافة تساوي نصف القطر معناه تماس أي المستـــوي يمس سطح الكرة
3. إذا لقيت المسافة أصغر من نصف القطر معناه المستوي يقـــطع سطح الكرة في دائرة

د. مستقيـــمان من نفس المستوي أو ليسا من نفس المستوي:

1. إذا كان المستقيمان متوازيان فهما من نفس المستوي هذه ديرها في بالك صحـــيت
2. إذا كان موش متوازيان هنا فيها حالتين نروحو نساويهم مع بعض

$$x = x \;..(1)$$
$$y = y \;..(2) \qquad (\Delta) \quad (D)$$
$$z = z \;..(3)$$

راهم عندك ثلاث معادلات من المعادلتـــين (1) و (2) جيب قيمة الوسيطين t و k وعوضهم في المعـــادلة (3)

- إذا كانت محققة نقولو من نفس المستوي
- موش محققة موش من نفس المستـــوي

14. مجموعـــات النقط :

أغلبيتهم عندهم علاقة بالمرجح و ياحليلولي موش فاهم المرجح بصح ساهلة متخـــافش

1. إذا لقيت $GM = 3$.....

نقولو مجموعة النقط M هي سطح كرة مركزها G ونصف قطـــرها 3

2. إذا لقيت $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BM} = 0$.....

نقولو مجموعة النقط M هي سطح كرة قطرها $[AB]$

3. إذا لقيت $\overrightarrow{GM}.\overrightarrow{AB} = 0$.....

نقولو مجموعة النقط M هي مستوي الذي يشمل النقطة G والشعاع $\overrightarrow{AB}$ ناظمي عليـــه

4. إذا لقيت $AM = BM$.....

نقولو مجموعة النقط M هي مستوي الذي هـــو محور القطعة $[AB]$ أو نقول هو المستوي الذي يشمل منتصف $[AB]$ والشعاع $\overrightarrow{AB}$ ناظمي لـــه

أيا كان فهمتني مبـــروك عليك الباك



.....

ممكن تكون هناك أخطاء ســـواء في الحساب أوسهوا فإن أصبـــت فمـــن الله و إن أخطأت فمـــن نفسي والشيطان

وصيتي الأخيرة لك اكتب اســـمك في قائمة الناجحين من أجل والـــديك ومن اجل الناس لي ماتحبكش تنجح دير لقـــلب واسمع كلامي وبرهنلهم بلي تقـــدر تنجح كل هذا من أجلك ماتحشمنيش صحيت

ناجحون بإذن الله

mohammed aboud

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

دعـــــــــاء بداية المذاكرة

اللهم إني أسألك فهم النبيين ، وحفظ الملائكة المقربين ، وأن تجعل لساني عامراً بذكرك ، وقلبي بخشيتك ، وبدني بطاعتك فأنت حسبي ونعم الوكيل

دعـــــــــاء النهاية من المذاكرة

اللهم إني استودعتك علمي هذا أمانة عندك على أن ترده إليّ وقت حاجتي إليه .

دعـــــــــاء دخول لجنة الإختبار أو الامتحان

اللهم إني توكلت عليك، وأسلمت أمري إليك ، لا ملجأ منك إلا إليك ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا .

دعـــــــــاء عند الإجابة عن الامتحان

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً ، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا .

اللهم رد لي ما استودعته أمانة عندك

دعـــــــــاء عند التفكير أو النسيان

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ياحي ياقيوم برحمتك استغيث

ربي يـــــــسر ولا تعـــــــــسر .

دعـــــــــاء الانتهاء من الإمتحان

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

دعـــــــــاء الحفظ

اللهم يامعلم إبراهيم علمني ، ويا مفهم سليمان فهمني ،

ويا مصبّر أيوب صبّرني ، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتني الحكمة وفصل الخطاب

اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني .

دعـــــــــاء الفهم

سبحان الله ، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

mohammed aboub

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

آخر كلامي

لست الأفضل ولكن لي

أسلوبي 😌 سأظل دائما أتقبل

رأي الناقد والمتهكّم 😡

فالأول يصحح مساري 😋

والثاني 😠 يزيد من إصراري

لا تنسونا بخالص دعائكم 😍

mohammed abboub

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM