التمرين ❶

ثلاثي غليسريد (TG) له قرينة يود I_i= 185,67 ، يتكون من الحمض الدهني المشبع (A)والحمضين الدهنيين الغير مشبعين (C) و(B) .

①تعديل 4,4g من الحمض الدهني A يتطلب حجم 50ml من KOH (1N) .

أ-احسب الكتلة المولية للحمض الدهني A .

ب-استنتج الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني A .

②أكسدة الحمض الدهني (B)تعطي على الترتيب **5** أحماض كربوكسيلية a ,b,c,d,e حيث b,c,d أحماض كربوكسيلية متماثلة لها نفس الصيغة نصف المفصلة .

✓الحمض الكربوكسيلي a احادي الوظيفة كتلته المولية نسبة الكربون به 62 ,07% .

✓الاحماض الكربوكسيلية المتماثلة(b,c,d) نسبة الأكسجين في كل واحد منها 61,54% .

✓الحمض الكربوكسيلي e ثنائي الوظيفة كتلته المولية 132g/mol

أ- جد الصيغ نصف المفصلة للأحماض الكربوكسيلية a,b,c,d,e

ب- أكتب الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني (B).

③الحمض الدهني (C)صيغته من الشكل : $CH_3\text{-}(CH_2)_x\text{-}CH{=}CH\text{-}(CH_2)_7\text{-}COOH$

أ-احسب الكتلة المولية لثلاثي الغليسريد .

ب-استنتج الكتلة المولية للحمض الدهني(C) وصيغته نصف المفصلة .

ج- أعط الصيغ المحتملة لثلاثي الغليسريد .

د-أحسب قرينة التصبن لثلاثي الغليسريد .

✓يعطى :

$M_I = 127g.mol^{-1}$, $M_K = 39g.mol^{-1}$, $M_O = 16g.mol^{-1}$, $M_C = 12g.mol^{-1}$, $M_H = 1g.mol^{-1}$

التمرين ❷

I- ثلاثي غليسيريد TG له دليل أستر $Ie = 242,5$ مشكل من 2 مول من الحمض الدهني A و مول واحد من الحمض الدهني B حيث عدد ذرات الكربون بالحمض الدهني A يساوي ضعفين عدد ذرات الكربون بالحمض الدهني B إذا علمت أن : $(Ii\ A,B = 0)$.

1-احسب الكتلة المولية لثلاثي الغليسيريد TG .

2-أوجد الصيغ نصف المفصلة للحمضين الدهنيين A,B

3- اكتب الصيغ نصف المفصلة المحتملة لثلاثي الغليسيريد TG .

II- تتفاعل كتلة $m = 2,96g$ من ثنائي الغليسيريد DG مع $V = 100mL$ من البوتاس تركيزه $C = 0,1mol/L$

1- أحسب الكتلة المولية لثنائي الغليسيرد DG .

2-يتكون ثنائي الغليسيريد DG من الحمض الدهني A و الحمض الدهني C ، أكسدة الحمض الدهني C ببرمنغنات البوتاسيوم وحمض الكبريت تنتج : حمضين ثنائي الوظيفة E,D و حمض أحادي الوظيفة F .

- الحمض الدهني D نسبة الكربون به $C\% = 57,45$.

- تعديل $m_E = 0,52g$ من الحمض الدهني E يلزم $m = 0,4g$ من NaOH.

أ-استنتج الصيغ نصف المفصلة للاحماض الدهنية F,E,D و الحمض الدهني C

ب-اكتب الصيغ نصف المفصلة المحتملة لثنائي الغليسيريد DG .

ج-أحسب دليل التصبن Is و اليود له Ii .

III - زيت نباتي مشكل من 75% من ثلاثي الغليسيريد TG و20% ثنائي الغليسيريد و5% من الحمض الدهني C .

-أحسب دليل التصبن ، الحموضة و اليود للزيت النباتي .

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

السلسلة 03 في مادة هندسة الطرائق أحماض دهنية و ليبيدات

التمرين ❸

I. -تتفاعل عينة من ثلاثي غليسيريد TG تزن 1 ,766 g مع 12 mL من البوتاس تركيزه 0,5mol/L و تثبت 6.10^{-3} mol من اليـــود I_2 .

① أحسب الكتلة المولية لثلاثي الغليسيريد TG.

$M_{KOH}=56, 1g/mol$

② عين عدد الروابط المضاعفة الموجودة به .

③ عين الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني المشكل لثلاثي الغليسيريد باعتباره متجانس .

④ أكتب الصيغة نصف المفصلة لثلاثي الغليسريد واحسب قرينتي اليود و التصبن له . $MI_2=254g/mol$

التمرين ❹

I- ① حمض دهني (A) قرينة حموضته Ia=220,47 صيغته من الشكل

$CH3-(CH_2)_X-CH=CH-(CH_2)_Y-COOH$

أكسدته بواسطة $KMnO_4$ المركز و الوسط الحمضي تعطي حمض ثنائي الوظيفة وحمض أحادي الوظيفة له 7 ذرات كربون

أ- أوجد الصيغته نصف المفصلة للحمض الدهني (A) .

ب – أحسب قرينـــة (دليل) اليود Ii له

② ثنائي غليسريد (DG) يتكون من الحمض الدهني (A) وحمض دهني(B) مشبع نسبة الكربون به 75%

أ- أوجد الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني (B).

ب- اكتب الصيغ نصف المفصلة الممكنة لثنائي الغليسريد (DG).

ج- أحسب دليل اليود Ii ودليل التصبن Is لثنائي الغليسريد (DG).

د- اكتب معادلة تفاعل هدرجتـــه .

③ زيت نباتي يتكون من 5% من الحمض الدهني (A) و40% من ثنائي الغليسريد (DG) و 55% من ثلاثي غليسريد (TG) متجانس كتلته المولية 722g/mol مشكل من الحمض الدهني المشبع (D)

أ- اكتب المعادلة العامة لاماهة ثلاثي الغليسريد (TG).

ب – أوجد الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني (D) و استنتج صيغة ثلاثي الغليسيريد (TG)

ج-أحسب دليل الحموضة Ia ، دليل التصبن Is ،دليل الأسترة Ie ودليل اليود Ii للزيت النباتي .

التمرين ❺

I. 1. لمعرفة صيغة غليسيريد أحادي (MG)قرينة اليود له $I_i = 216,47$ وكتلته المولية هي: $M(MG) = 352g/mol$ يتكون من الغليسيرول وأحد الأحماض الدهنية الآتية:

الحمض A $CH_3-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_7-COOH$

الحمض B. $CH_3-(CH_2)_{18}-COOH$

الحمض C:

$CH_3-CH_2-CH=CH-CH_2-CH=CH-CH_2-CH=CH-(CH_2)_7-COOH$

استنتج عدد الروابط المضاعفة في الغليسيرد الأحادي واستنتج الحمض الدهني المشكل له.

أ- أكتب الصيغ المحتملة لـ (MG).

ب- أحسب قرينة تصبن احادي الغليسريد(MG).

2. مادة (Y) تتكون من 85% من غليسيريد أحادي (MG) السابق و 15% حمض دهني (B)غير مرتبط

- أحسب قرينة الحموضة I_a للمادة (Y).

education-onec-dz.blogspot.com
قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM