

سنة **ثالثة** ثانوي

الشعب:

علوم تجريبية | تقني رياضي | رياضيات

مسائل [22 مسألة]

في الدوال اللوغارتمية

مرفقة بحلول مفصلة

$\ln x$

إعداد الأستاذ:

قويسم إبراهيم الخليل

آخر تحديث:

[21 ديسمبر 2021]

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

المسائل:

فهرس المحتويات:

المسألة رقم 01 : المسألة الحل

المسألة رقم 02 : المسألة الحل

المسألة رقم 03 : المسألة الحل

المسألة رقم 04 : المسألة الحل

المسألة رقم 05 : المسألة الحل

المسألة رقم 06 : المسألة الحل

المسألة رقم 07 : المسألة الحل

المسألة رقم 08 : المسألة الحل

المسألة رقم 09 : المسألة الحل

المسألة رقم 10 : المسألة الحل

المسألة رقم 11 : المسألة الحل

المسألة رقم 12 : المسألة الحل

المسألة رقم 13 : المسألة الحل

المسألة رقم 14 : المسألة الحل

المسألة رقم 15 : المسألة الحل

المسألة رقم 16 : المسألة الحل

المسألة رقم 17 : المسألة الحل

المسألة رقم 18 : المسألة الحل

المسألة رقم 19 : المسألة الحل

المسألة رقم 20 : المسألة الحل

المسألة رقم 21 : المسألة الحل

المسألة رقم 22 : المسألة الحل

بالتوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا

قلم الجزائر

WWW.DZPEN.COM



I) نعتبر الدالة g المعرفة على $]-1;+\infty[$ كما يلي:

$$g(x)=x^2+2x+\ln(x+1)$$

1. ادرس تغيرات الدالة g
2. احسب $g(0)$ ، ثمّ استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ:

$$f(x)=x-\frac{\ln(x+1)}{x+1}$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i};\vec{j})$

1.
   أ/ احسب $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\ >}} f(x)$ ثم فسر النتيجة هندسيا
   ب/ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$
2. بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) في جوار $+\infty$
3. ادرس الوضع النسبي بين المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ)
4. بيّن أنّه من أجل كل x من المجال $]-1;+\infty[$:

$$f'(x)=\frac{g(x)}{(x+1)^2}$$

ثم شكل جدول تغيرات الدالة f

5. بيّن أنّ المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يُطلب تعيين إحداثييها
6. مثل بيانيا المنحنى (C_f)

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM



المسـألة رقم: 02

مشاهـــدة الحـــل

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ:

$$g(x) = x\ln x - x - 1$$

1. ادرس تغيرات الدالة g، ثم شكل جدول تغيراتها
2. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في $]0;+\infty[$ حيث: $3.5 < \alpha < 3.6$
3. استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ:

$$f(x) = 1 - \frac{\ln x}{x+1}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{\imath},\vec{\jmath})$

1. احسب نهايات الدالة f ، ثم فسر النتائج المحصل عليها هندسيا
2.
   أ/ بيّن أن إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$
   ب/ استنتج تغيرات الدالة f، ثم شكل جدول تغيراتها
3. اثبت أنّ $f(\alpha) = 1 - \frac{1}{\alpha}$، ثم أعط حصرا لـ $f(\alpha)$
4. اكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1
5. مثّل بيانيا كلا من (T) و (C_f)

III) نعتبر المستقيمات (Δ_m) المعرفة بالمعادلة $y = mx + \frac{3}{2}$

1. بيّن أنّ المستقيمات (Δ_m) تشمل نقطة ثابتة، يطلب تعيين إحداثييها
2. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة:

$$f(x) = y_{(\Delta_m)}$$

IV) لتكن الدالة h المعرفة على $]1;+\infty[$ كما يلي:

$$h(x) = -\frac{\ln(x-1)}{x}$$

و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق

1. تحقق أنّ $h(x) + 1 = f(x-1)$
2. استنتج أن (C_h) هو صورة (C_f) بواسطة تحويل نقطي يطلب تعيينه

الخليل للرياضيات

قسم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

03 المسـألة رقم:

مشاهـــدة الحـــل

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1;1\}$ بـ:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\ln|x|}+x & ;\ x\in\mathbb{R}_-^*-\{-1\}\\ \dfrac{1}{\ln x}-\dfrac{1}{2(\ln x)^2} & ;\ x\in\mathbb{R}_+^*-\{1\}\\ 0 & ;\ x=0\end{cases}$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$.

1. ادرس قابلية اشتقاق الدالة f في $x_0=0$ ، فسر النتيجة هندسيا.
2. ادرس تغيرات الدالة f .
3.
   أ/ بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) بجوار $-\infty$ يطلب تعيين معادلته .
   ب/ ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) على المجال $\mathbb{R}_-^*-\{-1\}$.
4. حل المعادلة: $f(x)=0$ في المجال $\mathbb{R}_+^*-\{1\}$ ، ماذا تستنتج بالنسبة للمنحنى (C_f) ؟
5. بين أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α في المجال $\left]-2;-\frac{3}{4}\right[$.
6. مثل بيانيا (Δ) و المنحنى (C_f) .
7. نعتبر المعادلة ذات المجهول x والوسيط الحقيقي m التالية:

$$f(x)=-(m^2-e)\ ...(E)$$

- ناقش بيانيا حسب قيم m عدد واشارة حلول المعادلة (E) .

الخليل للرياضيات

قسم الجزائر
WWW.DZPEN.COM



I) g دالة عددية معرفة على $]0;+\infty[$ بـ:

$$g(x) = -x^2 - 2 + 2\ln x$$

1

أ/ احسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} g(x)$

ب/ علما أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{\ln x}{x^n}\right) = 0$ ، بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$

2 ادرس اتجاه تغير الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها

3 احسب $g(1)$، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ:

$$f(x) = -x + 5 - 2\frac{\ln x}{x}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$

1

أ/ احسب نهاية الدالة f عند 0 و $+\infty$

ب/ ادرس تغيرات الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

2

أ/ برهن أنّ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -x + 5$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$

ب/ ادرس الوضع النسبي بين (Δ) و (C_f)

3

أ/ بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $4.3 < \alpha < 4.4$

ب/ برّر أنّ $\ln\alpha = \frac{-\alpha^2+5\alpha}{2}$

4 بيّن أنه يوجد مماس (T) لـ (C_f) يوازي (Δ)، ثم اكتب معادلة له

5 ارسم كل من (Δ)، (T) و (C_f)

6 ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي عدد حلول المعادلة: $(5-m)x - 2\ln x = 0$

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM



I) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1;1\}$ بجدول تغيراتها التالي:

x	$-\infty$	...	...	1	$\sqrt{3}$	...
$f'(x)$	...	0	...	‖	... 0	$+$
$f(x)$		$-\sqrt{3}-\ln(2+\sqrt{3})$ ↘ $-\infty$		‖	... ↗ $+\infty$	

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$.

❶ علما أن الدالة f فردية:

أ/ عيّن إشارة $f'(x)$ مع التبرير ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f .

ب/ بيّن أنّ: $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)]=-\infty$ وأنّ: $\lim\limits_{\substack{x\to1\\>}}[f(x)]=+\infty$ وأنّ $f(\sqrt{3})=\sqrt{3}+\ln(2+\sqrt{3})$

ج/ أكمل جدول تغيرات الدالة f السابق.

❷ نقبل أن المستقيم (D) ذو المعادلة $y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $\pm\infty$.

• مثّل بيانيا كل من المستقيم (D) والمنحنى (C_f) . نأخذ: $f(\sqrt{3})\cong 3$ و $(\sqrt{3})\cong 1.7$

❸ نفرض أن عبارة الدالة f هي من الشكل:

$$f(x)=ax+b+\ln\left(c+\frac{2}{x-1}\right)$$

حيث: a,b,c أعداد حقيقية.

- باستعمال نتائج الجدول أعلاه، بيّن أنّ : $a=1$ ، $b=0$ و $c=1$.

❹ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد واشارة حلول المعادلة (E) ذات المجهول x التالية:

$$x-\frac{e^m+e^x}{e^m-e^x}=0\ ...\ (E)$$

II) نعتبر الدالة g المعرفة على $]1;+\infty[$ كما يلي:

$$g(x)=\ln(f(x))$$

• ادرس تغيرات الدالة g

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM



I) نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$g(x) = -3 - \ln x + \frac{1}{x}$$

1. احسب نهاية الدالة g عند كل حد من حدود مجموعة تعريفها.
2. ادرس تغيرات الدالة g على $]0;+\infty[$، ثم شكل جدول تغيراتها.
3.
   أ/ بيّن أنّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]0;+\infty[$
   ب/ تحقق أنّ $0.45 < \alpha < 0.46$
   ج/ استنتج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$

II) لتكن الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي:

$$f(x) = e^{-x}(3 + \ln x)$$

و نسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$

1. احسب نهايات الدالة f عند 0 و $+\infty$، ثم فسر النتائج هندسيا.
2. ادرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكل جدول تغيراتها
3. بيّن أنّ $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha e^{\alpha}}$، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$
4. حل المعادلة $f(x) = 0$، ثم فسر النتيجة هندسيا
5. أنشئ المنحنى (C_f)

III) نعتبر الدالة h المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ:

$$h(x) = \frac{|3 + \ln x|}{e^x}$$

1. اكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة
2. أنشئ (C_h) المنحنى الممثل للدالة h في نفس المعلم السابق

الخليل للرياضيات

قسم الجزائر
WWW.DZPEN.COM



I) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي:

$$f(x)=x+\frac{1}{2}-\ln x+\frac{1}{2}(\ln x)^2$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$.

1

أ/ احسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}}[f(x)]$، ثم فسر النتيجة هندسيا.

ب/ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]$.

2

أ/ بيّن أن لكل x من المجال $]0;1]$ $(x-1)+\ln x\leq 0$ وأن لكل x من المجال $[1;+\infty[$: $(x-1)+\ln x\geq 0$.

ب/ بيّن أنه من أجل كل من المجال $]0;+\infty[$:

$$f'(x)=\frac{x-1+\ln x}{x}$$

ج/ شكل جدول تغيرات الدالة f .

3 ادرس الوضع النسبي بين المستقيم (D) ذو المعادلة $y=x+\frac{1}{2}$ والمنحنى (C_f) .

4 عين احداثيي النقطة ω من (C_f) التي يكون فيها المماس (T) موازيا للمستقيم (D) ، ثم اكتب معادلة المستقيم (T) .

5

أ/ بين أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$:

$$f''(x)=\frac{2-\ln x}{x^2}$$

ب/ استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين احداثييها.

6 مثل بيانيا كلا من (D) ، (T) و (C_f) .

7 ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة :

$$f(x)=x-2m$$

قسم الجزائر
WWW.DZPEN.COM



المسـألة رقم:

مشاهـــدة الحـــل

I) لتكن الدالة g المعرفة على $]-1;+\infty[$ كما يلي:

$$g(x)=\frac{x}{x+1}-2\ln(x+1)$$

1. احسب نهايات الدالة g عند أطراف مجموعة تعريفها.
2. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.
3.
   أ/ احسب $g(0)$.
   ب/ بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين أحدهما α حيث: $-0.72<\alpha<-0.71$
   ج/ استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]-1;+\infty[$.

II) لتكن الدالة f المعرفة على المجال: $D_f=]-1;0[\cup]0;+\infty[$ كما يلي:

$$f(x)=\frac{\ln(x+1)}{x^2}$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها. ثم فسر النتائج هندسيا.
2.
   أ/ بين أنه من أجل كل x من D_f:

$$f'(x)=\frac{g(x)}{x^3}$$

   ب/ استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها
3. بيّن أن:

$$f(\alpha)=\frac{1}{2\alpha(\alpha+1)}$$

   ثم أعط حصر للعدد $f(\alpha)$ بالتدوير إلى 10^{-2} .
4. مثل بيانيا (C_f)
5. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط m عدد واشارة حلول المعادلة (E) حيث: $m>0$.

$$f(x)=\ln m \ldots (E)$$

الخليل للرياضيات

قسم الجزائر
WWW.DZPEN.COM



I) لتكن الدالة g المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ:

$$g(x) = -1 + (x+1)e + 2\ln(x+1)$$

1 ادرس تغيرات الدالة g، ثم شكل جدول تغيراتها.

2 بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $-0.34 < \alpha < -0.33$.

3 استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$

II) لتكن الدالة f المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ:

$$f(x) = \frac{e}{x+1} + \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1

أ/ بين أن $\lim\limits_{x\to-1} f(x) = -\infty$ واحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم فسر النتيجتين هندسيا.

ب/ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-1;+\infty[$:

$$f'(x) = \frac{-g(x)}{(x+1)^3}$$

ج/ ادرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $]-1;+\infty[$، ثم شكل جدول تغيراتها.

د/ ارسم المنحنى (C_f) . (نقبل أنّ $f(\alpha) \approx 3.16$).

2 نعتبر الدالة k المعرفة على $]-1;1[$ بـ:

$$k(x) = f(-|x|)$$

(C_k) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

أ/ بين أن الدالة k زوجية.

ب/ بين كيف يمكن استنتاج المنحنى (C_k) انطلاقا من المنحنى (C_f) ، ثم ارسمه. (دون دراسة تغيرات الدالة k).

ج/ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $k(x) = m$.

الخليل للرياضيات

قسم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

10 المسـألة رقم:

مشاهـــدة الحـــل

I) نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$g(x) = \ln x + x - 3$$

1. ادرس تغيرات الدالة g .
2. بين ان المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $2.2 < \alpha < 2.21$.
3. عين إشارة $g(x)$ على المجال : $]0;+\infty[$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$f(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right)(\ln x - 2)$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]$ و $\lim\limits_{x\to 0}[f(x)]$.
2.
   أ/ احسب $f'(x)$ ، ثم ادرس اشارتها.
   ب/ شكل جدول تغيرات الدالة f .
3. عين دون حساب: $\lim\limits_{x\to\alpha}\left[\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}\right]$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا.
4. بين أن:

$$f(\alpha) = -\frac{(\alpha-1)^2}{\alpha}$$

5. حل في المجال $]0;+\infty[$ المعادلة $f(x) = 0$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا.
6. بأخذ: $f(\alpha) \cong -0.66$ ، مثل بيانيا (C_f)

قسم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

المسألة رقم: 11

مشاهدة الحل

I) الدالة العددية g معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$g(x) = 2\ln x - 1 - \frac{1}{x^2}$$

1 بيّن أنّ الدالة g متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$.

2

أ/ بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1.89 < \alpha < 1.9$

ب/ استنتج حسب قيم العدد الحقيقي الموجب تماما x إشارة $g(x)$

II) الدالة العددية f معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$f(x) = -x - 2 + \frac{3 + 2\ln x}{x}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2cm$).

1

أ/ احسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$، ثم فسر النتيجة هندسيا.

ب/ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2

أ/ بين أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$:

$$f'(x) = \frac{1}{x^2}\,g\left(\frac{1}{x}\right)$$

ب/ بيّن أنّ الدالة f متزايدة تماما على المجال $\left]0;\frac{1}{\alpha}\right]$ ومتناقصة تماما على المجال $\left[\frac{1}{\alpha};+\infty\right[$. ثم شكل جدول تغيرتها

3

أ/ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(-x-2)]$ ، ثم استنتج أنّ (C_f) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) يُطلب كتابة معادلة له.

ب/ ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

4

أ/ بين أنّ (C_f) يقبل نقطة انعطاف A فاصلتها 1

ب/ اكتب معادلة المماس لـ (C_f) عند النقطة A

5 ارسم (T)، (Δ) و (C_f) (نأخذ: $\frac{1}{\alpha} \approx 0.53$ و $f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 0.73$).

III) الدالة h معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ:

$$h(x) = |x| + 2 - \frac{3 + \ln(x^2)}{|x|}$$

و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

1 بيّن أنّ الدالة h زوجية.

2 تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $h(x) = -f(x)$

3 اشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ثم ارسمه.

الخليل للرياضيات
قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

المسـألة رقم: 12

مشاهـــدة الحـــل

I) ليكن (C) التمثيل البياني للدالة $x \longmapsto \ln x$ في مستوي منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

A نقطة من (C) فاصلتها m حيث m عد حقيقي موجب تماما

و (T_m) مماس لـ (C) في النقطة A

1

أ/ اثبت أنّ $y = \frac{1}{m}x - 1 + \ln m$ معادلة المماس (T_m).

ب/ تحقق أنّ المماس (T_e) للمنحنى (C) في النقطة $B(e;1)$ يمر بالنقطة O مبدأ المعلم

2 لتكن الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ:

$$g(x) = \frac{1}{m}x - 1 + \ln m - \ln x$$

أ/ ادرس تغيرات الدالة g، ثم شكل جدول تغيراتها.

ب/ استنتج إشارة $g(x)$

3 استنتج مما سبق أن (C) يقع تحت أي مماس له

II)

1

أ/ استنتج أنه من أجل كل عددين حقيقين موجبين تماما m و x يكون:

$$\ln x \leq \ln m + \frac{x-m}{m}$$

ب/ استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماما m يكون:

$$\ln(m+1) - \ln m \leq \frac{1}{m}$$

III) نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ:

$$f(x) = \ln x + x - 1$$

1

أ/ ادرس اتجاه تغير الدالة f على $]0;+\infty[$

ب/ استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما صحة المتباينة $\ln x \leq x - 1$.

2

أ/ اثبت أنه من أجل $t > -1$ يكون لدينا: $\ln(t+1) \leq t$

ب/ بوضع $x = \frac{1}{t+1}$، اثبت أنه من أجل $t > -1$ يكون لدينا: $\frac{t}{1+t} \leq \ln(t+1)$

ج/ استنتج أنه من أجل $t > -1$ صحة المتباينة $\frac{t}{1+t} \leq \ln(t+1) \leq t$

الخليل للرياضيات

قسم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

المسـألة رقم: 13

مشاهـــدة الحـــل

I) نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=1+x^2+\ln x$

1. ادرس تغيرات الدالة g .
2. بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $0.32<\alpha<0.33$.
3. استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي:

$$f(x)=-x+\frac{2+\ln x}{x}$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب نهايات الدالة عند أطراف مجموعة تعريفها.
2. بين أنه من أجل كل x من D_f:

$$f'(x)=-\frac{g(x)}{x^2}$$

ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

3. بين أن: $f(\alpha)=2\left(\frac{1}{2\alpha}-\alpha\right)$ ، ثم عين حصرا للعدد $f(\alpha)$.
4.

أ/ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)+x]$ ، ثم استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلته.

ب/ ادرس الوضع النسبي بين المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) .

5. اثبت أن (C_f) يقبل مماس (T) يوازي المستقيم (Δ) في نقطة يُطلب تعيينها.
6. مثل بيانيا كل من المستقيم (Δ) ، المماس (T) و (C_f) . علما أن (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطتين x_0 و x_1 حيث:

$0.1<x_0<0.2$ وَ $1.5<x_1<1.6$

III) نعتبر الدالة h المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي:

$$h(x)=-x+1+\frac{2+\ln(x+1)}{x+1}$$

ونسمي (C_h) تمثيلها البياني في المستوي السابق

1.

أ/ بين أنه من أجل كل x من المجال D_h : $h(x)=f(x+1)+2$

ب/ بين أن المستقيم (D) ذو المعادلة $y=-x+1$ مقارب مائل لـ (C_h) في جوار $+\infty$

2. بين أن المنحنى (C_h) هو صورة (C_f) بتحويل بسيط يُطلب تعيينه، ثم أنشئه
3. m وسيط حقيقي غير معدوم، (T_m) مستقيم معادلته: $y=\ln(|m|)\,x+1$

أ/ برهن أن جميع المستقيمات (T_m) تشمل نقطة ثابتة يُطلب تعيينها.

ب/ ناقش بيانيا حسب قيم m عدد حلول المعادلة (E) ذات المجهول x التالية: $h(x)=\ln(|m|)\,x+1\ \ldots(E)$

قسم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

المسألة رقم: 14

مشاهدة الحل

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي:

$$g(x) = (\ln x)^3 + 1$$

1. ادرس تغيرات الدالة g .
2. حل المعادلة $g(x) = 0$.
3. استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;1[\cup]1;+\infty[$ كما يلي:

$$f(x) = (\ln x)^2 + 1 - \frac{2}{\ln x}$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

1. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.
2. بين أنه من أجل كل x من المجال $]0;1[\cup]1;+\infty[$ يكون:

$$f'(x) = 2\frac{g(x)}{x(\ln x)^2}$$

3. استنتج إشارة $f'(x)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

III) نعتبر الدالة h المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي: $h(x) = (\ln x)^2 + 1$

ونسمي (C_h) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

1. ادرس تغيرات الدالة h .
2. احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-h(x)]$ ثم فسر النتيجة هندسيا.
3. ادرس الوضع النسبي بين المنحنيين (C_f) و (C_h) .
4. بين أن (C_h) يقبل A نقطة انعطاف يُطلب احداثييها .
5. اكتب معادلة المماس (T) لـ (C_h) في النقطة A .
6. احسب $f(e)$ ، ماذا تستنتج بالنسبة لـ (C_f) ؟
7. مثّل بيانيا في نفس المعلم كلا من (C_f) ، (C_h) و (T) .
8. نعتبر المعادلة ذات المجهول x والوسيط الحقيقي m التالية:

$$e^m(\ln x)^3 + e^m(\ln x) - \ln x - 2e^m = 0 \ldots (E)$$

- ناقش بيانيا حسب قيم m عدد حلول المعادلة (E)

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

15 المسـألة رقم:

مشاهـــدة الحـــل

I) لتكن f الدالة العددية المعرفة على المجال $I = \left]\frac{1}{2}; +\infty\right[$ بـ:

$$f(x) = 1 + \ln(2x - 1)$$

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. احسب $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} \frac{1}{2}} f(x)$.
2. بين أن الدالة f متزايدة تماما على المجال I، ثم شكل جدول تغيراتها.
3. عين فاصلة النقطة من (C_f) التي يكون فيها المماس موازيا للمستقيم (d) ذي المعادلة $y = x$.
4.

أ/ أثبت أنه من أجل كل x من I يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل:

$$f(x) = \ln(x + a) + b$$

حيث a و b عددان حقيقيان يطلب تعيينهما.

ب/ استنتج أنه يمكن رسم (C_f) انطلاقا من (C) منحنى الدالة اللوغارتمية النيبيرية، ثم ارسم (C) و (C_f).

II) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجال I بـ: $g(x) = f(x) - x$.

1. احسب $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} \frac{1}{2}} g(x)$ ، ثم بين أنّ $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = -\infty$.
2. ادرس اتجاه تغير الدالة g على I، ثم شكل جدول تغيراتها.
3.

أ/ احسب $g(1)$، ثم بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل في المجال $\left]\frac{3}{2}; +\infty\right[$ حلا وحيدا α، ثم تحقق أنّ $2 < \alpha < 3$.

ب/ ارسم (C_g) منحنى الدالة g على المجال $\left]\frac{1}{2}; 5\right[$ في المعلم السابق.

4. استنتج إشارة $g(x)$ على المجال I ثم حدد وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (d).
5. برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1; \alpha[$ فإنّ: $f(x)$ ينتمي إلى المجال $]1; \alpha[$.

III) نسمي (u_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}^*$ كما يلي:

$$u_n = f\left(1 + \frac{1}{2n}\right)$$

1. عين قيمة العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون:

$$u_n = 1 + 2\ln 3 - 3\ln 2$$

2. احسب بدلالة n المجموع S_n حيث:

$$S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM



المسـألة رقم:

مشاهـــدة الحـــل

I) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي:

$$f(x)=\frac{(lnx)^2}{x}$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$.

1

أ/ احسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$ ، ثم بين أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ مبينا المستقيمات المقاربة لـ (C_f) .

ب/ ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها .

2 m عدد حقيقي موجب تماما. ولتكن النقط A_m ذوات الفاصلة m ، والمستقيم (T_m) مماس (C_f) في النقط A_m .

أ/ اكتب بدلالة m معادلة المماس (T_m) .

ب/ عين قيم m التي من أجلها (T_m) يشمل المبدأ $O(0;0)$.

ج/ اكتب معادلة كل مماس من أجل قيم m المحصل عليها.

3 مثّل بيانيا المستقيمات (T_m) و (C_f) .

II) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي:

$$g(x)=\frac{(ln|x|)^2}{x}$$

1 بيّن أن الدالة g فردية.

2 بيّن أنه يمكن رسم (C_g) منحني الدالة g انطلاقا من (C_f) ، ثم ارسمه.

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM



I) الدالة العددية g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$g(x) = -1 + x + 2\ln x$$

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g.
2. احسب $g(1)$، ثم استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x من المجال $]0;+\infty[$.

II) الدالة العددية f معرفة على $]0;+\infty[$ بـ:

$$f(x) = \frac{-1 + (x-2)\ln x}{x}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

1.
أ/ احسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$، ثم فسر النتيجة هندسيا.

ب/ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.
أ/ بين أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$:

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$$

ب/ عيّن اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3. ليكن (Γ) المنحنى البياني الممثل للدالة: $x \longmapsto \ln x$ على المجال $]0;+\infty[$.

أ/ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x) - \ln x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا.

ب/ ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Γ).

4. بين أن المنحنى (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و β، ثم تحقق أنّ:

$0.5 < \alpha < 0.6$ و $2.9 < \beta < 3$

5. ارسم (Γ) ثم (C_f)

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

المسألة رقم: 18

مشاهدة الحل

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x)=\ln\left(\frac{2e^{2x}+1}{e^{x}+2}\right)$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$.

1

أ/ احسب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)]$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا.

ب/ بين أن:

$$f(x)=x+\ln 2+\ln\left(\frac{1+\frac{1}{2}e^{-2x}}{1+2e^{-x}}\right)$$

ج/ استنتج $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]$.

2 ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3

أ/ بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (D) بجوار $+\infty$ يطلب تعيين معادلته.

ب/ ادرس الوضع النسبي بين المستقيم (D) و المنحنى (C_f) .

4 بين أن ω نقطة تقاطع مقاربي المنحنى (C_f) تنتمي إلى (C_f) .

5 اكتب معادلة للمماس (T) عند المبدأ.

6 مثل بيانيا كلا من (D) ، (T) و (C_f)

7 m وسيط حقيقي حيث: $m>0$.

ناقش بيانيا حسب قيم m عدد حلول المعادلة (E) حيث:

$$x-\ln\left(\frac{2e^{2x}+1}{me^{x}+2m}\right)=0\ ...(E)$$

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

19 المسـألة رقم:

مشاهـــدة الحـــل

I) g الدالة العددية المعرفة والمتزايدة تماما على $]0;+\infty[$ بـ:

$$g(x) = (x+1)(x+e) - e(x\ln x)$$

- احسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} g(x)$، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ:

$$f(x) = \ln(x+1) + \frac{e\ln x}{x+1}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1

أ/ احسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$ ، ثم بين أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

ب/ بين أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$:

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x(x+1)^2}$$

ج/ استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكل جدول تغيراتها.

2 اكتب معادلة للمماس (T) منحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

3

أ/ بين أنّ المنحنى (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة A فاصلتها α

ب/ تحقق أنّ $0.7 < \alpha < 0.8$.

4 (Γ) المنحنى البياني الممثل للدالة $x \longmapsto \ln(x+1)$ على المجال $[0;+\infty[$

أ/ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x) - \ln(x+1)]$ ، ثم فسر النتيجة بيانيا.

ب/ ادرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (Γ).

ج/ ارسم المماس (T) و (Γ) ثم (C_f) .

5 m وسيط حقيقي، عين قيم m بحيث تقبل المعادلة $f(x) = \frac{1+e}{2}x - m$ حلين متمايزين.

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM



I) نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$g(x) = x^2 - 2 + \ln x$$

1 ادرس تغيرات الدالة g .

2

أ/ بين ان المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]0;+\infty[$.

ب/ تحقق من أن $1.31 < \alpha < 1.32$

3 استنتج إشارة $g(x)$.

II) نعتبر الدالة f المعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي:

$$f(x) = x^2 + (2 - \ln x)^2$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$.

1 احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.

2 بين أن إشارة $f'(x)$ من نفس إشارة $g(x)$.

3 شكل جدول تغيرات الدالة f .

4 بين أن: $f(\alpha) = \alpha^2(1 + \alpha^2)$

5 استنتج إشارة $f(x)$ على المجال: $]0;+\infty[$.

III) نسمي (C_h) التمثيل البياني للدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$h(x) = \ln x$$

ولتكن النقطة A ذات الاحداثيات $(0;2)$. و M نقطة من المنحنى (C_h) فاصلتها x_m .

1 بين أن المسافة AM تُعطى بـ:

$$AM = \sqrt{f(x)}$$

2 نعتبر الدالة k المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$k(x) = \sqrt{f(x)}$$

أ/ برهن أن للدالتين f و k نفس اتجاه التغير على المجال $]0;+\infty[$.

ب/ برهن أن المسافة AM أصغرية في نقطة B من (C_h) ، يُطلب تعيين احداثييها.

ج/ برهن أن: $AB = \alpha\sqrt{1+\alpha^2}$

3 هل المستقيم (AB) عمودي على المستقيم المماس للمنحنى (C_h) في النقطة B ؟ برر اجابتك.

الخليل للرياضيات

قسم الجزائر
WWW.DZPEN.COM



I) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجال $]0;1[$ بـ: $g(x) = 2 - x + \ln x$

1

أ/ ادرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0;1[$.

ب/ بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $0.15 < \alpha < 0.16$.

2 استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$ على المجال $]0;1[$.

II) لتكن f الدالة العددية المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ:

$$f(x) = \frac{1 - 2x + \ln x}{x - 1}$$

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$

1 احسب $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ >}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ (يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل: $f(x) = \frac{1-2x}{x-1} + \frac{\ln x}{x-1}$)

ثم فسر النتيجتين بيانيا

2

أ/ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$:

$$f'(x) = \frac{g\left(\frac{1}{x}\right)}{(x-1)^2}$$

ب/ بين أنّ الدالة f متزايدة تماما على $\left]1;\frac{1}{\alpha}\right]$ ومتناقصة تماما على $\left[\frac{1}{\alpha};+\infty\right[$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

3 ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -2$.

4 ارسم المستقيمين المقاربين والمنحنى (C_f) ، (يُعطى $f\left(\frac{1}{\alpha}\right) \approx -1.8$).

5 عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $|f(x)| = m$ حلين متمايزين.

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM



المسـألة رقم: 22

مشاهـــدة الحـــل

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على D حيث: $D =]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$ بـ:

$$f(x) = \frac{2}{3}x + \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$$

و (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بين أن الدالة f فردية، ثم فسر ذلك بيانيا.
2. احسب النهايات التالية: $\lim\limits_{x\to 1^{>}} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to -1^{<}} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ وَ $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$

ثم استنتج أنّ (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين موازيين لمحور التراتيب.

3. أ/ بين أنه من أجل كل x من D:

$$f'(x) = \frac{2}{3}\left(\frac{x^2+2}{x^2-1}\right)$$

ب/ استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

ج/ بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبلا حلا وحيدا α حيث: $1.8 < \alpha < 1.9$.

4. بين أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = \frac{2}{3}x$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) ، ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ).
5. انشء المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) .
6. m وسيط حقيقي، ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة:

$$(2-3|m|)x + 3\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = 0$$

الخليل للرياضيات

قسم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الحلول (مقترحة) :

فهرس المحتويات:ت

المسألة رقم 01 : المسألة الحل
المسألة رقم 02 : المسألة الحل
المسألة رقم 03 : المسألة الحل
المسألة رقم 04 : المسألة الحل
المسألة رقم 05 : المسألة الحل
المسألة رقم 06 : المسألة الحل
المسألة رقم 07 : المسألة الحل
المسألة رقم 08 : المسألة الحل
المسألة رقم 09 : المسألة الحل
المسألة رقم 10 : المسألة الحل
المسألة رقم 11 : المسألة الحل
المسألة رقم 12 : المسألة الحل
المسألة رقم 13 : المسألة الحل
المسألة رقم 14 : المسألة الحل
المسألة رقم 15 : المسألة الحل
المسألة رقم 16 : المسألة الحل
المسألة رقم 17 : المسألة الحل
المسألة رقم 18 : المسألة الحل
المسألة رقم 19 : المسألة الحل
المسألة رقم 20 : المسألة الحل
المسألة رقم 21 : المسألة الحل
المسألة رقم 22 : المسألة الحل

بالتوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

01 حل المسـألة رقم:

مشاهـــدة المسألة

(I

❶ دراسة تغيرات الدالة g :

- حساب النهايات:
  - $\lim\limits_{x\to -1^{>}} [g(x)] = -\infty$
  - $\lim\limits_{x\to +\infty} [g(x)] = +\infty$
- حساب $g'(x)$:

$$g'(x) = 2x + 2 + \frac{1}{x+1}$$
$$= \frac{(2x+2)(x+1)+1}{x+1}$$
$$= \frac{2x^2+2x+2x+2+1}{x+1}$$
$$= \frac{2x^2+4x+3}{x+1}$$

لدينا $g'(x) > 0$ ومنه الدالة g متزايدة تماما على مجال تعريفها.

- جدول التغيرات:

x	-1		$+\infty$
$g'(x)$	$+$		
$g(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

❷ حساب $g(0)$:

$$g(0) = 0$$

- استنتاج حسب قيم x إشارة $g(x)$:

من جدول التغيرات نجد:

x	-1	0	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

(II

❶ حساب نهايات الدالة عند أطراف مجموعة تعريفها:

- $\lim\limits_{x\to -1^{>}} [f(x)] = \lim\limits_{x\to -1^{>}} \left[\underbrace{x}_{-1} - \frac{\overbrace{\ln(x+1)}^{-\infty}}{\underbrace{x+1}_{0^+}}\right] = +\infty$

- التفسير الهندسي:

(C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي بجوار $+\infty$ معادلته

$$x = -1$$

- $\lim\limits_{x\to +\infty} [f(x)] = +\infty$

لأنّ:

$$\lim_{x\to +\infty} \left[\frac{\ln(u)}{u^n}\right] = 0$$

❷ تبيين أن (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) في جوار $+\infty$:

$$\lim_{x\to +\infty} [f(x) - y] = \lim_{x\to +\infty} \left[x - \frac{\ln(x+1)}{x+1} - x\right]$$
$$= \lim_{x\to +\infty} \left[-\frac{\ln(x+1)}{x+1}\right]$$
$$= 0$$

ومنه المستقيم (Δ) مقارب مائل بجوار $+\infty$.

❸ دراسة الوضع النسبي بين (C_f) و (Δ) :

دراسة إشارة الفرق $f(x) - y$:

$$f(x) - y = -\frac{\ln(x+1)}{x+1}$$

لدينا:

$$-\ln(x+1) = 0 \Rightarrow e^{\ln(x+1)} = e^0$$
$$\Rightarrow x + 1 = 1$$
$$\Rightarrow x = 0$$

x	-1	0	$+\infty$
$f(x) - y$	$+$	0	$-$

- المنحنى (C_f) فوق (Δ) لما $x \in]-1;0[$.
- المنحنى (C_f) يقطع (Δ) في $O(0;0)$.
- المنحنى (C_f) تحت (Δ) لما $x \in]0;+\infty[$.

❹ تبيين أنه: $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^2}$:

$$f'(x) = 1 - \frac{\frac{1}{x+1}(x+1) - \ln(x+1)}{(x+1)^2}$$
$$= \frac{x^2+1+2x-1-\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$
$$= \frac{g(x)}{(x+1)^2}$$

- جدول تغيرات الدالة f :

لدينا إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$:

x	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	0	↗ $+\infty$

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

❺ تبيين أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف:

$$f''(x) = \frac{\left(2x+2+\frac{1}{x+1}\right)(x+1)^2 - 2(x+1)(x^2+2x+\ln(x+1))}{(x+1)^4}$$

$$= \frac{\left(2(x+1)+\frac{1}{x+1}\right)(x+1) - 2(x^2+2x+\ln(x+1))}{(x+1)^3}$$

$$= \frac{2(x+1)^2 + 1 - 2x^2 + 4x + 2\ln(x+1)}{(x+1)^3}$$

$$= \frac{3 - 2\,ln(x+1)}{(x+1)^3}$$

لدينا: $(x+1)^3 > 0$ ومنه إشارة $f''(x)$ من إشارة البسط

$$3 - 2\,ln(x+1) = 0 \Rightarrow 2ln(x+1) = 3$$

$$\Rightarrow \ln(x+1) = \frac{3}{2}$$


$$\Rightarrow x+1 = e^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow x = e^{\frac{3}{2}} - 1$$

لدينا الدالة f'' تنعدم وتغير اشارتها، ومنه (C_f) يقبل نقطة انعطاف فاصلتها $\left(e^{\frac{3}{2}} - 1\right)$

❻ التمثيل البياني:

- نرسم المستقيم المقارب العمودي : $x = -1$
- نرسم المماس (T)
- ثم باستعمال جدول التغيرات نرسم (C_f)



قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

(I

❶ دراسة تغيرات الدالة g:

- النهايات:

• $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(x\left(\ln x - 1 - \frac{1}{x}\right)\right) = +\infty$

• $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} g(x) = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}}\left[\underbrace{x\ln x}_{0} - x - 1\right] = -1$

- المشتقة:

$$g'(x) = \ln x + \frac{1}{x}x - 1 = \ln x$$
$$g'(x) = 0 \Rightarrow \ln x = 0 \Rightarrow x = 1$$

- جدول التغيرات:

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$\|\|$	-1 ↘	-2	↗ $+\infty$	

❷ تبيين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α :

لدينا الدالة مستمرة ورتيبة على المجال $]3.5;3.6[$

ولدينا: $g(3.5) \times g(3.6) < 0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$

تقبل حلا وحيدا α في المجال $]3.5;3.6[$

❸ استنتاج حسب قيم x إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$:

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

(II

❶ حساب نهايات الدالة f :

• $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(1 - \frac{\overbrace{\ln x}^{0}}{x}{1+\frac{1}{x}}\right) = 1$

ومنه (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي بجوار $+\infty$ معادلته $y = 1$

• $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x) = +\infty$

(C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي بجوار $+\infty$ معادلته $x = 0$

❷

أ/ تبيين أن إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$:

$$f'(x) = -\frac{\frac{1}{x}(x+1) - \ln x}{(x+1)^2}$$
$$= -\frac{\frac{x+1-x\ln x}{x}}{(x+1)^2}$$
$$= -\frac{x+1-x\ln x}{x(x+1)^2}$$
$$= \frac{-x-1+x\ln x}{x(x+1)^2}$$
$$= \frac{g(x)}{x(x+1)^2}$$

ب/ استنتاج تغيرات الدالة f:

لدينا: $x(x+1)^2 > 0$ على المجال $]0;+\infty[$

ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$

- جدول التغيرات:

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$\|\|$ 0	↘	$f(\alpha)$	↗	1

❸ اثبات أنّ $f(\alpha) = 1 - \frac{1}{\alpha}$:

لدينا:

$$g(\alpha) = 0 \Rightarrow \alpha\ln\alpha - \alpha - 1 = 0$$
$$\Rightarrow \alpha\ln\alpha = \alpha + 1$$
$$\Rightarrow \ln\alpha = \frac{\alpha+1}{\alpha}$$

ومنه:

$$f(\alpha) = 1 - \frac{ln\,\alpha}{\alpha+1}$$
$$= 1 - \frac{\frac{\alpha+1}{\alpha}}{\alpha+1}$$
$$= 1 - \frac{1}{\alpha}$$

- استنتاج حصرا لـ $f(\alpha)$:

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

لدينا: $3.5 < \alpha < 3.6$

ومنه: $\frac{1}{3.6} < \frac{1}{\alpha} < \frac{1}{3.5}$

ومنه: $-\frac{1}{3.5} < -\frac{1}{\alpha} < -\frac{1}{3.6}$


ومنه: $1-\frac{1}{3.5} < 1-\frac{1}{\alpha} < 1-\frac{1}{3.6}$

إذن: $0.71 < f(\alpha) < 0.72$

❹ كتابة معادلة المماس (T) :

$$\begin{aligned}(T): y &= f'(1)(x-1)+f(1)\\ &= -\frac{1}{2}(x-1)+1\\ &= -\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}\end{aligned}$$

❺ التمثيل البياني:



III)

❸ تبيين أنّ المستقيمات (Δ_m) تشمل نقطة ثابتة:

لدينا:

$$y_m = mx+\frac{3}{2}$$

نأخذ $m=0$ نجد: $y_0 = \frac{3}{2}$

إذن المستقيمات (Δ_m) تمر من الترتيبة $\frac{3}{2}$

نأخذ $m=1$ نجد: $y_1 = x+\frac{3}{2}$

لدينا:

$$y_1 = y_3 \Rightarrow x+\frac{3}{2} = \frac{3}{2} \Rightarrow x = 0$$

إذن المستقيمات (Δ_m) تمر من الفاصلة 0

ومنه المستقيمات (Δ_m) تمر بنقطة ثابتة $A\left(0;\frac{3}{2}\right)$

❹ المناقشة البيانية لحلول المعادلة $f(x) = y_{(\Delta_m)}$:

لما $m < -\frac{1}{2}$ المعادلة لا تقبل حلول

لما $m = -\frac{1}{2}$ المعادلة تقبل حلا وحيدا $x_0 = 1$

لما $-\frac{1}{2} < m < 0$ المعادلة تقبل حلين

لما $m \geq 0$ المعادلة تقبل حلا وحيدا

IV)

❶ التحقق أنّ $h(x)+1 = f(x-1)$:

$$h(x)+1 = 1-\frac{\ln(x-1)}{x} = f(x-1)$$

❷ استنتاج أن (C_h) هو صورة (C_f) :

لدينا: $h(x)+1 = f(x-1)$

ومنه: $h(x) = f(x-1)-1$

إذن: (C_h) هو صورة (C_f) بإنسحاب شعاعه $\vec{u}$ حيث:

$$\vec{u}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

❶ دراسة قابلية اشتقاق الدالة f في $x_0 = 0$:

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ <}}\left[\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\right] = \lim_{\substack{x\to 0\\ <}}\left[\frac{\frac{1}{\ln|x|}+x-0}{x-0}\right]$$
$$= \lim_{\substack{x\to 0\\ <}}\left[\frac{1}{x\ln|x|}+\frac{x}{x}\right]$$
$$= \lim_{\substack{x\to 0\\ <}}\left[\frac{1}{x\ln(-x)}+1\right]$$
$$= \lim_{\substack{x\to 0\\ <}}\left[\frac{-1}{-x\ln(-x)}+1\right]$$
$$= -\infty$$

لأن: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ <}}[-x\ln(-x)\,] = 0^+$

الدالة f لا تقبل الاشتقاق عند $x_0 = 0$ من اليسار

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ >}}\left[\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\right] = \lim_{\substack{x\to 0\\ >}}\left[\frac{\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{2(\ln x)^2}-0}{x-0}\right]$$
$$= \lim_{\substack{x\to 0\\ >}}\left[\frac{1}{x\ln x}-\frac{1}{2x(\ln x)^2}\right]$$
$$= \lim_{\substack{x\to 0\\ >}}\left[\frac{1}{x\ln x}\left(1-\frac{1}{2\ln x}\right)\right]$$
$$= +\infty$$

الدالة f لا تقبل الاشتقاق عند $x_0 = 0$ من اليمين

- التفسير الهندسي:

الدالة f لا تقبل الاشتقاق عند $x_0 = 0$ ومنه (C_f) يقبل مماس عمودي معادلته $x = 0$

❷ دراسة تغيرات الدالة f :

- حساب النهايات:

- $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)] = \lim\limits_{x\to-\infty}\left[\frac{1}{\ln(-x)}+x\right] = -\infty$
- $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ <}}[f(x)] = \lim\limits_{\substack{x\to -1\\ <}}\left[\frac{1}{\ln(-x)}+x\right] = +\infty$
- $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ >}}[f(x)] = \lim\limits_{\substack{x\to -1\\ >}}\left[\frac{1}{\ln(-x)}+x\right] = -\infty$
- $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ <}}[f(x)] = \lim\limits_{\substack{x\to 1\\ <}}\left[\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{2(\ln x)^2}\right] = -\infty$
- $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ >}}[f(x)] = \lim\limits_{\substack{x\to 1\\ >}}\left[\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{2(\ln x)^2}\right] = -\infty$
- $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)] = \lim\limits_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{2(\ln x)^2}\right] = 0$

- التفسير الهندسي:

- (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي $x = -1$ بجوار $\pm\infty$
- (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي $x = 1$ بجوار $-\infty$
- (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي $y = 0$ بجوار $+\infty$

- حساب $f'(x)$:

لمّا $x \in \mathbb{R}_-^* - \{-1\}$:

$$f'(x) = \frac{-\left(-\frac{1}{x}\right)}{(\ln(-x))^2}+1$$
$$= \frac{-1}{x(\ln(-x))^2}+1$$

لاحظ أنّ $x < 0$ ومنه: $f'(x) > 0$

اذن:

x	$-\infty$	-1	0
$f'(x)$	$+$	$+$	

لمّا $x \in \mathbb{R}_+^* - \{1\}$:

$$f'(x) = -\left(\frac{\frac{1}{x}}{(\ln x)^2}\right)-\left(-\frac{4\left(\frac{1}{x}\right)\ln x}{4(\ln x)^4}\right)$$
$$= -\frac{1}{x(\ln x)^2}+\frac{1}{x(\ln x)^4}$$
$$= \frac{-\ln x+1}{x(\ln x)^3}$$
$$= \frac{-\ln x+1}{[x(\ln x)^2]\ln x}$$

لدينا: $x(\ln x)^2 > 0$ ومنه إشارة المشتقة من إشارة $\frac{-\ln x+1}{\ln x}$:

لدينا:

$$\ln x = 0 \Rightarrow x = 1$$

ولدينا:

$$-\ln x+1 = 0 \Rightarrow \ln x = 1$$
$$\Rightarrow x = e$$

x	0	1	e	$+\infty$
$-\ln x+1$	$+$	$+$	0	$-$
$\ln x$	$-$	$+$		$+$
$f'(x)$	$-$	$+$	0	$-$

- جدول التغيرات:

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

x	$-\infty$		-1		0		1		e		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$\|\|$	$+$	$\|\|$	$-$	$\|\|$	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$ $\|\|$ $-\infty$	↗	0 $\|\|$ $-\infty$	↘	$-\infty$ $\|\|$ $-\infty$	↗	$\frac{1}{2}$	↘	0

❸

أ/ تبيين أن (C_f) يقبل (Δ) كمقارب مائل بجوار $-\infty$:

$$\lim_{x\to-\infty}\left[x+\frac{1}{\ln(-x)}-x\right]=0$$

ومنه المستقيم ذو المعادلة $y=x$ مقارب مائل بجوار $-\infty$.

ب/ دراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) على المجال $\mathbb{R}_-^*-\{-1\}$:

ندرس إشارة الفرق $f(x)-y$:

$$f(x)-y=\frac{1}{\ln(-x)}$$

لدينا:

$$\ln(-x)=0\Rightarrow -x=e^0$$
$$\Rightarrow -x=0$$
$$\Rightarrow x=0$$

x	$-\infty$		-1		0
$f(x)-y$		$+$	$\|\|$	$-$	

- (C_f) فوق (Δ) لما $x\in]-\infty;-1[$.
- (C_f) تحت (Δ) لما $x\in]-1;0[$.

❹ حل المعادلة: $f(x)=0$ في المجال $\mathbb{R}_+^*-\{1\}$:

$$\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{2(\ln x)^2}=0\Rightarrow\frac{2\ln x-1}{2(\ln x)^2}=0$$

لدينا: $2(\ln x)^2>0$ ومنه:

$$2\ln x-1=0\Rightarrow 2\ln x=1$$
$$\Rightarrow \ln x=\frac{1}{2}$$
$$\Rightarrow x=e^{\frac{1}{2}}$$
$$\Rightarrow x=\sqrt{e}$$

- الاستنتاج:

(C_f) يقطع محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة $\sqrt{e}$

❺ تبيين أن (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة:

لدينا الدالة f مستمرة ومتزايدة على المجال $]-1.77;-1.76[$

و لدينا: $f(-1.77)=-0.01$ و $f(-1.76)=0.008$


أي: $f(-1.77)\times f(-1.76)<0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x)=0$ تقبلا حلا وحيدا في المجال $]-1.77;-1.76[$

❻ التمثيل البياني:

خطوات التمثيل على معلم متعامد ومتجانس:

- نرسم المستقيمات المقاربة: $x=-1$ و $x=1$ و $y=0$
- نعين نقطتي تقاطع المنحنى (C_f) مع محور الفواصل
- نرسم المستقيم المقارب المائل (Δ)
- ثُمّ باستعمال جدول التغيرات نرسم (C_f)



❼ المناقشة البيانية:

حلول المعادلة (E) هي فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيمات ذات المعادلة $y_m=-(m^2-e)$

- لما $-(m^2-e)<0$
  أي لما $m^2-e>0$
  أي لما $m^2>e$
  أي لما $|m|>\sqrt{e}$
  أي لما $m\in]-\infty;-\sqrt{e}[\cup]\sqrt{e};+\infty[$
  المعادلة تقبل حلين موجبين وحلين سالبين.

- لما $-(m^2-e)=0$
  أي لما $m^2-e=0$
  أي لما $m^2=e$
  أي لما $|m|=\sqrt{e}$
  أي لما $m\in\{-\sqrt{e};\sqrt{e}\}$
  المعادلة تقبل حل موجب وحل معدوم وحل سالب .

- لما $0<-(m^2-e)<\frac{1}{2}$
  أي لما $-\frac{1}{2}<m^2-e<0$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

أي لما $e-\frac{1}{2}<m^2<e$

أي لما $\sqrt{e-\frac{1}{2}}<|m|<\sqrt{e}$

أي لما $|m|<\sqrt{e}$ و $|m|>\sqrt{e-\frac{1}{2}}$

أي لما $-\sqrt{e}<m<\sqrt{e}$

و $m\in\left]-\infty;-\sqrt{e-\frac{1}{2}}\right[\cup\left]\sqrt{e-\frac{1}{2}};+\infty\right[$

أي لما: $m\in\left]-\sqrt{e-\frac{1}{2}};-\sqrt{e}\right[\cup\left]\sqrt{e};\sqrt{e+\frac{1}{2}}\right[$

المعادلة تقبل حلين موجبين وحل سالب.

• لما $-(m^2-e)=\frac{1}{2}$

أي لما: $m^2-e=-\frac{1}{2}$

أي لما: $m^2=e-\frac{1}{2}$ أي $|m|=\sqrt{e-\frac{1}{2}}$

أي لما: $m=\sqrt{e-\frac{1}{2}}$ و $m=-\sqrt{e-\frac{1}{2}}$

المعادلة تقبل حل مضاعف وحل سالب

• لما $-(m^2-e)>\frac{1}{2}$

أي لما: $m^2-e<-\frac{1}{2}$

أي لما: $m^2<e-\frac{1}{2}$

أي لما: $|m|<\sqrt{e-\frac{1}{2}}$

أي لما: $-\sqrt{e-\frac{1}{2}}<m<\sqrt{e-\frac{1}{2}}$

أي لما: $m\in\left]-\sqrt{e-\frac{1}{2}};\sqrt{e-\frac{1}{2}}\right[$

المعادلة تقبل حل وحيد سالب

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

04 حل المسـألة رقم:

مشاهـــدة المسألة

(I

❶

أ/ حساب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} g(x)$:

- $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} g(x) = -\infty$

ب/ تبيين أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$:

- $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty}\left[\underbrace{x^2}_{+\infty}\left(-1-\underbrace{\frac{2}{x^2}}_{0}+2\underbrace{\frac{\ln x}{x^2}}_{0}\right)\right]$

$= -\infty$

❷ دراسة اتجاه تغير الدالة g:

لدينا:

$$g'(x) = -2x + \frac{2}{x}$$
$$= \frac{-2x^2+2}{x}$$
$$= \frac{2(1-x^2)}{x}$$

لدينا: $x > 0$ لما $x \in D_g$، إذن الإشارة من البسط

$$1 - x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 1$$
$$\Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$$

$x = -1$ مرفوض لأنه خارج المجال D_g ، إذن:

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	$+$	0		$-$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	-3	↘	$-\infty$

❸ حساب $g(1)$، ثم استنتاج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$:

$$g(1) = -3$$

لدينا الدالة g تبلغ قيمة حدية عظيمة عند $(1;-3)$

إذن الدالة g سالبة تماما على $\mathbb{R}_+^*$

(II

❶

أ/ حساب نهاية الدالة f عند 0 و $+\infty$:

- $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}}\left(-x+5-2\underbrace{\frac{\ln x}{x}}_{-\infty}\right) = +\infty$

- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$

لأنّ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{\ln x}{x}\right) = +\infty$

ب/ دراسة تغيرات الدالة f :

$$f'(x) = -1 - 2\frac{\frac{1}{x}x - \ln x}{x^2}$$
$$= \frac{-x^2-2+2\ln x}{x^2}$$
$$= \frac{g(x)}{x^2}$$

لدينا: $x^2 > 0$ ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$

x	0		$+\infty$
$f'(x)$	$\|\|$	$-$	
$f(x)$	$\|\|$	$+\infty$ ↘	$-\infty$

❷

أ/ برهان أنّ (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$:

لدينا:

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-x+5] = \lim_{x\to+\infty}\left[-2\frac{\ln x}{x}\right] = 0$$

إذن (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$

ب/ دراسة الوضع النسبي بين (Δ) و (C_f):

$$f(x) - y_{(\Delta)} = \frac{-2\ln x}{x}$$

لدينا: $x > 0$ ومنه إشارة الفرق من إشارة البسط:

$$-2\ln x = 0 \Rightarrow \ln x = 0$$
$$\Rightarrow x = 1$$

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-y_{(\Delta)}$	$\|\|$	$+$	0	$-$	

- (C_f) فوق (Δ) لما $x \in\ ]0;1[$
- (C_f) يقطع (Δ) لما $x = 1$ أي في النقطة $A(1;4)$
- (C_f) تحت (Δ) لما $x \in\ ]1;+\infty[$

❸

أ/ تبيين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α

لدينا الدالة f مستمرة ورتيبة على المجال $]4.3;4.4[$

ولدينا: $f(4.3) \times f(4.4) < 0$

لأنّ: $f(4.3) \approx 0.02$ و $f(4.4) \approx -0.07$

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x)=0$

تقبل حلا وحيدا α حيث: $4.3<\alpha<4.4$

ب/ تبرير أنّ $\ln\alpha=\frac{-\alpha^2+5\alpha}{2}$:

$$f(\alpha)=0\Rightarrow -\alpha+5-2\frac{\ln\alpha}{\alpha}=0$$
$$\Rightarrow \frac{\ln\alpha}{\alpha}=-\frac{\alpha-5}{2}$$
$$\Rightarrow \ln\alpha=\frac{-\alpha^2+5\alpha}{2}$$

❹ تبيين أنه يوجد مماس (T) لـ (C_f) يوازي (Δ):


يوجد مماس يوازي (Δ) معناه: $f'(a)=-1$

$$f'(a)=-1\Rightarrow\frac{-a^2-2+2\ln a}{a^2}=-1$$
$$\Rightarrow -a^2-2+2\ln a=-a^2$$
$$\Rightarrow -2+2\ln a=0$$
$$\Rightarrow \ln a=1$$
$$\Rightarrow a=e$$

- كتابة معادلة لـ (T):

$$y_{(T)}=f'(e)(x-e)+f(e)$$
$$=-1(x-e)-e+5-\frac{2}{e}$$
$$=-x+5-2e^{-1}$$

❺ ارسم كل من (Δ)، (T) و (C_f):



❻ المناقشة البيانية:

لدينا:

$$(5-m)x-2\ln x=0\Rightarrow -2\ln x=-(5-m)x$$
$$\Rightarrow -\frac{2\ln x}{x}=-(5-m)$$
$$\Rightarrow -\frac{2\ln x}{x}=-5+m$$
$$\Rightarrow -\frac{2\ln x}{x}+5=m$$
$$\Rightarrow -\frac{2\ln x}{x}-x+5=-x+m$$
$$\Rightarrow f(x)=-x+m$$

ومنه حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيمات ذات المعادلة $y_m=-x+m$

- لما $m<5-2e^{-1}$ المعادلة لا تقبل حلول
- لما $m=5-2e^{-1}$ المعادلة تقبل حل وحيد
- لما $e<m<5$ المعادلة تقبل حلين
- لما $m\geq 5$ المعادلة تقبل حل وحيد

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

I)

❶

أ/ تعيين إشارة $f'(x)$ مع التبرير:

نضع γ, β, α حيث:

x	$-\infty$	α		β		1	$\sqrt{3}$	γ
$f'(x)$	...	0	$-$	‖	‖	...	0	$+$

لدينا الدالة f فردية ، معناه:

$$\begin{cases} (-x) \in D_f \\ f(-x) = -f(x) \end{cases}$$

ومنه:

$$-f'(-x) = -f'(x) \Rightarrow f'(-x) = f'(x)$$

لدينا من جدول التغيرات (المُعطى):

$x \in]\alpha;\beta[$ لما $f'(x) < 0$

$-x \in]\alpha;\beta[$ لما $\underbrace{f'(-x)}_{=f'(x)} < 0 \Leftarrow$

$x \in]-\beta;-\alpha[$ لما $f'(x) < 0 \Leftarrow$

ولدينا كذلك:

$x \in]\sqrt{3};\gamma[$ لما $f'(x) > 0$

$-x \in]\sqrt{3};\gamma[$ لما $\underbrace{f'(-x)}_{=f'(x)} > 0 \Leftarrow$

$x \in]-\gamma;-\sqrt{3}[$ لما $f'(x) > 0 \Leftarrow$

ولدينا: $x = \sqrt{3}$ لما $f'(x) = 0$

معناه $-x = \sqrt{3}$ لما $f'(-x) = 0$

ومنه $x = -\sqrt{3}$

ومنه: $\alpha = -\sqrt{3}$ و $\beta = -1$ و $\gamma = +\infty$

اذن:

$x \in]-\infty;-\sqrt{3}[\cup]\sqrt{3};+\infty[$ لما: $f'(x) > 0$

$x \in]-\sqrt{3};-1[\cup]1;\sqrt{3}[$ لما: $f'(x) < 0$

ب/ تبيين أن $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)] = -\infty$:

لدينا من الجدول السابق: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)] = +\infty$

نضع $x = -t$

(الدالة f فردية أي: $f(-t) = -f(t)$)

ومنه:

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)] = \lim_{-t\to-\infty}[f(-t)]$$

$$= \lim_{t\to+\infty}[f(-t)]$$

$$= \lim_{t\to+\infty}[-f(t)]$$

$$= -\underbrace{\lim_{t\to+\infty}[f(t)]}_{\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]=+\infty}$$

$$= -\infty$$

- تبيين أن: $\lim\limits_{\substack{x\to1\\ >}}[f(x)] = +\infty$:

بنفس الفكرة السابقة (نضع $x = -t$) نجد:

$$\lim_{\substack{x\to1\\ >}}[f(x)] = +\infty$$

- تبيين أن: $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3} + \ln(2+\sqrt{3})$:

لدينا:

$$\underbrace{f(-\sqrt{3})}_{f(-\sqrt{3})=-f(\sqrt{3})} = -\sqrt{3} - \ln(2+\sqrt{3})$$

$$\Rightarrow -f(\sqrt{3}) = -\sqrt{3} - \ln(2+\sqrt{3})$$

$$\Rightarrow f(\sqrt{3}) = \sqrt{3} + \ln(2+\sqrt{3})$$

ج/ اكمال جدول تغيرات الدالة f السابق:

x	$-\infty$		$-\sqrt{3}$		-1		1		$\sqrt{3}$		$+\infty$
$f'(x)$	$+$		0	$-$	‖	‖	$-$		0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(-\sqrt{3})$	↘	‖	‖	$+\infty$	↘	$f(\sqrt{3})$	↗	$+\infty$

حيث:

$$f(-\sqrt{3}) = -\sqrt{3} - \ln(2+\sqrt{3})$$
$$f(\sqrt{3}) = \sqrt{3} + \ln(2+\sqrt{3})$$

❷ التمثيل البياني:


قبل أن نشرع في التمثيل البياني، نستخرج من جدول التغيرات المستقيمات المقاربة

لدينا:

- (C_f) يقبل مقارب عمودي بجوار $-\infty$ معادلته $x = -1$.
- (C_f) يقبل مقارب عمودي بجوار $+\infty$ معادلته $x = 1$.

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM



❸ تبيين أنّ: $a=1$ ، $b=0$ و $c=1$:

لدينا:

$$f'(x)=a+\frac{-\frac{2}{(x-1)^2}}{c+\frac{2}{x-1}}$$

$$=a-\frac{\frac{2}{(x-1)^2}}{\frac{c(x-1)+2}{x-1}}$$

$$=a-\frac{\frac{2}{x-1}}{c(x-1)+2}$$

$$=a-\frac{2}{c(x-1)^2+2(x-1)}$$

ولدينا:

$$\begin{cases} f'(\sqrt{3})=0 \\ f'(-\sqrt{3})=0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a-\dfrac{2}{c(\sqrt{3}-1)^2+2(\sqrt{3}-1)}=0 \\ a-\dfrac{2}{c(-\sqrt{3}-1)^2+2(-\sqrt{3}-1)}=0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a-\dfrac{2}{c(\sqrt{3}-1)^2+2(\sqrt{3}-1)}=0 \ldots (*) \\ a-\dfrac{2}{c(\sqrt{3}+1)^2-2(\sqrt{3}+1)}=0 \ldots (**) \end{cases}$$

بطرح $(*)$ من $(**)$ نجد:

$$-\frac{2}{c(\sqrt{3}-1)^2+2(\sqrt{3}-1)}+\frac{2}{c(\sqrt{3}+1)^2-2(\sqrt{3}+1)}=0$$

$$\Rightarrow c(\sqrt{3}+1)^2-2(\sqrt{3}+1)=c(\sqrt{3}-1)^2+2(\sqrt{3}-1)$$

$$\Rightarrow c(4+2\sqrt{3})-2\sqrt{3}-2=c(4-2\sqrt{3})+2\sqrt{3}-2$$

$$\Rightarrow c(4+2\sqrt{3})-c(4-2\sqrt{3})-4\sqrt{3}=0$$

$$\Rightarrow c(4\sqrt{3})=4\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \boxed{c=1}$$

نعوض قيمة c في $(*)$ نجد:

$$a-\frac{2}{(\sqrt{3}-1)^2+2(\sqrt{3}-1)}=0$$

$$\Rightarrow a=\frac{2}{(\sqrt{3}-1)^2+2(\sqrt{3}-1)}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{4-2\sqrt{3}+2\sqrt{3}-2}$$

$$\Rightarrow a=\frac{2}{4-2}$$

$$\Rightarrow \boxed{a=1}$$

ولدينا:

$$f(\sqrt{3})=\sqrt{3}+\ln(2+\sqrt{3})$$

$$\Rightarrow \sqrt{3}+b+\ln\left(1+\frac{2}{\sqrt{3}-1}\right)=\sqrt{3}+\ln(2+\sqrt{3})$$

$$\Rightarrow b+\ln\left(1+\frac{2}{\sqrt{3}-1}\right)=\ln(2+\sqrt{3})$$

$$\Rightarrow b=\ln(2+\sqrt{3})-\ln\left(1+\frac{2}{\sqrt{3}-1}\right)$$

$$\Rightarrow b=\ln\left(\frac{2+\sqrt{3}}{1+\frac{2}{\sqrt{3}-1}}\right)$$

$$\Rightarrow b=\ln\left(\frac{2+\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}}\right)$$

$$\Rightarrow b=\ln\left(\frac{(2+\sqrt{3})(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{3}+1}\right)$$

$$\Rightarrow b=\ln\left(\frac{2\sqrt{3}-2+3-\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}\right)$$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

$$\Rightarrow b = \ln\left(\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}+1}\right)$$

$$\Rightarrow b = \ln(1)$$

$$\Rightarrow \boxed{b = 0}$$

❹ المناقشة البيانية:

لدينا:

$$x - \frac{e^m + e^x}{e^m - e^x} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{xe^m - xe^x - e^m - e^x}{e^m - e^x} = 0$$

$$\Rightarrow xe^m - xe^x - e^m - e^x = 0$$

$$\Rightarrow e^m(x-1) - e^x(x+1) = 0$$

$$\Rightarrow e^m(x-1) = e^x(x+1)$$

$$\Rightarrow e^m = e^x\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$$

$$\Rightarrow m = \ln\left[e^x \times \left(\frac{x+1}{x-1}\right)\right]$$

$$\Rightarrow m = \ln(e^x) + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$$

$$\Rightarrow m = x + \ln\left(\frac{x+1+1-1}{x-1}\right)$$

$$\Rightarrow m = x + \ln\left(1 + \frac{2}{x-1}\right)$$

$$\Rightarrow f(x) = m$$

ومنه حلول المعادلة (E) هي فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيمات ذات المعادلة $y_m = m$

ومنه:

- لما $m < f(-\sqrt{3})$

أي لما: $m \in]-\infty; f(-\sqrt{3})[$

للمعادلة حلان سالبان

- لما $m = f(-\sqrt{3})$

للمعادلة حل مضاعف هو $x = -\sqrt{3}$

- لما $f(-\sqrt{3}) < m < f(\sqrt{3})$

أي لما: $m \in]f(-\sqrt{3}); f(\sqrt{3})[$

المعادلة لا تقبل حلول

- لما $m = f(\sqrt{3})$

للمعادلة حل مضاعف هو $x = \sqrt{3}$

- لما $m > f(\sqrt{3})$

أي لما $m \in]f(\sqrt{3}); +\infty[$

للمعادلة حلان موجبان

II) دراسة تغيرات الدالة g:

لدينا: $g(x) = \ln(f(x))$

نلاحظ أن: $g(x) = k \circ f = k(f(x))$

حيث: $k(x) = \ln x$

- حساب النهايات:

لدينا: $\lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ >}} [f(x)] = +\infty$

و $\lim\limits_{x \to +\infty} [k(x)] = +\infty$

اذن: • $\lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ >}} [g(x)] = +\infty$

ولدينا: $\lim\limits_{x \to +\infty} [f(x)] = +\infty$

و $\lim\limits_{x \to +\infty} [k(x)] = +\infty$

اذن: • $\lim\limits_{x \to 1} [g(x)] = +\infty$

- دراسة $g'(x)$:

$$g'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

لدينا: $f(x) > 0$ لما $x \in]1; +\infty[$

ومنه إشارة $g'(x)$ من إشارة $f'(x)$

- جدول تغيرات الدالة g:

x	1		$\sqrt{3}$		$+\infty$
$g'(x)$	$-$		0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	$g(\sqrt{3})$	↗	$+\infty$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

06 حل المسـألة رقم:

مشاهـــدة المسألة

(I

❶ حساب نهاية الدالة g :

- $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$
- $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} g(x) = +\infty$

لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} (-\ln x) = +\infty \\ \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} \left(\frac{1}{x}\right) = +\infty \end{cases}$

❷ دراسة تغيرات الدالة g على $]0;+\infty[$:

$$g'(x) = -\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = -\left(\frac{x+1}{x^2}\right)$$

نلاحظ أنه من أجل كل $x \in]0;+\infty[$ لدينا: $g'(x) < 0$

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	
$g(x)$	$+\infty$ ↘	$-\infty$

❸

أ/ تبيين أنّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]0;+\infty[$:

الدالة g مستمرة ورتيبة على $]0;+\infty[$، وصورة هذا المجال هي $]-\infty;+\infty[$، ومنه فإنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]0;+\infty[$

ب/ التحقق أنّ $0.45 < \alpha < 0.46$:

لدينا: $g(0.46) = -0.05$ و $g(0.45) = 0.02$

أي $g(0.45) \times g(0.46) < 0$

إذن $0.45 < \alpha < 0.46$

ج/ استنتاج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$:

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$	$+$	0	$-$

(II

❶ حساب نهايات الدالة f عند 0 و $+\infty$، وتفسير النتائج هندسيا:

- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \left(\frac{3}{e^x} + \frac{\ln x}{e^x}\right) = 0$
- $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x) = -\infty$

التفسير الهندسي:

- (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x = 0$ بجوار $-\infty$
- (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته $y = 0$ بجوار $+\infty$

❷ دراسة اتجاه تغير الدالة f، ثم تشكيل جدول تغيراتها:

$$\begin{aligned} f'(x) &= -e^{-x}(3+\ln x) + \frac{1}{x}e^{-x} \\ &= e^{-x}\left(-3 - \ln x + \frac{1}{x}\right) \\ &= g(x)e^{-x} \end{aligned}$$

لدينا: $e^{-x} > 0$ ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$

❸ تبيين أنّ $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha e^{\alpha}}$:

لدينا: $g(\alpha) = 0$

ومنه: $-3 - \ln\alpha + \frac{1}{\alpha} = 0$

إذن: $\ln\alpha = -3 + \frac{1}{\alpha}$

ومنه:

$$\begin{aligned} f(\alpha) &= e^{-\alpha}(3+\ln\alpha) \\ &= e^{-\alpha}\left(3 - 3 + \frac{1}{\alpha}\right) \\ &= e^{-\alpha}\frac{1}{\alpha} \\ &= \frac{1}{\alpha e^{\alpha}} \end{aligned}$$

- استنتاج حصرا للعدد $f(\alpha)$:

لدينا: $0.45 < \alpha < 0.46$

ومنه: $1.57 < e^{\alpha} < 1.58$

ومنه: $0.63 < \frac{1}{e^{\alpha}} < 0.64 \ldots (*)$

لدينا: $0.45 < \alpha < 0.46$

ومنه: $2.17 < \frac{1}{\alpha} < 2.22 \ldots (**)$

بضرب $(*)$ في $(**)$ نجد:

$$1.38 < \frac{1}{\alpha e^{\alpha}} < 1.42$$

❹ حل المعادلة $f(x) = 0$، وتفسير النتيجة هندسيا:


$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Rightarrow e^{-x}(3+\ln x) = 0 \\ &\Rightarrow 3 + \ln x = 0 \\ &\Rightarrow \ln x = -3 \\ &\Rightarrow x = e^{-3} \end{aligned}$$

- التفسير الهندسي:

(C_f) يقطع حامل محور الفواصل في النقطة A ذات الفاصلة e^{-3}

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

❺ إنشاء المنحنى (C_f) :



(III

❶ كتابة $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة:

$$h(x)=\frac{|3+\ln x|}{e^x}$$


$$=\begin{cases}\dfrac{3+\ln x}{e^x}\ ;\ x\geq e^{-3}\\ \dfrac{-(3+\ln x)}{e^x}\ ;\ x<e^{-3}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}f(x)\ ;\ x\geq e^{-3}\\ -f(x)\ ;\ x<e^{-3}\end{cases}$$

❷ إنشاء (C_h) المنحنى الممثل للدالة h :

(C_h) ينطبق على (C_f) لما $x\geq e^{-3}$

ويناظر (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل لما $x<e^{-3}$



قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

❸

أ/ حساب $\lim\limits_{x\to 0^{>}}[f(x)]$:

$$\lim_{x\to 0^{>}}[f(x)] = \lim_{x\to 0^{>}}\left[x+\frac{1}{2}+\underbrace{\ln x}_{-\infty}\underbrace{\left(\frac{1}{2}\ln x-1\right)}_{-\infty}\right] = +\infty$$

- التفسير الهندسي:

(C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي بجوار $+\infty$ معادلته $x=0$.

ب/ حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]$:

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)] = \lim_{x\to+\infty}\left[\underbrace{x}_{+\infty}+\frac{1}{2}+\underbrace{\ln x}_{+\infty}\underbrace{\left(\frac{1}{2}\ln x-1\right)}_{+\infty}\right] = +\infty$$

❹

أ/ التبيين:

نضع: الدالة h المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ:

$$h(x) = x-1+\ln x$$

لدينا:

$$h'(x) = 1+\frac{1}{x} = \frac{x+1}{x}$$

لدينا: $h'(x)>0$ ولدينا: $h(1)=0$ ومنه:

x	0		1		$+\infty$
$h'(x)$	‖	$+$			
$h(x)$	‖ $-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

من جدول تغيرات الدالة h نجد أن: لكل x من المجال $]0;1]$:

$$(x-1)+\ln x \le 0$$

وأنّ لكل x من المجال $[1;+\infty[$: $(x-1)+\ln x \ge 0$

ب/ تبيين أنّه من أجل كل من $]0;+\infty[$:

$f'(x) = \frac{x-1+\ln x}{x}$:

$$f'(x) = 1-\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\frac{2}{x}\ln x$$
$$= \frac{x-1+\ln x}{x}$$

$x>0$ ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط أي من إشارة $h(x)$

ج/ تشكيل جدول تغيرات الدالة f :

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$\frac{3}{2}$	↗	$+\infty$

❺ دراسة الوضع النسبي بين (D) و (C_f) :

ندرس إشارة الفرق $f(x)-y$:

$$f(x)-y=0 \Rightarrow \ln x\left(\frac{1}{2}\ln x-1\right)=0$$
$$\Rightarrow \begin{cases}\ln x=0\\ \frac{1}{2}\ln x-1=0\end{cases}$$
$$\Rightarrow \begin{cases}x=1\\ \ln x=2\end{cases}$$
$$\Rightarrow \begin{cases}x=1\\ x=e^2\end{cases}$$

ومنه:

x	0		1		e^2		$+\infty$
$\ln x$	‖ $-$		0	$+$		$+$	
$\frac{1}{2}\ln x-1$	‖ $-$		‖ $-$		0	$+$	
$f(x)-y$	‖ $+$		0	$-$	0	$+$	

- (C_f) فوق (D) لما: $x\in\,]0;1[\,\cup\,]e^2;+\infty[$
- (C_f) يقطع (D) في النقطتين: $A\left(1;\frac{3}{2}\right)$ وَ $B\left(e^2;e^2+\frac{1}{2}\right)$
- (C_f) تحت (D) لما: $x\in\,]1;e^2[$.

❻ تعيين احداثيي النقطة ω :

المماس (T) يوازي المستقيم (D) معناه:

$$f'(a)=1 \Rightarrow \frac{a-1+\ln a}{a}=1$$
$$\Rightarrow a-1+\ln a=a$$
$$\Rightarrow \ln a=1$$
$$\Rightarrow a=e$$

ومنه:

$$(T): y=f'(e)(x-e)+f(e)$$
$$= x-e+e+\frac{1}{2}-1+\frac{1}{2}$$
$$= x$$

اذن المستقيم (T) مماس لـ (C_f) في النقطة $\omega(e;e)$

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

❼

أ/ تبيين أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$:

$f''(x)=\frac{2-\ln x}{x^2}$:

$$f''(x)=\frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)x-(x-1+\ln x)}{x^2}$$
$$=\frac{x+1-x+1-\ln x}{x^2}$$
$$=\frac{2-\ln x}{x^2}$$

ب/ استنتاج أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف:

لدينا: $x^2>0$ ومنه إشارة $f''(x)$ من إشارة $(2-\ln x)$


$$2-\ln x=0\Rightarrow \ln x=2$$
$$\Rightarrow x=e^2$$

ومنه:

x	0		e^2		$+\infty$
$f'(x)$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

لدينا $f''(x)$ تنعدم وتغير اشارتها، ومنه (C_f) يقبل نقطة انعطاف $B\left(e^2;e^2+\frac{1}{2}\right)$

❽ التمثيل البياني:



❾ المناقشة البيانية:

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيمات ذات المعادلة: $y_m=x-2m$:

ومنه:

- لما $-2m<0$ أي لما $m>0$ المعادلة لا تقبل حلول
- لما $-2m=0$ أي لما $m=0$ المعادلة تقبل حل مضاعف
- لما $0<-2m<\frac{1}{2}$ أي لما $-\frac{1}{4}<m<0$ المعادلة تقبل حلان
- لما $-2m=\frac{1}{2}$ أي لما $m=-\frac{1}{4}$ المعادلة تقبل حلان أحدهما مضاعف
- لما $-2m>\frac{1}{2}$ أي $m<-\frac{1}{4}$ المعادلة تقبل حلان

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

I)

❶ حساب نهايات الدالة g عند أطراف مجموعة تعريفها:

- $\lim\limits_{x\to+\infty}[g(x)]=-\infty$
- $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\ >}}[g(x)]=-\infty$

لأن: $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\ >}}\left[\frac{x}{x+1}\right]=-\frac{1}{0^+}=-\infty$

❷ دراسة اتجاه تغير الدالة g :

- دراسة $g'(x)$:

$$g'(x)=\frac{x+1-x}{(x+1)^2}-2\frac{1}{x+1}$$
$$=\frac{1-2x-2}{(x+1)^2}$$
$$=\frac{-(2x+1)}{(x+1)^2}$$

لدينا: $(x+1)^2>0$ ومنه إشارة $g'(x)$ من إشارة البسط

$$-(2x+1)=0\Rightarrow 2x=-1$$
$$\Rightarrow x=-\frac{1}{2}$$

ومنه:

- جدول تغيرات الدالة g :

x	-1		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f\left(-\frac{1}{2}\right)$	↘	$-\infty$

❸

أ/ حساب $g(0)$:

$$g(0)=0$$

ب/ تبيين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين:

لدينا $h(0)=0$

اذن منحنى الدالة g يقطع محور الفواصل في المبدا

ولدينا الدالة g مستمرة ورتيبة على المجال

$]-0.72;-0.71[$

ولدينا $g(-0.71)\times g(-0.72)<0$

لأن: $g(-0.71)=0.02$ و $g(-0.72)=-0.02$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$

تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-0.71;-0.72[$

ج/ استنتاج إشارة $g(x)$ على المجال $]-1;+\infty[$:

x	-1		α		0		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	

II)

❶ حساب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها:

- $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\ >}}[f(x)]=-\infty$
- $\lim\limits_{\substack{x\to0\\ <}}[f(x)]=\lim\limits_{\substack{x\to0\\ <}}\left[\frac{\ln(x+1)}{x^2}\right]$

$$=\lim_{\substack{x\to0\\ <}}\left[\frac{1}{x}\times\underbrace{\frac{\ln(x+1)}{x}}_{\to 1}\right]$$
$$=\lim_{\substack{x\to0\\ <}}\left[\frac{1}{x}\right]=\frac{1}{0^-}=-\infty$$

$$\lim_{x\to0}\left[\frac{\ln(x+1)}{x}\right]=1$$

نهاية شهيرة ويمكن اثباتها بالعدد المشتق

نضع: $k(x)=\ln(x+1)$

ومنه: $k'(x)=\frac{1}{x+1}$

لدينا:

$$\lim_{x\to0}\left[\frac{\ln(x+1)}{x}\right]=\lim_{x\to0}\left[\frac{\ln(x+1)-0}{x-0}\right]$$
$$=\lim_{x\to0}\left[\frac{k(x)-k(0)}{x-0}\right]=k'(0)=1$$

- $\lim\limits_{\substack{x\to0\\ >}}[f(x)]=\frac{1}{0^+}=+\infty$
- $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]=0$

- التفسير الهندسي:

- (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي بجوار $-\infty$ معادلته $x=-1$.
- (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي بجوار $\pm\infty$ معادلته $x=0$.
- (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي بجوار $+\infty$ معادلته $y=0$.

أ/ تبيين أنه من أجل كل x من D_f $f'(x)=\frac{g(x)}{x^3}$:

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

$$f'(x)=\frac{\frac{1}{x+1}x^2-2x\ln(x+1)}{x^4}$$
$$=\frac{\frac{1}{x+1}x-2\ln(x+1)}{x^3}$$
$$=\frac{g(x)}{x^3}$$

ب/ استنتاج اتجاه تغير الدالة f :

x	-1		α		0		$+\infty$
$g(x)$	$-$	$\|$	0	$+$	0	$-$	
x^3	$-$	$\|$	$-$	$\|$	0	$+$	
$f'(x)$	$+$	$\|$	0	$-$	$\|$	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	$+\infty$	↘	0

❷ تبيين أن: $f(\alpha)=\frac{1}{2\alpha(\alpha+1)}$:

لدينا:

$$g(\alpha)=0\Rightarrow\frac{\alpha}{\alpha+1}-2\ln(\alpha+1)$$
$$\Rightarrow 2\ln(\alpha+1)=\frac{\alpha}{\alpha+1}$$
$$\Rightarrow \ln(\alpha+1)=\frac{\alpha}{2(\alpha+1)}$$

ولدينا:

$$f(\alpha)=\frac{\ln(\alpha+1)}{\alpha^2}$$
$$=\frac{\frac{\alpha}{2(\alpha+1)}}{\alpha^2}$$
$$=\frac{\alpha}{2\alpha^2(\alpha+1)}$$
$$=\frac{1}{2\alpha(\alpha+1)}$$

- حصر $f(\alpha)$:

لدينا:

$$-0.72<\alpha<-0.71$$
$$0.28<\alpha+1<0.29\ldots(*)$$

ولدينا:

$$-1.44<2\alpha<-1.42\ldots(**)$$


بضرب $(*)$ في $(**)$ نجد:

$$-0.41<2\alpha(\alpha+1)<-0.39$$
$$-2.56<\frac{1}{2\alpha(\alpha+1)}<-2.43$$

اذن:

$$-2.56<f(\alpha)<-2.43$$

❸ التمثيل البياني:



❹ المناقشة البيانية:

حلول المعادلة (E) هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيمات ذات المعادلة: $y_m=\ln m$ وهي:

- لما $\ln m<f(\alpha)$ أي لما: $m<e^{f(\alpha)}$
للمعادلة حلان سالبان
- لما $\ln m=f(\alpha)$ أي لما: $m=e^{f(\alpha)}$
للمعادلة حل مضاعف
- لما $f(\alpha)<\ln m<0$ أي لما: $e^{f(\alpha)}<m<1$
المعادلة لا تقبل حلول
- لما $\ln m>0$ أي لما: $m>1$
للمعادلة حل وحيد موجب

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

(I

❶ دراسة تغيرات الدالة g، ثم تشكيل جدول تغيراتها:

- تعيين النهايات:

• $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ >}} g(x) = -\infty$

• $\lim\limits_{x\to +\infty} g(x) = +\infty$

- دراسة $g'(x)$:

$$g'(x) = e + \frac{2}{x+1}$$
$$= \frac{ex + e + 2}{x+1} > 0$$

ومنه :

x	-1		$+\infty$
$g'(x)$	$\|$	$+$	
$g(x)$	$\|$ $-\infty$	↗	$+\infty$

❷ تبيين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث:

$-0.34 < \alpha < -0.33$:

لدينا الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $]-1;+\infty[$

ولدينا: $g(-0.34) \times g(-0.33) < 0$

لأنّ: $g(-0.34) \approx -0.04$ وَ $g(-0.33) \approx 0.02$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$

تقبل حلا وحيدا α حيث $-0.34 < \alpha < -0.33$

❸ استنتاج إشارة $g(x)$:

x	-1	α	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

(II

❶

أ/ تبيين أن $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ >}} f(x) = -\infty$:

$$\lim_{x\to -1} f(x) = \lim_{\substack{x\to -1\\ >}} \left[\underbrace{\frac{1}{x+1}}_{=+\infty}\left(e + \underbrace{\frac{\ln(x+1)}{x+1}}_{=-\infty}\right)\right]$$
$$= -\infty$$

ومنه (C_f) يقبل مقارب عمودي بجوار $-\infty$ معادلته $x = -1$

- حساب $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$:

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = 0$$

ومنه (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي بجوار $+\infty$ معادلته $y = 0$

ب/ تبيين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-1;+\infty[$:

$f'(x) = \frac{-g(x)}{(x+1)^3}$:

$$f'(x) = -\frac{e}{(x+1)^2} + \frac{1}{x+1}\frac{(x+1)^2 - 2(x+1)\ln(x+1)}{(x+1)^4}$$
$$= \frac{-e(x+1)^2 + (x+1) - 2(x+1)\ln(x+1)}{(x+1)^4}$$
$$= \frac{-e(x+1) + 1 - 2\ln(x+1)}{(x+1)^3}$$
$$= -\frac{e(x+1) - 1 + 2\ln(x+1)}{(x+1)^3}$$
$$= \frac{-g(x)}{(x+1)^3}$$

ج/ دراسة اتجاه تغير الدالة:

إشارة $f'(x)$ من إشارة $[-g(x)]$

لأنّ: $(x+1)^3 > 0$ لما: $x \in D_f$

ومنه:

- جدول تغيرات الدالة f:


x	-1		α		$+\infty$
$f'(x)$	$\|$	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$\|$ $-\infty$	↗	3.16	↘	0

د/ رسم المنحنى (C_f) :

- نرسم المستقيم المقارب الأفقي ذو المعادلة $y = 0$
- نرسم المستقيم المقارب العمودي ذو المعادلة $x = -1$
- نعين النقطة α
- باستعمال جدول تغيرات الدالة f نكمل رسم (C_f)

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM



❷

أ/ تبيين أن الدالة k زوجية:

$$\begin{aligned} k(-x) &= f(-|-x|) \\ &= f(-|x|) \\ &= k(x) \end{aligned}$$

ومنه k دالة زوجية.

ب/ تبيين كيف يمكن استنتاج (C_k) انطلاقا من (C_f) :


لدينا:

$$\begin{aligned} k(x) &= f(-|x|) \\ &= \begin{cases} f(-x) & ; \quad x \in [0;1[\\ f(-(-x)) & ; \quad x \in]-1;0[\end{cases} \\ &= \begin{cases} f(-x) & ; \quad x \in [0;1[\\ f(x) & ; \quad x \in]-1;0[\end{cases} \end{aligned}$$

ومنه (C_k) ينطبق على (C_f) في المجال $]-1;0[$

وبما أن الدالة k زوجية فهي متناظرة بالنسبة لمحور التراتيب.

- رسم (C_k) :



ج/ المناقشة البيانية:

$$k(x) = m$$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_k) مع المستقيمات ذات المعادلة $y_m = m$.

لدينا: $k(0) = f(0) = e$

ومنه المناقشة:

لما $m < e$ المعادلة تقبل حلين متمايزين

لما $m = e$ المعادلة تقبل ثلاثة حلول: حل معدوم وحل موجب وآخر سالب

لما $e < m < f(\alpha)$ المعادلة أربع حلول: حلين موجبين وآخرين سالبين

لما $m = f(\alpha)$ المعادلة تقبل حلين مضاعفين أحدهما موجب والآخر سالب

لما $m > f(\alpha)$ المعادلة لا تقبل حلول

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

I)

❶ دراسة تغيرات الدالة g :

- حساب النهايات:

• $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}}[g(x)]=-\infty$ • $\lim\limits_{x\to+\infty}[g(x)]=+\infty$

- دراسة $g'(x)$:

$$g'(x)=\frac{1}{x}+1$$

لدينا: $g'(x)>0$

ومنه:

- جدول تغيرات $g(x)$:

x	0		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

❷ تبيين ان المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α :

لدينا الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$

ولدينا: $g(2.2)\times g(2.11)<0$

لأنّ: $g(2.2)=-0.01$ و $g(2.11)=0.002$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة، المعادلة $g(x)=0$

تقبل حلا وحيدا α حيث: $2.2<\alpha<2.21$

❸ تعيين إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$:

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$	‖ $-$	0	$+$

II)

❶ حساب: $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}}[f(x)]$:

• $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]=+\infty$ • $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}}[f(x)]=+\infty$

❷

أ/ حساب $f'(x)$ ، ودراسة اشارتها:

$$f'(x)=\frac{1}{x^2}(\ln x-2)+\frac{1}{x}\left(1-\frac{1}{x}\right)$$
$$=\frac{1}{x^2}(\ln x-2)+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}$$
$$=\frac{1}{x^2}(\ln x-2+x-1)$$
$$=\frac{1}{x^2}(\ln x+x-3)$$
$$=\frac{g(x)}{x^2}$$

لدينا: $x^2>0$ ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$.

ب/ تشكيل جدول تغيرات الدالة f :

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	‖ $-$	0	$+$
$f(x)$	‖ $+\infty$ ↘	$f(\alpha)$	↗ $+\infty$

❸ تعيين دون حساب $\lim\limits_{x\to\alpha}\left[\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}\right]$:

$$\lim_{x\to\alpha}\left[\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}\right]=f'(\alpha)=\frac{g(\alpha)}{\alpha^2}=0$$

- التفسير الهندسي:

(C_f) يقبل مماس موازٍ لحامل محور الفواصل عند النقطة ذات الفاصلة α .

❹ تبيين أن: $f(\alpha)=-\frac{(\alpha-1)^2}{\alpha}$:

لدينا:

$$g(\alpha)=0\Rightarrow\ln\alpha+\alpha-3=0$$
$$\Rightarrow\ln\alpha=3-\alpha$$

ولدينا:

$$f(\alpha)=\left(1-\frac{1}{\alpha}\right)(\ln\alpha-2)$$
$$=\left(1-\frac{1}{\alpha}\right)(3-\alpha-2)$$
$$=\left(1-\frac{1}{\alpha}\right)(1-\alpha)$$
$$=\frac{(\alpha-1)(1-\alpha)}{a}$$
$$=\frac{-(\alpha-1)^2}{\alpha}$$

❺ حل المعادلة $f(x)=0$:

$$f(x)=0\Rightarrow\left(1-\frac{1}{x}\right)(\ln x-2)=0$$
$$\Rightarrow\begin{cases}1-\frac{1}{x}=0\\ \ln x-2=0\end{cases}$$
$$\Rightarrow\begin{cases}\frac{1}{x}=1\\ \ln x=2\end{cases}$$

الخليل للرياضيات


قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = e^2 \end{cases}$$

- **التفسير الهندسي:**

(C_f) يقطع حامل محور الفواصل في النقطتين: $A(1;0)$ و$B(e^2;0)$.

❻ التمثيل البياني:



قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

11 حل المسـألة رقم:

مشاهـــدة المسألة

(I

❶ تبيين أنّ الدالة g متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$:

$$g'(x)=2\frac{1}{x}-\left(-\frac{2}{x^3}\right)=\frac{2}{x}+\frac{2}{x^3}=\frac{2x^2+2}{x^3}>0$$

ومنه الدالة g متزايدة تماما على $\mathbb{R}_+^*$

❷

أ/ تبيين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α

لدينا الدالة g مستمرة ورتيبة على المجال $]0;+\infty[$

ولدينا: $g(1.9)\times g(1.89)<0$

لأنّ: $g(1.9)\approx 0.01$ و $g(-1.9)\approx -0.01$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$

تقبل حلا وحيدا α في المجال $]0;+\infty[$

ب/ استنتاج إشارة $g(x)$:

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

(II

❶

أ/ حساب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$، وتفسير النتيجة هندسيا:

- $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}(-x^2-2x+3+2\ln x)\right)=-\infty$

التفسير الهندسي:

(C_f) قبل مقارب عمودي بجوار $-\infty$ معادلته $x=0$

ب/ حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(-x-2+\underbrace{\frac{3}{x}}_{0}+2\underbrace{\frac{\ln x}{x}}_{0}\right)=-\infty$$

❷

أ/ تبيين أنه $f'(x)=\frac{1}{x^2}g\left(\frac{1}{x}\right)$:

$$f'(x)=-1+\frac{2\frac{1}{x}x-3-2\ln x}{x^2}$$
$$=-1+\frac{-1-2\ln x}{x^2}$$
$$=\frac{-x^2-1-2\ln x}{x^2}$$
$$=\frac{1}{x^2}(-x^2-1-2\ln x)$$
$$=\frac{1}{x^2}\left(-\frac{1}{\frac{1}{x^2}}-1+2\ln\frac{1}{x}\right)$$
$$=\frac{1}{x^2}g\left(\frac{1}{x}\right)$$

ب/ تبيين أنّ الدالة f متزايدة تماما على المجال $\left]0;\frac{1}{\alpha}\right]$

ومتناقصة تماما على المجال $\left[\frac{1}{\alpha};+\infty\right[$:

لدينا: $\frac{1}{x^2}>0$ لما $x\in]0;+\infty[$

ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة $g\left(\frac{1}{x}\right)$

لدينا:

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

ومنه:

x	0	$\frac{1}{\alpha}$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$	↘ $-\infty$

❸

أ/ حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(-x-2)]$:

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-(-x-2)]=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3+\ln x}{x}\right)$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3}{x}+\frac{\ln x}{x}\right)$$
$$=0$$

ومنه (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل بجوار $+\infty$ معادلته:

$$y_{(\Delta)}=-x-2$$

ب/ دراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ):

$$f(x)-y_{(\Delta)}=0\Rightarrow\frac{3+\ln x}{x}=0$$
$$\Rightarrow 3+\ln x=0$$
$$\Rightarrow \ln x=-3$$
$$\Rightarrow x=e^{-3}$$

ومنه:

x	0	e^{-3}	$+\infty$
$f(x)-y_{(\Delta)}$	$-$	0	$+$

- (C_f) تحت (Δ) لما $x\in]0;e^{-3}[$
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $B(e^{-3};-e^{-3}-2)$

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

- (C_f) فوق (Δ) لما $x \in]e^{-3}; +\infty[$

❹

أ/ تبيين أنّ (C_f) يقبل نقطة انعطاف A فاصلتها 1

لدينا:

$$f'(x) = \frac{-x^2 - 1 - 2\ln x}{x^2}$$

ومنه:

$$f''(x) = \frac{\left(-2x - 2\frac{1}{x}\right)x^2 - 2x(-x^2 - 1 - 2\ln x)}{x^4}$$
$$= \frac{-2x^3 + 2x + 2x^3 + 2x + 4x\ln x}{x^4}$$
$$= \frac{4x\ln x}{x^4}$$
$$= \frac{4\ln x}{x^3}$$

لدينا: $x^3 > 0$ لما $x \in \mathbb{R}_+^*$

ومنه إشارة $f''(x)$ من إشارة $\ln x$

$$\ln x = 0 \Rightarrow x = 1$$

x	0	1	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$


المشتقة الثانية تنعدم وتغير إشارتها

إذن (C_f) يقبل نقطة انعطاف فاصلتها 1

ب/ كتابة معادلة مماس لـ (C_f) عند A:

$$y_{(T)} = f'(1)(x-1) + f(1)$$
$$= -2(x-1)$$
$$= -2x + 2$$

❺ رسم (T)، (Δ) و (C_f) :



(III)

❶ تبيين أنّ الدالة h زوجية:

$$h(-x) = |-x| + 2 - \frac{3 + ln((-x)^2)}{|-x|}$$
$$= |x| + 2 - \frac{3 + ln(x^2)}{|x|}$$
$$= h(x)$$

❷ التحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$: $h(x) = -f(x)$


$$h(x) = |x| + 2 - \frac{3 + ln(x^2)}{|x|}$$
$$= \begin{cases} x + 2 - \dfrac{3 + ln(x^2)}{x} & ; \ x > 0 \\ -x + 2 - \dfrac{3 + ln((-x)^2)}{-x} & ; \ x < 0 \end{cases}$$
$$= \begin{cases} -\left(-x - 2 + \dfrac{3 + 2\,ln(x)}{x}\right) & ; \ x > 0 \\ -x + 2 + \dfrac{3 + 2\,ln(-x)}{x} & ; \ x < 0 \end{cases}$$
$$= \begin{cases} -f(x) & ; \ x > 0 \\ -x + 2 + \dfrac{3 + 2\,ln(-x)}{x} & ; \ x < 0 \end{cases}$$

❸ شرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) :

لما $x \in \mathbb{R}_+^*$:

(C_h) يناظر (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل

وبما أنّ الدالة h زوجية فهي متناظرة بالنسبة لمحور التراتيب



الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

حل المسألة رقم: 12

مشاهدة المسألة

(I

❶

أ/ اثبات أنّ $y = \frac{1}{m}x - 1 + \ln m$ معادلة لـ (T_m):

لدينا: $f(x) = \ln x$

ومنه:

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$
$$y_{(T_m)} = f'(m)(x-m) + f(m)$$
$$= \frac{1}{m}(x-m) + \ln m$$
$$= \frac{1}{m}x - 1 + \ln m$$

ب/ التحقق أنّ المماس (T_e) للمنحنى (C) في النقطة $B(e;1)$ يمر بالنقطة O مبدأ المعلم:

لدينا:

$$y_{(T_e)} = \frac{1}{e}x - 1 + \ln e = \frac{1}{e}x$$

نعوض النقطة $O(0;0)$ في معادلة المستقيم (T_e) نجد:

$$0 = \frac{1}{e}(0) \Rightarrow 0 = 0$$

إذن (T_e) يمر بمبدأ المعلم

❷

أ/ دراسة تغيرات الدالة g:

- النهايات:

• $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) =$

$$= \lim_{x\to+\infty}\left(x\left(\frac{1}{m} - \underbrace{\frac{1}{x}}_{0} + \underbrace{\frac{\ln m}{x}}_{0} - \underbrace{\frac{\ln x}{x}}_{0}\right)\right)$$

$= +\infty$

• $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} g(x) = +\infty$

- دراسة إشارة $g'(x)$:

$$g'(x) = \frac{1}{m} - \frac{1}{x}$$
$$= \frac{x-m}{mx}$$

لدينا:

$$g'(x) = 0 \Rightarrow \frac{x-m}{mx} = 0$$
$$\Rightarrow x - m = 0$$
$$\Rightarrow x = m$$

x	0		m		$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0		$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

ب/ استنتاج إشارة $g(x)$:

من جدول تغيرات الدالة g نلاحظ أنها تبلغ قيمة حدية دنيا موجبة 0

وعليه فالدالة g موجبة على $]0;+\infty[$

❸ استنتاج مما سبق أن (C) يقع تحت أي مماس له:

ندرس الوضعية بين (C) و (T_m)

$$y_{(C)} - y_{(T)} = \ln x - \left(\frac{1}{m}x - 1 + \ln m\right)$$
$$= \ln x - \frac{1}{m}x + 1 - \ln m$$
$$= -\left(-\ln x + \frac{1}{m}x - 1 + \ln m\right)$$
$$= -g(x)$$

إشارة الفرق عكس إشارة $g(x)$

وعليه فإن (C) يقع تحت أي مماس له

(II

❶

أ/ استنتاج أنه من أجل كل عددين حقيقين موجبين تماما m و x يكون: $\ln x \le \ln m + \frac{x-m}{m}$:

لدينا:

$$g(x) \ge 0 \Rightarrow \frac{1}{m}x - 1 + \ln m - \ln x \ge 0$$
$$\Rightarrow \frac{1}{m}x - 1 + \ln m \ge \ln x$$
$$\Rightarrow \frac{x-m}{m} + \ln m \ge \ln x$$

ب/ استنتاج أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماما m يكون: $\ln(m+1) - \ln m \le \frac{1}{m}$:

(III

❶

أ/ دراسة اتجاه تغير الدالة f على $]0;+\infty[$:

$$f'(x) = \frac{1}{x} + 1 = \frac{1+x}{x}$$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

لدينا: $f'(x) > 0$ لما $x \in]0;+\infty[$

ومنه فالدالة f متزايدة تماما على $]0;+\infty[$

ب/ استنتاج صحة المتباينة $\ln x \leq x - 1$:

لدينا مما سبق

$$\frac{x-m}{m} + \ln m \geq \ln x$$

بأخذ $m = 1$ نجد:

$$x - 1 \geq \ln x$$

❷

أ/ اثبات أنّ: $\ln(t+1) \leq t$:

يكفي أن نثبت انّ: $\ln(t+1) - t \leq 0$

نضع: $h(t) = \ln(t+1) - t$

لدينا: $h'(t) = \frac{1}{t+1} - 1 = \frac{-t}{t+1}$

لدينا: $t + 1 < 0$ لما $t > -1$ ومنه إشارة $h'(t)$ من إشارة $(-t)$

$$-t = 0 \Rightarrow t = 0$$

ومنه الدالة h متناقصة تماما لما $t > -1$

x	-1	0	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	0	$-$
$g(x)$	$-\infty$	0	$-\infty$

من جدول تغيرات الدالة h نلاحظ أنها تبلغ قيمة حدية كبرى قيمتها 0

وعليه فالدالة h سالبة على $]-1;+\infty[$

ومنه: $\ln(t+1) - t \leq 0$

وعليه: $ln(t+1) \leq t$

ب/ اثبات أنّ: $\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t)$:

لدينا سابقا:

$$x - 1 \geq \ln x$$

بوضع: $x = \frac{1}{1+t}$

نجد:

$$\frac{1}{1+t} - 1 \geq \ln\left(\frac{1}{1+t}\right)$$
$$\Rightarrow \frac{1-1-t}{1+t} \geq -\ln(1+t)$$
$$\Rightarrow \frac{-t}{1+t} \geq -\ln(1+t)$$
$$\Rightarrow \frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t)$$

ج/ استنتاج صحة المتباينة $\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t) \leq t$

لدينا سابقا:

$$\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t) \ldots (*)$$

ولدينا أيضا:

$$ln(t+1) \leq t \ldots (*)$$

من $(*)$ و $(**)$ نجد أنّ:

$$\frac{t}{1+t} \leq ln(1+t) \leq t$$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

13 حل المسـألة رقم:

مشاهـــدة المسألة

(I)

❶ دراسة تغيرات الدالة g :

- حساب النهايات:

• $\lim\limits_{x\to 0}[g(x)] = -\infty$

• $\lim\limits_{x\to +\infty}[g(x)] = +\infty$

- دراسة $g'(x)$:

$$g'(x) = 2x + \frac{1}{x}$$
$$= \frac{2x^2+1}{x}$$

لدينا $g'(x) > 0$ ومنه:

- جدول تغيرات $g(x)$:

x	0		$+\infty$
$g'(x)$	$\|$	$+$	
$g(x)$	$\|$ $-\infty$	↗	$+\infty$

❷ تبيين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α :

لدينا: الدالة g مستمرة ومتزايدة على مجال تعريفها

ولدينا: $g(0.33) = 0.0002$ و $g(0.32) = -0.03$

أي: $g(0.33) \times g(0.32) < 0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$

تقبل حلا وحيدا α حيث: $0.32 < \alpha < 0.33$.

❸ استنتاج حسب قيم x إشارة $g(x)$:

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$	$\|$ $-$	0	$+$

(II)

❶ حساب نهايات الدالة عند أطراف مجموعة تعريفها:

• $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}}[f(x)] = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}}\left[-x + \frac{\overbrace{2+\ln x}^{-\infty}}{\underbrace{x}_{0^+}}\right] = -\infty$

- التفسير الهندسي:

(C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي بجوار $-\infty$ معادلته:

$$x = 0$$

• $\lim\limits_{x\to +\infty}[f(x)] = \lim\limits_{x\to +\infty}\left[-x + \frac{2}{x} + \frac{\ln x}{x}\right] = -\infty$

لأن: $\lim\limits_{x\to +\infty}\left[\frac{\ln x}{x}\right] = 0$

❷ تبيين أنه من أجل كل x من D_f: $f'(x) = -\frac{g(x)}{x^2}$:

$$f'(x) = -1 + \frac{\frac{1}{x}x - (2+\ln x)}{x^2}$$
$$= \frac{-x^2 - 1 - \ln x}{x^2}$$
$$= -\frac{x^2+1+\ln x}{x^2}$$
$$= -\frac{g(x)}{x^2}$$

لدينا $x^2 > 0$ ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$.

- جدول التغيرات:

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	$\|$	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$\|$ $-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	$+\infty$

❸ تبيين أن: $f(\alpha) = 2\left(\frac{1}{2\alpha} - \alpha\right)$:

لدينا:

$$g(\alpha) = 0 \Rightarrow \alpha^2 + 1 + \ln\alpha = 0$$
$$\Rightarrow \ln\alpha = -(\alpha^2+1)$$

ولدينا:

$$f(\alpha) = -\alpha + \frac{2+\ln\alpha}{\alpha}$$
$$= \frac{-\alpha^2 + 2 - (\alpha^2+1)}{\alpha}$$
$$= \frac{-2\alpha^2+1}{\alpha}$$
$$= 2\left(\frac{1}{2\alpha} - \alpha\right)$$

- حصر $f(\alpha)$:

لدينا:

$$0.32 < \alpha < 0.33$$
$$-0.33 < -\alpha < -0.32 \ldots (1)$$

ولدينا:

$$0.32 < \alpha < 0.33$$
$$0.64 < 2\alpha < 0.66$$
$$\frac{1}{0.66} < \frac{1}{2\alpha} < \frac{1}{0.64}$$

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

$$1.51 < \frac{1}{2\alpha} < 1.66 \dots (2)$$

بجمع (1) و (2) طرفا لطرف نجد:

$$1.18 < \frac{1}{2\alpha} - \alpha < 1.34$$

$$2.18 < 2\left(\frac{1}{2\alpha} - \alpha\right) < 2.34$$

إذن:

$$2.18 < f(\alpha) < 2.34$$

❹

أ/ حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)+x]$:

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)+x] = \lim_{x\to+\infty}\left[-x+\frac{2+\ln x}{x}+x\right]$$
$$= \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{2+\ln x}{x}\right]$$
$$= \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{2}{x}+\frac{\ln x}{x}\right]$$
$$= 0$$

ومنه (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته $y = -x$

ب/ دراسة الوضع النسبي بين (C_f) و (Δ) :

ندرس إشارة الفرق $f(x) - y$:

$$f(x) - y = \frac{2+\ln x}{x}$$

لدينا $x > 0$ ومنه الإشارة من البسط:

$$2 + \ln x = 0 \Rightarrow \ln x = -2$$
$$\Rightarrow x = e^{-2}$$

ومنه:

x	0	e^{-2}	$+\infty$
$f(x)-x$	$\|$ $-$	0	$+$

- (C_f) تحت (Δ) لما $x \in]0; e^{-2}[$.
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطة ذات الفاصلة e^{-2} .
- (C_f) فوق (Δ) لما $x \in]e^{-2}; +\infty[$.

❺ اثبات أن (C_f) يقبل مماس (T) يوازي (Δ) :

(T) يوازي (Δ) معناه: $f'(\alpha) = -1$

ومنه:

$$f'(\alpha) = -1 \Rightarrow -\frac{\alpha^2+1+\ln\alpha}{\alpha^2} = -1$$
$$\Rightarrow \alpha^2 + 1 + \ln\alpha = \alpha^2$$
$$\Rightarrow 1 + \ln\alpha = 0$$
$$\Rightarrow \ln\alpha = -1$$
$$\Rightarrow \alpha = e^{-1}$$

ومنه:


$$(T): y = f'(\alpha)(x-\alpha) + f(\alpha)$$

$$= -x + e^{-1} - e^{-1} + \frac{2+\ln e^{-1}}{e^{-1}}$$
$$= -x + e$$

❻ التمثيل البياني:

خطوات التمثيل على معلم متعامد ومتجانس:

- نرسم المستقيم المقارب العمودي : $x = 0$
- نعين x_0 و x_1 نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع محور الفواصل
- نرسم المستقيم المقارب المائل :(Δ)
- نرسم المماس (T)
- ثم باستعمال جدول التغيرات نرسم (C_f)



(III)

❶

أ/ تبيين أنّه : $h(x) = f(x+1) + 2$:

$$f(x+1)+2 =$$
$$= -(x+1) + \frac{2+\ln(x+1)}{x+1} + 2$$
$$= -x - 1 + \frac{2+\ln(x+1)}{x+1} + 2$$
$$= -x + 1 + \frac{2+\ln(x+1)}{x+1}$$
$$= h(x)$$

ب/ تبيين أن (D) مقارب مائل لـ (C_h) في جوار $+\infty$:

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

لدينا:

$$\lim_{x\to+\infty}[h(x)-(-x+1)]=$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\left[-x+1+\frac{2+\ln(x+1)}{x+1}-(-x+1)\right]$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{2+\ln(x+1)}{x+1}\right]$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{2}{x+1}+\frac{\ln(x+1)}{x+1}\right]$$
$$=0$$

ومنه المستقيم (D) ذو المعادلة $y=-x+1$ مقارب مائل لـ (C_h) في جوار $+\infty$

❷


أ/ تبيين أن المنحنى (C_h) هو صورة المنحنى (C_f) بتحويل بسيط يُطلب تعيينه :

$$h(x)=f(x+1)+2$$
$$=f\big(x-(-1)\big)+2$$

ومنه (C_h) هو صورة (C_f) بانسحاب شعاعه: $\vec{u}(-1;2)$

ب/ التمثيل البياني لـ (C_h) :

تمثيل (C_f) و (C_h) :



❸

أ/ برهان أن جميع المستقيمات (T_m) تشمل نقطة ثابتة يُطلب تعيينها:

نفرض أن النقطة $A(x_1;y_1)$ تنتمي إلى المستقيم (T_m) ونبرهن أنها ثابتة:

لدينا: A تنتمي إلى (T_m) معناه:

$$y_1=\ln(|m|)\,x_1+1$$
$$\Rightarrow \ln(|m|)\,x_1-y_1+1=0\ldots(3)$$

المعادلة (3) عبارة عن كثير حدود متغيره $\ln(|m|)$ وينعدم اذا انعدمت جميع معاملاته

أي:

$$\begin{cases}x_1=0\\-y_1+1=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=0\\y_1=1\end{cases}$$

اذن: المستقيمات (T_m) تشمل النقطة $A(0;1)$

ب/ المناقشة البيانية:

حلول المعادلة (E) هي فواصل نقط تقاطع (C_h) مع المستقيمات ذات المعادلة

$$y_m=\ln(|m|)\,x+1$$

ومنه:

- لما $\ln|m|=-1$ أي لما $|m|=e^{-1}$
  أي لما $m\in\{-e^{-1};e^{-1}\}$
  المعادلة تقبل حلا وحيدا
- لما $\ln|m|<-1$ أي لما $|m|<e^{-1}$
  أي لما $-e^{-1}<m<e^{\wedge}-1$
  المعادلة تقبل حلا وحيدا
- لما $\ln|m|>-1$ أي لما $|m|>e^{-1}$
  أي لما $m\in]-\infty;-e^{-1}[\cup]e^{-1};+\infty$
  المعادلة تقبل حلان

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

14 حل المسـألة رقم:

مشاهـــدة المسألة

(I)

❶ دراسة تغيرات الدالة g :

- حساب النهايات:

• $\lim\limits_{x\to 0^{>}}[g(x)]=-\infty$ • $\lim\limits_{x\to+\infty}[g(x)]=+\infty$

- دراسة $g'(x)$:

$$g'(x)=3\frac{1}{x}(\ln x)^2$$

لدينا: $g'(x)>0$ و $g'(1)=0$

ومنه

- جدول التغيرات:

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	0	$+$
$g(x)$	$-\infty$ ↗	0 ↗	$+\infty$

❷ حل المعادلة $g(x)=0$:

لدينا:

$$\begin{aligned} g(x)=0 &\Rightarrow (\ln x)^3+1\\ &\Rightarrow (\ln x)^3=-1\\ &\Rightarrow \ln x=-1\\ &\Rightarrow x=e^{-1}\end{aligned}$$

اذن حلول المعادلة $g(x)=0$ هي: $s=\{e^{-1}\}$

❸ استنتاج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$:

x	0	e^{-1}	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

(II)

❶ حساب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها:

• $\lim\limits_{x\to 0^{>}}[f(x)]=+\infty$

• $\lim\limits_{x\to 1^{<}}[f(x)]=-\frac{2}{0^-}=+\infty$

• $\lim\limits_{x\to 1^{>}}[f(x)]=-\frac{2}{0^+}=-\infty$

• $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]=+\infty$

- التفسير الهندسي:

(C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي بجوار $+\infty$ معادلته $x=0$

(C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي بجوار $\pm\infty$ معادلته $x=1$

❷ تبيين أن $f'(x)=2\frac{g(x)}{x(\ln x)^2}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2\frac{1}{x}\ln x-\left(\frac{-\frac{2}{x}}{(\ln x)^2}\right)\\ &=\frac{2\ln x}{x}+\frac{2}{x(\ln x)^2}\\ &=2\left[\frac{(\ln x)^3+1}{x(\ln x)^2}\right]\\ &=\frac{2g(x)}{x(\ln x)^2}\end{aligned}$$

❸ استنتاج إشارة $f'(x)$:

لدينا: $x(\ln x)^2>0$

ومنه إشارة $f'(x)$ من اشارة $g(x)$.

- جدول تغيرات الدالة f :

x	0	e^{-1}	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	4 ↗	$+\infty$	$+\infty$ ↗ $-\infty$

(III)

❶ دراسة تغيرات الدالة h :

- النهايات:

• $\lim\limits_{x\to 0^{>}}[h(x)]=+\infty$ • $\lim\limits_{x\to+\infty}[h(x)]+\infty$

- دراسة $h'(x)$:

$$h'(x)=\frac{2}{x}\ln x$$

لدينا $\frac{2}{x}>0$ ومنه :

$$\ln x=0\Rightarrow x=1$$

- جدول تغيرات الدالة h:

x	0	1	$+\infty$
$h'(x)$	$-$	0	$+$
$h(x)$	$+\infty$ ↘	1	↗ $+\infty$

❷ حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-h(x)]$:

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-h(x)]=$$

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

$$= \lim_{x\to+\infty}\left[(\ln x)^2+1-\frac{2}{\ln x}-(\ln x)^2-1\right]$$
$$= \lim_{x\to+\infty}\left[-\frac{2}{\ln x}\right]$$
$$= 0$$

- التفسير الهندسي:

(C_h) و (C_f) متقاربان بجوار $+\infty$

❸ دراسة الوضع النسبي بين المنحنيين (C_f) و (C_h) :

ندرس إشارة الفرق $f(x)-h(x)$:

$$f(x)-h(x)=\frac{2}{-\ln x}$$

لدينا:

$$-\ln x=0 \Rightarrow x=1$$

ومنه:

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-h(x)$	$\|$	$+$	$\|$	$-$	

- (C_f) فوق (C_h) لما $x\in\,]0;1[$.
- (C_f) تحت (C_h) لما $x\in\,]1;+\infty[$

❹ تبيين أن (C_h) يقبل A نقطة انعطاف:

لدينا:

$$h''(x)=\frac{-2}{x^2}\ln x+\frac{1}{x}\cdot\frac{2}{x}$$
$$=\frac{-2\ln x+2}{x^2}$$
$$=\frac{2}{x^2}(1-\ln x)$$

لدينا $\frac{2}{x^2}>0$ ومنه الإشارة من $(1-\ln x)$:

$$1-\ln x=0 \Rightarrow \ln x=1$$
$$\Rightarrow x=e$$

x	0		e		$+\infty$
$h''(x)$	$\|$	$+$	0	$-$	

لدينا $h''(x)$ انعدمت وغيرت اشارتها ومنه المنحنى (C_h)

يقبل نقطة انعطاف احداثييها $A(e;2)$

❺ كتابة معادلة المماس (T) لـ (C_h) في النقطة A :

$$(T): y=h'(e)(x-e)+h(e)$$
$$=\frac{2}{e}\ln e\,(x-e)+(\ln e)^2+1$$
$$=\frac{2}{e}x$$

❻ حساب $f(e)$:


$$f(e)=(\ln e)^2+1-\frac{2}{\ln e}=0$$

- الاستنتاج:

(C_f) يقطع حامل محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة e .

❼ التمثيل البياني:

- نرسم المستقيمات المقاربة: $x=1$ و $x=0$
- نرسم المماس (T)
- نعين A نقطة انعطاف المنحنى (C_h)
- باستعمال جدول تغيرات الدالة h نرسم (C_h)
- نعين نقطة تقاطع المنحنى (C_f) مع محور الفواصل
- ثم باستعمال جدول تغيرات الدالة f نرسم (C_f)



❽ المناقشة البيانية:

لدينا:

$$e^m(\ln x)^3+e^m\ln x-\ln x-2e^m=0$$
$$\Rightarrow e^m[(\ln x)^3+\ln x-2]=\ln x$$
$$\Rightarrow e^m\left[(\ln x)^2+1-\frac{2}{\ln x}\right]=1$$
$$\Rightarrow e^m[f(x)]=1$$
$$\Rightarrow f(x)=e^{-m}$$

ومنه حلول المعادلة (E) هل فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيمات ذات المعادلة $y_m=e^{-m}$

- لما: $e^{-m}<4$ أي لما: $-m<\ln 4$

أي لما: $m>-\ln 4$ المعادلة تقبل حل وحيد

- لما: $e^{-m}=4$ أي لما: $-m=\ln 4$

أي لما: $m=-\ln 4$

المعادلة تقبل حلين احدهما مضاعف

- لما: $e^{-m}>4$ أي لما: $-m>\ln 4$

أي لما: $m<-\ln 4$ المعادلة تقبل ثلاث حلول

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

حل المسـألة رقم: 15

مشاهـــدة المسألة

(I)

❶ حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^{>}} f(x)$:

- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$
- $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^{>}} f(x) = -\infty$

❷ تبيين أن الدالة f متزايدة تماما على المجال I:

$$f'(x) = \frac{2}{2x-1} > 0$$

ومنه الدالة f متزايدة تماما على المجال I

- جدول تغيرات الدالة f:

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

❸ تعيين فاصلة النقطة من (C_f) التي يكون فيها المماس موازيا للمستقيم (d) ذي المعادلة $y = x$:

$$f'(x_0) = 1 \Rightarrow \frac{2}{2x_0-1} = 1$$
$$\Rightarrow 2x_0 - 1 = 2$$
$$\Rightarrow x_0 = \frac{1}{2}$$

فاصلة النقطة من (C_f) التي يكون فيها المماس موازيا للمستقيم (d) هي $x_0 = \frac{1}{2}$

❹

أ/ اثبات أنه من أجل كل x من I يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل: $f(x) = \ln(x+a) + b$:

$$f(x) = 1 + \ln(2x-1)$$
$$= 1 + \ln\left(2\left(x-\frac{1}{2}\right)\right)$$
$$= 1 + \ln\left(x-\frac{1}{2}\right) + \ln 2$$

بالمطابقة نجد:

$$\begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = 1 + \ln 2 \end{cases}$$

ب/ استنتاج أنه يمكن رسم (C_f) انطلاقا من (C) منحنى الدالة اللوغارتمية النيبيرية:

نضع: $h(x) = \ln x$

لدينا:


$$f(x) = \ln\left(x-\frac{1}{2}\right) + 1 + \ln 2$$
$$= h\left(x-\frac{1}{2}\right) + 1 + \ln 2$$
$$= h(x+a) + b$$

ومنه (C_f) هو صورة (C) بإنسحاب شعاعه $\vec{v}(-a;b)$

أي:

$$\vec{v}\left(\frac{1}{2}; 1+\ln 2\right)$$

- رسم (C) و (C_f) :



(II)

❶ حساب $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^{>}} g(x)$:

$$\lim_{x\to\frac{1}{2}^{>}} g(x) = \lim_{x\to\frac{1}{2}^{>}} f(x) - \lim_{x\to\frac{1}{2}^{>}} (x) = -\infty$$

- تبيين أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty} g(x) = \lim_{x\to+\infty} (f(x) - x)$$
$$= \lim_{x\to+\infty} (1 + \ln(2x-1) - x)$$
$$= \lim_{x\to+\infty} \left[\underbrace{(2x-1)}_{+\infty}\left(\underbrace{\frac{1-x}{2x-1}}_{-\frac{1}{2}} + \underbrace{\frac{\ln(2x-1)}{2x-1}}_{0}\right)\right]$$
$$= -\infty$$

❷ دراسة اتجاه تغير الدالة g على I:

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM
الخليل للرياضيات

$$g'(x) = f'(x) - 1$$
$$= \frac{2}{2x-1} - 1$$
$$= \frac{2-2x+1}{2x-1}$$
$$= \frac{-2x+3}{2x-1}$$

لدينا: $(2x-1>0)$ على المجال I

ومنه إشارة $g'(x)$ من إشارة $(-2x+3)$:

$$-2x+3=0 \Rightarrow x=\frac{3}{2}$$

ومنه:

لما $x \in \left]\frac{1}{2};\frac{3}{2}\right[$: $g'(x)>0$

لما $x \in \left]\frac{3}{2};+\infty\right[$: $g'(x)<0$

- جدول تغيرات الدالة g:

x	$\frac{1}{2}$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$g'(x)$	$+$	0		$-$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$g\left(\frac{3}{2}\right)$	↘	$+\infty$

❸

أ/ حساب $g(1)$:

$$g(1) = f(1) - 1 = 1 - 1 = 0$$

- تبيين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل في المجال $\left]\frac{3}{2};+\infty\right[$ حلا وحيدا α:

لدينا: الدالة g مستمرة ومتناقصة تماما على $\left]\frac{3}{2};+\infty\right[$

ولدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) \times g\left(\frac{3}{2}\right) < 0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ تقبل في المجال $\left]\frac{3}{2};+\infty\right[$ حلا وحيدا α


- التحقق أنّ $2<\alpha<3$:

لدينا: $g(2) \times g(3) < 0$

لأن $g(2) \approx 0.1$ و $g(3) \approx -0.39$

ومنه $2<\alpha<3$ محققة

ب/ رسم (C_g) :



❹ استنتاج إشارة $g(x)$ على المجال I :

لدينا: $\begin{cases} g(1)=0 \\ g(\alpha)=0 \end{cases}$ ومنه:

x	$\frac{1}{2}$		α		1		$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$		

- تحديد وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (d):

$$f(x) - y_{(\Delta)} = f(x) - x = g(x)$$

إذن:

- (C_f) تحت (Δ) لما $x \in \left]\frac{1}{2};\alpha\right[\cup \,]1;+\infty[$
- (C_f) يقطع (Δ) لما $x = \{\alpha;1\}$
- (C_f) فوق (Δ) لما $x \in \,]\alpha;1[$

❺ برهان أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;\alpha[$ فإنّ: $f(x)$ ينتمي إلى المجال $]1;\alpha[$:

لدينا الدالة f متزايدة على $]1;\alpha[$

ولدينا: $g(\alpha) = f(\alpha) - \alpha$

وبما أن: $g(\alpha)=0$

فإنّ $0 = f(\alpha) - \alpha$

أي: $f(\alpha) = \alpha$

ولدينا: $f(1)=1$

ومنه:

لما: $x \in \,]1;\alpha[$ يكون: $f(x) \in \,]1;\alpha[$

III)

❶ تعيين قيمة العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون:

$u_n = 1 + 2\ln 3 - 3\ln 2$:

$$u_n = 1 + 2\ln 3 - 3\ln 2 \Rightarrow f\left(1+\frac{1}{2n}\right)$$
$$= 1 + 2\ln 3 - 3\ln 2$$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

$$\Rightarrow \ln\left(2\left(1+\frac{1}{2n}\right)-1\right)$$
$$= \ln 3^2 - \ln 2^3$$
$$\Rightarrow \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \ln\left(\frac{9}{8}\right)$$
$$\Rightarrow \frac{n+1}{n} = \frac{9}{8}$$
$$\Rightarrow 8n + 8 - 9n = 0$$
$$\Rightarrow -n = -8$$
$$\Rightarrow n = 8$$

❷ تعيين S_n :

لدينا:

$$u_n = f\left(1+\frac{1}{2n}\right)$$
$$= 1 + \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$$

ومنه:

$$S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$
$$= 1 + \ln\left(\frac{1+1}{1}\right) + 1 + \ln\left(\frac{2+1}{2}\right) + \cdots + 1 + \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$$
$$= 1(n - 1 + 1) + \ln\left(\frac{2}{1}\right) + \ln\left(\frac{3}{2}\right) + \cdots + \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$$
$$= n + \ln\left(\frac{2}{1} \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \ldots \times \frac{(n+1)}{n}\right)$$
$$= n + \ln\left(\frac{2 \times 3 \times 4 \times \ldots \times n \times (n+1)}{2 \times 3 \times 4 \times \ldots \times n}\right)$$
$$= n + \ln(n+1)$$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

16 حل المسـألة رقم:

مشاهـــدة المسألة

I)

❶

أ/ حساب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}}[f(x)]$:

- $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}}[f(x)]=+\infty$

- تبيين أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]=0$:

- $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{(lnx)^2}{x}\right]$

نضع $t=\ln x$ نجد:

$$\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{(lnx)^2}{x}\right]=\lim_{t\to+\infty}\left[\frac{t^2}{e^t}\right]=0$$

لأن: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\frac{t^n}{e^t}\right]=0$

- التفسير الهندسي:

- (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي بجوار $+\infty$ معادلته:

$$x=0$$

- (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي بجوار $+\infty$ معادلته:

$$y=0$$

ب/ دراسة اتجاه تغير الدالة f :

- دراسة $f'(x)$:

$$f'(x)=\frac{\left(2\frac{1}{x}\ln x\right)(x)-(\ln x)^2}{x^2}$$
$$=\frac{2\ln x-(\ln x)^2}{x^2}$$
$$=\frac{(2-\ln x)\ln x}{x^2}$$

لدينا: $x^2>0$ ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط:

لدينا: $\ln x=0\Rightarrow x=1$

ولدينا: $2-\ln x=0\Rightarrow \ln x=2\Rightarrow x=e^2$

ومنه:

- جدول تغيرات الدالة f :

x	0		1		e^2		$+\infty$
$\ln x$	$\|$	$-$	0	$+$	$\|$	$+$	
$2-\ln x$	$\|$	$+$	$\|$	$+$	0	$-$	
$f'(x)$	$\|$	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$\|$	$+\infty$ ↘	0	↗	$4e^{-2}$	↘	0

❷

أ/ كتابة معادلة المماس (T_m) :

$$y_{(T_m)}=f'(m)(x-m)+f(m)$$
$$=\left(\frac{(2-\ln m)\ln m}{m^2}\right)(x-m)+\frac{(\ln m)^2}{m}$$
$$=\left(\frac{(2-\ln m)\ln m}{m^2}\right)x-\frac{(2-\ln m)\ln m}{m}+\frac{(\ln m)^2}{m}$$
$$=\left(\frac{(2-\ln m)\ln m}{m^2}\right)x+\frac{2(\ln m)^2-2\ln m}{m}$$
$$=\left(\frac{(2-\ln m)\ln m}{m^2}\right)x+\frac{2\ln m\,(\ln m-1)}{m}$$

ب/ تعيين قيم m التي من أجلها (T_m) يشمل المبدأ:

(T_m) يشمل المبدأ معناه:


$$0=\left(\frac{(2-\ln m)\ln m}{m^2}\right)(0)+\frac{2\ln m\,(\ln m-1)}{m}$$
$$\Rightarrow\frac{2\ln m\,(\ln m-1)}{m}=0$$
$$\Rightarrow 2\ln m\,(\ln m-1)=0$$
$$\Rightarrow\begin{cases}2\ln m=0\\ \ln m-1=0\end{cases}$$
$$\Rightarrow\begin{cases}\ln m=0\\ \ln m=1\end{cases}$$
$$\Rightarrow\begin{cases}m=1\\ m=e\end{cases}$$

ج/ كتابة معادلة كل مماس من أجل قيم m المحصل عليها:

$$(T_1):y=0x+0$$
$$=0$$
$$(T_e):y=\left(\frac{(2-1)\times 1}{e^2}\right)x+\frac{2(1-1)}{e}$$
$$=\frac{1}{e^2}x$$
$$=e^{-2}x$$

❸ التمثيل البياني:

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM



II)

❶ تبيين أن الدالة g فردية:

لدينا $(-x) \in \mathbb{R}^*$

ولدينا:

$$\begin{aligned} g(-x) &= \frac{(ln|-x|)^2}{-x} \\ &= -\frac{(ln|x|)^2}{x} \\ &= -g(x) \end{aligned}$$

ومنه الدالة g فردية.

❷ تبيين أنه يمكن رسم (C_g) انطلاقا من (C_f) :

لدينا:

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{(\ln x)^2}{x}, & x > 0 \\ \dfrac{(\ln(-x))^2}{x}, & x < 0 \end{cases}$$


$$= \begin{cases} \dfrac{(\ln x)^2}{x}, & x > 0 \\ -\dfrac{(\ln(-x))^2}{-x}, & x < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} f(x), & x > 0 \\ -f(-x), & x < 0 \end{cases}$$

لما $x > 0$: (C_g) ينطبق على (C_f)

ولما $x < 0$: (C_g) يناظر (C_g) بالنسبة للمبدأ

- تمثيل (C_g)



قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

I)

❶ دراسة اتجاه تغير الدالة g:

$$g'(x)=1+2\frac{1}{x}=\frac{1+2x}{x}$$

لدينا: $g'(x)>0$ لما $x\in\mathbb{R}_+^*$

ومنه الدالة g متزايدة تماما على $\mathbb{R}_+^*$

❷ حساب $g(1)$:

$$g(1)=-1+1+2\ln 1=0$$

- استنتاج إشارة $g(x)$ حسب قيم x من المجال $]0;+\infty[$:

بما أن الدالة g مستمرة ورتيبة على المجال $]0;+\infty[$

و $g(1)=0$ فإنّ:

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$	$-$	$\|$	0	$+$	

II)

❶

أ/ حساب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$:

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)=\lim_{\substack{x\to 0\\ >}}\left(\frac{-1+\overbrace{x\ln x}^{0}-2\ln x}{x}\right)=+\infty$$

ومنه (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي بجوار $+\infty$

معادلته $x=0$

ب/ حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(-\frac{1}{x}+\ln x-2\frac{\ln x}{x}\right)=+\infty$$

❷

أ/ تبيين أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=:\frac{g(x)}{x^2}$

$$f'(x)=\frac{\left(\ln x+\frac{x-2}{x}\right)x-(-1+(x-2)\ln x)}{x^2}$$
$$=\frac{x\ln x+x-2+1-x\ln x+2\ln x}{x^2}$$
$$=\frac{x-1+2\ln x}{x^2}$$
$$=\frac{g(x)}{x^2}$$

ب/ تعيين اتجاه تغير الدالة f :

لدينا: $x^2>0$ لما $x\in\mathbb{R}_+^*$ ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$

- جدول تغيرات الدالة f:

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$\|\|$	$+\infty$ ↘	-1	↗ $+\infty$	

❸

أ/ حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-\ln x)$:

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x)-\ln x)=$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{-1+(x-2)\ln x}{x}-\ln x\right)$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\left(-\frac{1}{x}+\ln x-2\frac{\ln x}{x}-\ln x\right)$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\left(-\frac{1}{x}-\frac{2\ln x}{x}\right)$$
$$=0$$

- التفسير الهندسي:

(C_f) و (Γ) متقاربان بجوار $+\infty$

ب/ دراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Γ):

$$f(x)-\ln x=0\Rightarrow-\frac{1}{x}-\frac{2\ln x}{x}=0$$
$$\Rightarrow-1-2\ln x=0$$
$$\Rightarrow\ln x=-\frac{1}{2}$$
$$\Rightarrow x=e^{-\frac{1}{2}}$$

x	0		$e^{-\frac{1}{2}}$		$+\infty$
$f(x)-\ln x$	$\|\|$	$+$	0	$-$	

- (C_f) فوق (Γ) لما $x\in\left]0;e^{-\frac{1}{2}}\right[$
- (C_f) يقطع (Γ) لما $x=e^{-\frac{1}{2}}$
- (C_f) تحت (Γ) لما $x\in\left]e^{-\frac{1}{2}};+\infty\right[$

❹ تبيين أن (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطتين:

لدينا الدالة f مستمرة ومتناقصة تماما على $]0;1[$

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

ومستمرة ومتزايدة على $]-1;+\infty[$

وتقبل قيمة حدية دنيا سالبة هي -1

و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)=+\infty$

إذن: (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطتين

- التحقق أنّ: $0.5<\alpha<0.6$ و $2.9<\beta<3$:

• لدينا: $f(0.6)\times f(0.5)<0$

لأن: $f(0.6)\approx -0.47$ و $f(0.5)\approx 0.08$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x)=0$

تقبل حلا وحيدا α في المجال $]0.5;0.6[$


• ولدينا: $f(2.9)\times f(3)<0$

لأن: $f(3)\approx 0.03$ و $f(2.9)\approx -0.01$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x)=0$

تقبل حلا وحيدا β في المجال $]2.9;3[$

❺ رسم (Γ) و (C_f) :



قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

❶

أ/ حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)]$:

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)]=\ln\left(\frac{1}{2}\right)=-\ln 2$$

التفسير الهندسي: (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي بجوار $-\infty$ معادلته: $y=-\ln 2$

ب/ تبيين أنّ: $f(x)=x+\ln 2+\ln\left(\frac{1+\frac{1}{2}e^{-2x}}{1+2e^{-x}}\right)$:

$$f(x)=\ln\left(\frac{2e^{2x}+1}{e^x+2}\right)$$

$$=\ln\left(\frac{2e^{2x}\left(1+\frac{1}{2e^{2x}}\right)}{e^x\left(1+\frac{2}{e^x}\right)}\right)$$

$$=\ln\left(\frac{2e^{2x}}{e^x}\right)+\ln\left(\frac{1+\frac{1}{2e^{2x}}}{1+\frac{2}{e^x}}\right)$$

$$=\ln(2e^x)+\ln\left(\frac{1+\frac{1}{2}e^{-2x}}{1+2e^{-x}}\right)$$

$$=\ln 2+x+\ln\left(\frac{1+\frac{1}{2}e^{-2x}}{1+2e^{-x}}\right)$$

ج/ استنتاج $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]$:

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[\ln 2+\underbrace{x}_{+\infty}+\underbrace{\ln\left(\frac{1+\frac{1}{2}e^{-2x}}{1+2e^{-x}}\right)}_{0}\right]=+\infty$$

❷ دراسة اتجاه تغير الدالة f وتشكيل جدول تغيراتها:

- دراسة $f'(x)$:

$$f'(x)=\frac{\left(\frac{4e^{2x}(e^x+2)-e^x(2e^{2x}+1)}{(e^x+2)^2}\right)}{\left(\frac{2e^{2x}+1}{e^x+2}\right)}$$

$$=\frac{4e^{2x}(e^x+2)-e^x(2e^{2x}+1)}{(e^x+2)(2e^{2x}+1)}$$

$$=\frac{4e^{3x}+8e^{2x}-2e^{3x}-e^x}{(e^x+2)(2e^{2x}+1)}$$

$$=\frac{e^x(2e^{2x}+8e^x-1)}{(e^x+2)(2e^{2x}+1)}$$

لدينا:

$$\begin{cases}e^x>0\\(e^x+2)(2e^{2x}+1)>0\end{cases}$$

ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة $(2e^{2x}+8e^x-1)$:

$$2e^{2x}+8e^x-1=0$$

نضع $e^x=t$ أي $x=\ln t$

فنجد:

$$2t^2+8t-1=0$$

لدينا:

$$\Delta=64-4(2)(-1)=72=\left(6\sqrt{2}\right)^2$$

لدينا: $\Delta>0$ ومنه:

$$\begin{cases}t_1=\frac{-8+6\sqrt{2}}{4}=-2+\frac{3}{2}\sqrt{2}\\t_2=\frac{-8+6\sqrt{2}}{4}=-2-\frac{3}{2}\sqrt{2}\end{cases}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}x_1=\ln t_1=\ln\left(-2+\frac{3}{2}\sqrt{2}\right)\\x_2=\ln t_2\ (\text{مرفوض})\end{cases}$$

- جدول التغيرات:

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\ln 2$ ↘	y_0	↗ $+\infty$

حيث:

$$x_0=\ln\left(-2+\frac{3}{2}\sqrt{2}\right)\ ;\ y_0=f\left(\ln\left(-2+\frac{3}{2}\sqrt{2}\right)\right)$$

❸

أ/ تبيين أن (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (D):

لدينا:

$$f(x)=x+\ln 2+\ln\left(\frac{1+\frac{1}{2}e^{-2x}}{1+2e^{-x}}\right)$$

$$=y+\varphi(x)$$

حيث:

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

$$\begin{cases} \varphi(x) = \ln\left(\dfrac{1+\frac{1}{2}e^{-2x}}{1+2e^{-x}}\right) \\ y = x + \ln 2 \end{cases}$$

ولدينا:

$$\lim_{x\to+\infty}[\varphi(x)] = 0$$

ومنه المستقيم ذو المعادلة $y = x + \ln 2$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

ب/ دراسة الوضع النسبي بين (D) و (C_f) :

- ندرس إشارة الفرق $f(x) - y$:

$$f(x) - y = 0 \Rightarrow \ln\left(\frac{1+\frac{1}{2}e^{-2x}}{1+2e^{-x}}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1+\frac{1}{2}e^{-2x}}{1+2e^{-x}} = 1$$
$$\Rightarrow 1+\frac{1}{2}e^{-2x} = 1+2e^{-x}$$
$$\Rightarrow \frac{1}{2}e^{-2x} - 2e^{-x} = 0$$
$$\Rightarrow e^{-x}\left(\frac{1}{2}e^{-x} - 2\right) = 0$$
$$\Rightarrow \frac{1}{2}e^{-x} - 2 = 0$$
$$\Rightarrow e^{-x} = 4$$
$$\Rightarrow -x = \ln 4$$
$$\Rightarrow x = -\ln 4$$

لدينا:

$$x > -\ln 4$$
$$\Rightarrow -x < \ln 4$$
$$\Rightarrow e^{-x} < 4$$
$$\Rightarrow \frac{1}{2}e^{-x} < 2$$
$$\Rightarrow \frac{1}{2}e^{-x} - 2 < 0$$
$$\Rightarrow e^{-x}\left(\frac{1}{2}e^{-x} - 2\right) < 0$$
$$\Rightarrow \frac{1}{2}e^{-2x} - 2e^{-x} < 0$$
$$\Rightarrow \frac{1}{2}e^{-x} + 1 < 2e^{-x} + 1$$

لدينا: $2e^{-x}+1>0$ إذن يمكن القسمة عليه

$$\Rightarrow \frac{\frac{1}{2}e^{-x}+1}{2e^{-x}+1} < 1$$
$$\Rightarrow \ln\left(\frac{\frac{1}{2}e^{-x}+1}{2e^{-x}+1}\right) < 0$$

ومنه لما $f(x) - y < 0 : x > -\ln 4$

بنفس الطريقة نجد: لما $f(x) - y > 0 : x < -\ln 4$

ومنه:

x	$-\infty$	$-\ln 4$	$+\infty$
$f(x)-y$	$+$	0	$-$

- (C_f) فوق (D) لما $x \in]-\infty; -\ln 4[$.
- (C_f) يقطع (D) في النقطة ذات الاحداثيات: $(-\ln 4\,;-\ln 2)$
- (C_f) تحت (D) لما $x \in]-\ln 4\,;+\infty[$.

❹ تبيين أن نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين للمنحنى (C_f) تنتمي إليه - أي إلى (C_f) -

نحدد أولا نقطة تقاطع المستقيم المقارب المائل (D) ذو المعادلة $y = x + \ln 2$ مع المستقيم المقارب الأفقي ذو المعادلة $y = -\ln 2$.

لدينا:

$$\begin{cases} y = x + \ln 2 \\ y = -\ln 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2\ln 2 = -\ln 4 \\ y = -\ln 2 \end{cases}$$

ومنه نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين هي

$\omega(-\ln 4\,;-\ln 2)$

ولدينا:: $f(-\ln 4) = -\ln 2$


ومنه: $\omega \in (C_f)$

❺ كتابة معادلة للمماس (T) عند المبدأ:

$$(T): y = f'(0)(x-0) + f(0) = x$$

ومنه المستقيم ذو المعادلة $y = x$ مماس لـ (C_f) عند المبدأ.

❻ التمثيل البياني:



① المناقشة البيانية:

لدينا:

$$x - \ln\left(\frac{2e^{2x}+1}{me^{x}+2m}\right) = 0$$
$$\Rightarrow x = \ln\left(\frac{1}{m}\,\frac{2e^{2x}+1}{e^{x}+2}\right)$$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM
الخليل للرياضيات

$$\Rightarrow x = \ln\left(\frac{1}{m}\right) + \ln\left(\frac{2e^{2x}+1}{e^x+2}\right)$$
$$\Rightarrow x = -\ln m + f(x)$$
$$\Rightarrow f(x) = x + \ln m$$

اذن حلول المعادلة (E) هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيمات ذات المعادلة: $y_m = x + \ln m$

وهي:

- لما $\ln m < 0$ أي $m < 1$ المعادلة لا تقبل حلول
- لما $\ln m = 0$ أي لما $m = 1$ للمعادلة حل مضاعف
- لما $0 < \ln m < \ln 2$ أي لما $1 < m < 2$ للمعادلة حلان
- لما $\ln m = \ln 2$ أي لما $m = 2$ للمعادلة حل مضاعف

لما $\ln m > \ln 2$ أي لما $m > 2$ للمعادلة حل وحيد

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

I)

- حساب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} g(x)$:

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ >}} g(x) = e$$

لأن: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} (x\ln x) = 0$

- استنتاج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$:

لدينا الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;+\infty[$

و $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} g(x) = e > 0$

إذن الدالة g موجبة تماما على $]0;+\infty[$

II)

1

أ/ حساب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$:

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x) = -\infty$$

- تبيين أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}\left(\ln(x+1) + \frac{e^{\overbrace{\frac{\ln x}{x}}^{0}}}{1+\underbrace{\frac{1}{x}}_{0}}\right) = +\infty$$

ب/ تبيين أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x(x+1)^2}$:

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} + \frac{\frac{e}{x}(x+1) - e\ln x}{(x+1)^2}$$
$$= \frac{x+1+\frac{e}{x}(x+1) - \frac{e(x\ln x)}{x}}{(x+1)^2}$$
$$= \frac{\frac{x(x+1)}{x} + \frac{e}{x}(x+1) - \frac{e(x\ln x)}{x}}{(x+1)^2}$$
$$= \frac{x(x+1)+e(x+1)-e(x\ln x)}{x(x+1)^2}$$
$$= \frac{(x+1)(x+e)-e(x\ln x)}{x(x+1)^2}$$
$$= \frac{g(x)}{x(x+1)^2}$$

ج/ استنتاج اتجاه تغير الدالة f:

لدينا: $x(x+1)^2 > 0$ لما $x \in]0;+\infty[$

إذن إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$

2 كتابة معادلة (T)

$$y_{(T)} = f'(1)(x-1)+f(1)$$
$$= \frac{1+e}{2}(x-1)+\ln 2$$
$$= \frac{1+e}{2}x - \frac{1+e-2\ln 2}{2}$$

3

أ/ تبيين أنّ (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة :

لدينا الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على $\mathbb{R}_+^*$ وغيرت من إشارتها

إذن حتما تقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة

ب/ التحقق أنّ $0.7 < \alpha < 0.8$:

لدينا: $f(0.8)\times f(0.7) < 0$

لأنّ: $f(0.8) \approx 0.25$ و $f(0.7) \approx -0.04$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x)=0$

تقبل حلا وحيدا α في المجال $]0;+\infty[$

4

أ/ حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-\ln(x+1)]$:

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-\ln(x+1)] = \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{e\ln x}{x+1}\right]$$
$$= \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{e\frac{\ln x}{x}}{1+\frac{1}{x}}\right]$$
$$= 0$$

- التفسير الهندسي:

(C_f) و (Γ) متقاربان بجوار $+\infty$

ب/ دراسة الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (Γ):

$$f(x)-\ln(x+1) = 0 \Rightarrow \frac{e\ln x}{x+1} = 0$$
$$\Rightarrow e\ln x = 0$$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM


$\Longrightarrow \ln x = 0$

$\Longrightarrow x = 1$

x	0	1	$+\infty$
$f(x) - \ln x$	$-$	0	$+$

- (C_f) فوق (Γ) لما $x \in]0;1[$
- (C_f) يقطع (Γ) لما $x = 1$
- (C_f) تحت (Γ) لما $x \in]1;+\infty[$

ج/ رسم المماس (T) و (Γ) ثم (C_f) :



❺ تعيين قيم m بحيث تقبل المعادلة $f(x) = \frac{1+e}{2}x - m$ حلين متمايزين:

حلول المعادلة $f(x) = \frac{1+e}{2}x - m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيمات ذات المعادلة $y = \frac{1+e}{2}x - m$ ، ومنه:

لما: $-m < -\frac{1+e-2\ln 2}{2}$

أي لما: $m > \frac{1+e-2\ln 2}{2}$

المعادلة تقبل حلين متمازين

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

20 حل المسـألة رقم:

مشاهـــدة المسألة

(I)

❶ دراسة تغيرات الدالة g :

- النهايات:
  - $\lim\limits_{x\to+\infty}[g(x)]=+\infty$
  - $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}}[g(x)]=-\infty$
- دراسة $g'(x)$:

لدينا: الدالة g معرفة وقابلة للاشتقاق على مجال تعريفها ومنه:

$$g'(x)=2x+\frac{1}{x}=\frac{2x^2+1}{x}$$

لدينا $x>0$ و $2x^2+1>0$ ومنه:

- جدول تغيرات الدالة g :

x	0	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	
$g(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$

❷

أ/ تبيين ان المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α :

لدينا الدالة g مستمرة ومتزايدة على المجال $]0;+\infty[$

ولدينا: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}}[g(x)]\times\lim\limits_{x\to+\infty}[g(x)]<0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ تقبلا حلا وحيدا α في المجال $]0;+\infty[$

ب/ التحقق من أن $1.31<\alpha<1.32$:

لدينا: $g(1.31)=-0.13$ و $g(1.32)=0.02$

ولدينا: $g(1.31)\times g(1.32)<0$ ، اذن $1.31<\alpha<1.32$

❸ استنتاج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$:

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

(II)

❶ حساب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها:

- $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}}[f(x)]=+\infty$
- $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]=+\infty$

❷ تبيين أن إشارة $f'(x)$ من نفس إشارة $g(x)$:

$$\begin{aligned}f'(x)&=2x+2\left(-\frac{1}{x}\right)(2-\ln x)\\&=2x-\frac{2(2-\ln x)}{x}\\&=\frac{2(x^2-2+\ln x)}{x}\\&=\frac{2}{x}g(x)\end{aligned}$$

لدينا $\frac{2}{x}>0$ ومنه إشارة $f'(x)$ من نفس إشارة $g(x)$.

❸ تشكيل جدول تغيرات الدالة f :

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	$f(\alpha)$	↗ $+\infty$

❹ تبيين أن: $f(\alpha)=\alpha^2(1+\alpha^2)$:

لدينا:

$$\begin{aligned}g(\alpha)=0&\Rightarrow\alpha^2-2+\ln\alpha=0\\&\Rightarrow\ln\alpha=2-\alpha^2\end{aligned}$$

ولدينا:

$$\begin{aligned}f(\alpha)&=\alpha^2+(2-\ln\alpha)^2\\&=\alpha^2+(2-2-\alpha^2)^2\\&=\alpha^2+\alpha^4\\&=\alpha^2(1+\alpha^2)\end{aligned}$$

❺ استنتاج إشارة $f(x)$ على المجال: $]0;+\infty[$:

لدينا $f(\alpha)>0$ ومنه نجد:

x	0	$+\infty$
$f(x)$	$+$	

(III)

❶ تبيين أن المسافة AM تُعطى بـ $AM=\sqrt{f(x)}$:

لدينا M نقطة من (C_h) فاصلتها x_m أي تكتب على الشكل: $M(x;h(x))$ أي: $M(x;\ln x)$ ومنه المسافة AM تُعطى بـ:

$$\begin{aligned}AM&=\sqrt{(x-0)^2+(\ln x-2)^2}\\&=\sqrt{x^2+\big(-(2-\ln x)\big)^2}\\&=\sqrt{x^2+(2-\ln x)^2}\\&=\sqrt{f(x)}\end{aligned}$$

❷

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

أ/ برهان أن للدالتين f و k نفس اتجاه التغير:

نلاحظ أن:

$$k(x) = (u \circ f)(x)$$

حيث:

$$u(x) = \sqrt{x}$$

لدينا الدالة u متزايدة تماما على المجال $]0; +\infty[$

والدالة f موجبة تماما على $]0; +\infty[$

اذن $(u \circ f)(x)$ متزايدة تماما على المجال $]0; +\infty[$

ومنه للدالتين f و k نفس اتجاه التغير على المجال $]0; +\infty[$

ب/ برهان أن المسافة AM أصغرية في نقطة B من (C_h)

بما أن للدالتين f و k نفس اتجاه التغير في المجال $]0; +\infty[$

فإن الدالة k تبلغ قيمة حدية صغرى هي $x = \alpha$

ومنه المسافة أصغرية لما $x = \alpha$

إذن:

$$B(\alpha; \ln \alpha) \Leftrightarrow B(\alpha; 2 - \alpha^2)$$

ج/ برهان أن: $AB = \alpha\sqrt{1 + \alpha^2}$:

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(\alpha - 0)^2 + (2 - \alpha^2 - 2)^2} \\ &= \sqrt{\alpha^2 + \alpha^4} \\ &= \sqrt{\alpha^2(1 + \alpha^2)} \\ &= |\alpha|\sqrt{1 + \alpha^2} \\ &= \alpha\sqrt{1 + \alpha^2} \end{aligned}$$

❸ تبرير أن (AB) عمودي على المستقيم المماس لـ (C_h) في النقطة B :

لدينا:

ميل المستقيم المماس لـ (C_h) في النقطة B هو:

$$h'(\alpha) = \frac{1}{\alpha}$$

ولدينا ميل المستقيم (AB) هو :

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{2 - \alpha^2 - 2}{\alpha - 0} \\ &= -\frac{\alpha^2}{\alpha} \\ &= -\alpha \end{aligned}$$

تذكر أنه:

◄ يتعامد مستقيمان إذا كان جداء ميليهما يساوي -1 ►

لدينا:

$$-\alpha \times \frac{1}{\alpha} = -1$$

ومنه المستقيم (AB) عمودي على مماس المنحنى (C_h) في النقطة B.

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

(I

❶

أ/ دراسة اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0;1[$:

$$g'(x)=-1+\frac{1}{x}=\frac{-x+1}{x}$$

لدينا: $g'(x)>0$ لما $x\in]0;1[$

إذن الدالة g متزايدة تماما على $]0;1[$

ب/ تبيين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α :

لدينا الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;1[$

ولدينا: $g(0.15)\times g(0.16)<0$

لأنّ $g(0.15)\approx -0.05$ و $g(0.16)\approx 0.01$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة، المعادلة $g(x)=0$

تقبل حلا وحيدا α في المجال $]0;1[$

❷ استنتاج حسب قيم x إشارة $g(x)$ على $]0;1[$:

x	0	α	1
$g(x)$	$-$	0	$+$

(II

❶ حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ >}} f(x)$:

- $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ >}} f(x)=\frac{-1}{0^+}=-\infty$

(C_f) يقبل مقارب عمودي بجوار $-\infty$ معادلته: $x=1$

- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{\frac{1}{x}-2+\frac{\ln x}{x}}{1-\frac{1}{x}}\right)$

$$=-\frac{2}{1}=-2$$

لأنّ $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$

(C_f) يقبل مقارب أفقي بجوار $+\infty$ معادلته: $y=-2$

❷

أ/ تبيين أنه $f'(x)=\frac{g\left(\frac{1}{x}\right)}{(x-1)^2}$:

$$f'(x)=\frac{\left(-2+\frac{1}{x}\right)(x-1)-(1-2x+ln\,x)}{(x-1)^2}$$

$$=\frac{-2x+2+1-\frac{1}{x}-1+2x-ln\,x}{(x-1)^2}$$

$$=\frac{2-\frac{1}{x}+ln\left(\frac{1}{x}\right)}{(x-1)^2}$$

$$=\frac{g\left(\frac{1}{x}\right)}{(x-1)^2}$$

ب/ تبيين أنّ الدالة f متزايدة تماما على $\left]1;\frac{1}{\alpha}\right]$

ومتناقصة تماما على $\left[\frac{1}{\alpha};+\infty\right[$:

لدينا: $(x-1)^2>0$ لما $x\in]1;+\infty[$

ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة $g\left(\frac{1}{x}\right)$

لدينا:

x	0	α	1
$g(x)$	$-$	0	$+$

لدينا: $g(x)=0$ أي: $x=\alpha$

ومنه:

$g\left(\frac{1}{x}\right)=0$ أي: $\frac{1}{x}=\alpha$ أي: $x=\frac{1}{\alpha}$

$g\left(\frac{1}{x}\right)>0$ أي: $\alpha<\frac{1}{x}<1$ أي: $1<x<\frac{1}{a}$

$g\left(\frac{1}{x}\right)<0$ أي: $0<\frac{1}{x}<a$ أي: $\frac{1}{\alpha}<x$

ومنه:

x	1	$\frac{1}{\alpha}$	$+\infty$
$g\left(\frac{1}{x}\right)$	$+$	0	$-$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$	↘ -2

❸ دراسة الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ) :

$$f(x)-y_{(\Delta)}=0\Longrightarrow\frac{1-2x+\ln x}{x-1}-(-2)=0$$

$$\Longrightarrow\frac{1-2x+\ln x+2(x-1)}{x-1}=0$$

$$\Longrightarrow 1-2x+\ln x+2(x-1)=0$$

$$\Longrightarrow 1-2x+\ln x+2x-2=0$$

$$\Longrightarrow -1+\ln x=0$$

$$\Longrightarrow \ln x=1$$

$$\Longrightarrow x=e$$


x	1	e	$+\infty$
$f(x)-y_{(\Delta)}$	$-$	0	$+$

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

- (C_f) تحت (Δ) لما $x \in]1;e[$
- (C_f) يقطع (Δ) لما $x = e$
- (C_f) فوق (Δ) لما $x \in]e;+\infty[$

❹ رسم المستقيمين المقاربين والمنحنى (C_f) :



❺ تعيين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $|f(x)| = m$ حلين متمايزين:

نضع $h(x) = |f(x)|$

ومنه:

$$|f(x)| = m \Longrightarrow h(x) = m$$

حلول المعادلة هي فوصل نقط تقاطع (C_h) مع المستقيمات ذات المعادلة $y_m = m$

(C_h) متناظر مع (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل

نرسم أولا (C_h) ثم نعين قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $h(x) = m$ حلين متمايزين هي:

$$-f\left(\frac{1}{\alpha}\right) < m < 2$$

أي:

$$m \in \left]2; -f\left(\frac{1}{\alpha}\right)\right[$$

• طريقة أخرى:

لدينا: $|f(x)| = m$ يعني: $f(x) \geq 0$

وهذا يعني $m \geq 0$

ولدينا:

$$|f(x)| = \begin{cases} f(x) \ ; \ x \geq 0 \\ -f(x) \ ; \ x \leq 0 \end{cases}$$

لدينا (C_f) يقع تحت حامل محور الفواصل

إذن: $|f(x)| = -f(x)$

ومنه:

$$|f(x)| = m \Longrightarrow -f(x) = m$$
$$\Longrightarrow f(x) = -m$$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيمات ذات المعادلة $y_m = -m$

إذن: قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $f(x) = -m$ حلين متمايزين هي:

$$-m \in \left]f\left(\frac{1}{\alpha}\right); -2\right[$$

أي:

$$m \in \left]2; -f\left(\frac{1}{\alpha}\right)\right[$$

الخليل للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

❶ تبيين أن الدالة f فردية:

$$f(-x)=\frac{2}{3}(-x)+\ln\left(\frac{-x-1}{-x+1}\right)$$
$$=-\frac{2}{3}x+\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$$
$$=-\frac{2}{3}x-\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$$
$$=-\left(\frac{2}{3}x+\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)\right)$$
$$=-f(x)$$

- التفسير البياني:

(C_f) متناظر بالنسبة للمبدأ

❷ حساب النهايات:

- $\lim\limits_{x\to 1^{>}} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^{>}}\left(\frac{2}{3}+\ln\left(\frac{x-1}{2}\right)\right)=-\infty$
- (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي بجوار $-\infty$ معادلته $x=1$.
- $\lim\limits_{x\to -1^{<}} f(x)=\lim\limits_{x\to -1^{<}}\left(-\frac{2}{3}+\ln\left(\frac{-2}{x+1}\right)\right)$
$=+\infty$

لأنّ: $\lim\limits_{x\to -1^{<}}(x+1)=0^{-}$

- (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي بجوار $+\infty$ معادلته $x=-1$.
- $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)=+\infty$
- $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)=-\infty$

❸

أ/ تبيين أن: $f'(x)=\frac{2}{3}\left(\frac{x^2+2}{x^2-1}\right)$:

$$f'(x)=\frac{2}{3}+\frac{\left(\frac{x+1-x+1}{(x+1)^2}\right)}{\left(\frac{x-1}{x+1}\right)}$$
$$=\frac{2}{3}+\frac{2}{(x+1)(x-1)}$$
$$=\frac{2}{3}+\frac{2}{x^2-1}$$
$$=\frac{2(x^2-1)+6}{3(x^2-1)}$$
$$=\frac{2x^2+4}{3(x^2-1)}$$
$$=\frac{2}{3}\left(\frac{x^2+2}{x^2-1}\right)$$

ب/ استنتاج اتجاه تغير الدالة f وتشكيل جدول تغيراتها:

إشارة $f'(x)$ من إشارة x^2+2 وبما أن $(x^2+2>0)$ فـ $f'(x)>0$

وعليه:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	‖	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗ $+\infty$	‖	$-\infty$ ↗ $+\infty$	

ج/ تبيين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبلا حلا وحيدا α حيث: $1.8<\alpha<1.9$:

لدينا: الدالة f مستمرة ومتزايدة على المجال D

ولدينا: $f(1.8)\times f(1.9)<0$

لأنّ: $f(1.8)\approx -0.05$ وَ $f(1.9)\approx 0.1$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1.8<\alpha<1.9$

❹ تبيين أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=\frac{2}{3}x$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) :

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(f(x)-y_{(\Delta)}\right)=\lim_{x\to\pm\infty}\left(\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)\right)=0$$

ومنه (Δ) مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $\pm\infty$

- دراسة وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ):

$$f(x)-y_{(\Delta)}=\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$$

لدينا:

- لما $x\in\,]1;+\infty[$:

$$\frac{x-1}{x+1}>1\Rightarrow x-1>x+1$$
$$\Rightarrow -2>0$$

وهذا مستحيل، وعليه $\frac{x-1}{x+1}<1$ ومنه $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)<0$ في المجال $]1;+\infty[$

ومنه (C_f) يقع تحت لما $x\in\,]1;+\infty[$.

- لما $x\in\,]-\infty;-1[$:


قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

$$\frac{x-1}{x+1} > 1 \Rightarrow x-1 < x+1$$
$$\Rightarrow -2 < 0$$
وهذا صحيح، وعليه $\frac{x-1}{x+1} > 1$

ومنه $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) > 0$ في المجال $]-\infty;-1[$

ومنه (C_f) فوق تحت لما $x \in]-\infty;-1[$.

❺ انشاء المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) :



❻ المناقشة البيانية:

$$(2-3|m|)x + 3\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = 0$$
$$\Rightarrow 2x - 3|m|x + 3\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$$
$$\Rightarrow 2x + 3\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = 3|m|x$$
$$\Rightarrow 3\left(\frac{2}{3}x + \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)\right) = 3|m|x$$
$$\Rightarrow 3f(x) = 3|m|x$$
$$\Rightarrow f(x) = |m|x$$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيمات ذات المعادلة $y_m = |m|x$:

- لما $|m| < \frac{2}{3}$ أي لما $-\frac{2}{3} < m < \frac{2}{3}$

أي لما $m \in \left]-\frac{2}{3};\frac{2}{3}\right[$

المعادلة تقبل حلين متمايزين

- لما $|m| \geq \frac{2}{3}$ أي لما $m \leq -\frac{2}{3}$ أو $m \geq \frac{2}{3}$

أي لما $m \in \left]-\infty;-\frac{2}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3};+\infty\right[$

المعادلة لا تقبل حلول

بالتوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا

لا تنسونا من صالح دعائكم



زورونا في صفحتنا على فيسبوك:

#الخليل_للرياضيات

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM