

ملخصات الباك
المحور الأول
الدرس الثاني

- شعب علمية
- الدوال العددية
- الاستمرارية ومبرهنة القيم المتوسطة

الاستمرارية

1 استمرارية دالة عند عدد حقيقي:

f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$ وبشمل a.

f ذات شكل واحد

f مستمرة عند a معناه $\lim\limits_{x\to a} f(x)=f(a)$

التفسير البياني

في جوار العدد a ، يمكن رسم (C_f) دون رفع القلم (البد)

f تغير شكلها عند a

- f مستمرة عند a من اليسار معناه $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x<a}} f(x)=f(a)$
- f مستمرة عند a من اليمين معناه $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x>a}} f(x)=f(a)$
- f مستمرة عند a إذا وفقط إذا كانت مستمرة عنده من اليمين ومن اليسار ، معناه

$$\lim_{\substack{x\to a\\ x<a}} f(x)=\lim_{\substack{x\to a\\ x>a}} f(x)=f(a)$$

2 استمرارية دالة على مجال

- f مستمرة على المجال المفتوح $]a;b[$ إذا كانت مستمرة عند كل عدد حقيقي منه.
- f مستمرة على المجال المغلق $[a;b]$ إذا كانت مستمرة على المجال $]a;b[$ ومستمرة عند a من اليمين وعند b من اليسار.


التفسير البياني


f مستمرة على مجال I من $\mathbb{R}$ معناه يمكن رسم (C_f) دون رفع القلم (البد) على هذا المجال



مثال

1. f مستمرة على المجال $[-2;6[$.
2. g ليست مستمرة على المجال $[-2;6[$ لأنها غير مستمرة عند 3 .





الاستمرار في المحاولة هو الطريق الحتمي للنجاح



3 خواص الدوال المستمرة

- الدوال كثيرات الحدود ، cos و sin مستمرة على $\mathbb{R}$.
- الدوال الناطقة ، الصماء، الأسيّة و اللوغاريتمية مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفها.
- الدوال الناتجة عن مجموع، جداء، حاصل قسمة، مركب دوال مستمرة هي دوال مستمرة.

مبرهنة القيم المتوسطة

مبرهنة القيم المتوسطة لا تهتم بتعيين قيم الحلول للمعادلة $f(x)=k$ على مجال $[a;b]$ حيث f دالة معطاة و k عدد حقيقي بل بإثبات وجود أو وحدانية هذه الحلول.



الحالة العامة: المعادلة $f(x)=k$

المطلوب	وجود الحلول	وحدانية الحل
الشروط	1) f معرفة ومستمرة على $[a;b]$ 2) k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$	1) f معرفة ومستمرة على $[a;b]$ 2) f رتيبة تماما على $[a;b]$ 3) k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$
النتيجة	المعادلة $f(x)=k$ تقبل على الأقل حلا $\alpha\in\ ]a;b[$	المعادلة $f(x)=k$ تقبل حلا وحيدا $\alpha\in\ ]a;b[$
التفسير البياني	(C_f) يقطع المستقيم ذا المعادلة $y=k$ على الأقل في نقطة فاصلتها $\alpha\in\ ]a;b[$ 	(C_f) يقطع المستقيم ذا المعادلة $y=k$ في نقطة وحيدة فاصلتها $\alpha\in\ ]a;b[$ 



لما يكون أحد أطراف المجال $[a;b]$ هو $\pm\infty$ ولا في زوج $\pm\infty$ باااااالاك تكتب(ي) $f(\pm\infty)$!!!
رح تغضب عليك الـ MATH إلى ∞ !!!
هنا كي الشاطر(ة) تعوض(ي) الصور بحساب النهايات $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)$

حالة خاصة: المعادلة $f(x)=0$

المطلوب	وجود الحلول	وحدانية الحل
الشروط	1) f معرفة ومستمرة على $[a;b]$ 2) $f(a)\times f(b)<0$	1) f معرفة ومستمرة على $[a;b]$ 2) f رتيبة تماما على $[a;b]$ 3) $f(a)\times f(b)<0$
النتيجة	المعادلة $f(x)=0$ تقبل على الأقل حلا $\alpha\in\ ]a;b[$	المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha\in\ ]a;b[$
التفسير البياني	(C_f) يقطع حامل محور الفواصل على الأقل في نقطة فاصلتها $\alpha\in\ ]a;b[$ 	(C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $\alpha\in\ ]a;b[$ 

إيجاد حصر لحل معادلة باستعمال خوارزمية التنصيف

مبدأ التنصيف

إذا كانت f دالة مستمرة و رتيبة تماما على مجال $[a;b]$ بحيث $f(a)\times f(b)<0$ فإنه، حسب مبرهنة القيم المتوسطة، المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $a<\alpha<b$.

لإيجاد حصر للعدد α يمكن اتباع خوارزمية التنصيف (Dichotomie) كما يلي:

1) نحسب $m=\frac{a+b}{2}$ مركز المجال $[a;b]$.

↳ إذا كان $f(a)\times f(m)<0$ فإنّ $a<\alpha<m$.

↳ إذا كان $f(m)\times f(b)<0$ فإنّ $m<\alpha<b$.

2) نواصل بنفس الطريقة من خلال تعويض a أو b بـ m إلى غاية الحصول على الحصر المرغوب فيه. (سعة الحصر غالبا نحدّد في السؤال)

الإيمان مع الأمل والأمل مع العمل ... فقط حاول وستجح بلا جدال