الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية السيلة — ثانوية الشهيد حميدي عيسى

المستوى: ثانية ثانوي — الشعبة: تقني رياضي

الخميس 17 مارس 2022 — المدة: ساعتان

اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

⚠ تجنب الشطب واستعمال المصحح.

☆ التمرين الأول: (06 نقاط)

I) يحتوي كيس على 7 كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس، منها ثلاث كريات بيضاء B_1 ، B_2 و B_3 وأربع كريات خضراء V_1 ، V_2 ، V_3 و V_4.

نسحب كريتين من الكيس على التوالي بحيث نعيد الكرية الأولى قبل السحب الثاني.

① مثل النتائج بمخطط (أو شجرة)، ثم عين مجموعة الإمكانيات Ω.

② احسب إحتمال الأحداث التالية: الحدث A "سحب كريتين مختلفتين في اللون".

الحدث B "سحب كريتين من نفس اللون".

الحدث C "سحب كرية بيضاء على الأكثر".

II) نقترح اللعبة التالية: للمشاركة يدفع اللاعب αDA (α عدد طبيعي) ، فإذا سحب كريتين بيضاوين يتحصل على $100DA$ وإذا سحب كريتين مختلفتين في اللون يتحصل على $50DA$ وإذا سحب كريتين خضراوين يخسر ما دفعه.

وليكن X المتغير العشوائي الذي يمثل ربح أو خسارة اللاعب بدلالة العدد الطبيعي α.

① عين القيم المتغير العشوائي X، ثم عرف قانون إحتماله.

② أ - بين أن الأمل الرياضياتي للمتغير العشوائي X بدلالة α يعطى بـ: $E(X) = \frac{300}{7} - \alpha$.

ب - أوجد أكبر قيمة ممكنة لـ α حتى تكون اللعبة في صالح اللاعب.

☆ التمرين الثاني: (06 نقاط)

المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. نعتبر النقط $A(1;2)$ ، $B(-8;-1)$ و $C(3;4)$.

و H نقطة معرفة كما يلي: $\overrightarrow{AH} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.

① بين أن النقطة H هي مرجح النقطتين A و C، المرفقتين على الترتيب بمعاملين يطلب تعينهما.

② لتكن النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;1);(B;-1);(C;-3)\}$.

أ - احسب إحداثيي النقطة G.

ب - بين أن النقط B ، H و G في استقامية.

DZPEN.COM | منصة القلم الجزائري

③ لتكن (Γ_1) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $||\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-3\overrightarrow{MC}||=3(k+1)^2$ مع $k\in\mathbb{R}$.

أ - عبر عن الشعاع $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-3\overrightarrow{MC}$ بدلالة الشعاع $\overrightarrow{MG}$.

ب - عين قيم k حتى تكون (Γ_1) دائرة نصف قطرها 1 يطلب تعيين مركزها.

④ عين، ثم أنشئ (Γ_2) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $||\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-3\overrightarrow{MC}||=3||\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MC}||$.2

☆ التمرين الثالث: (08 نقاط)

لتكن الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2+3x+6}{x+2}$.

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

① عين الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث يكون من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-2\}$: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x+2}$.

② احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.

③ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}-\{-2\}$: $f'(x)=\dfrac{x(x+4)}{(x+2)^2}$.

④ استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكل جدول تغيراتها.

⑤ أ - بين أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين إحدهما المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=x+1$.

ب - ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

⑥ تحقق أن النقطة $A(-2;-1)$ هي نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين، ثم بين أنها مركز تناظر للمنحنى (C_f).

⑦ ارسم المستقيمات المقاربة والمنحنى (C_f).

☆ انتهى الإختبار ☆

إذ أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ☆☆ ندمت على التفريط في زمن البذر


أستاذ المادة: فراحتية الحفوظ

الإجابة النموذجية لـ: إختبار الفصل الأول — القسم: ثانية تقني رياضي — الأستاذ: فراحتية المحفوظ

الإجابة	العلامة

- حل التمرين الأول:

1) تمثيل النتائج بمخطط:



(1)

- مجموعة الإمكانيات:

$\Omega = \{BB, BV, VB, VV\}$

2) حساب إحتمال الحوادث:

$P(A) = P(\{BV, VB\}) = \frac{3}{7}\times\frac{4}{7} + \frac{4}{7}\times\frac{3}{7}$

$= \frac{12}{49} + \frac{12}{49} = \frac{24}{49}$ (1,5)

$P(B) = P(\{BB, VV\}) = \frac{3}{7}\times\frac{3}{7} + \frac{4}{7}\times\frac{4}{7}$

$= \frac{9}{49} + \frac{16}{49} = \frac{25}{49}$ (أو $P(B) = 1 - P(A)$)

$P(C) = P(\{BV, VB, VV\})$

$= \frac{3}{7}\times\frac{4}{7} + \frac{4}{7}\times\frac{3}{7} + \frac{4}{7}\times\frac{4}{7}$

$= \frac{12}{49} + \frac{12}{49} + \frac{16}{49} = \frac{40}{49}$

II- 1) تعيين قيم المتغير العشوائي X:

لدينا في حالة الحصول على BB فإن $X = 100-\alpha$

في حالة الحصول على BV أو VB فإن $X = 50-\alpha$ (0,5)

في حالة الحصول على VV فإن $X = -\alpha$

إذن $X = \{100-\alpha;\ 50-\alpha;\ -\alpha\}$

الإجابة	العلامة

- قانون إحتمال المتغير العشوائي X:

$P(X=100-\alpha) = P(\{BB\}) = \frac{3}{7}\times\frac{3}{7} = \frac{9}{49}$ (1)

$P(X=50-\alpha) = P(\{BV, VB\}) = P(A)$

$= \frac{3}{7}\times\frac{4}{7} + \frac{4}{7}\times\frac{3}{7} = \frac{24}{49}$

$P(X=-\alpha) = P(\{VV\}) = \frac{4}{7}\times\frac{4}{7} = \frac{16}{49}$

$X=x_i$	$100-\alpha$	$50-\alpha$	$-\alpha$
$P(X=x_i)$	$\frac{9}{49}$	$\frac{24}{49}$	$\frac{16}{49}$

2) تبيين أن: $E(X) = \frac{300}{7} - \alpha$ (1)

$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i P_i$

$= (100-\alpha)\times\frac{9}{49} + (50-\alpha)\times\frac{24}{49} - \alpha\times\frac{16}{49}$

$= \frac{900 - 9\alpha + 1200 - 24\alpha - 16\alpha}{49}$

$= \frac{2100 - 49\alpha}{49} = \frac{2100}{49} - \frac{49}{49}\alpha$

$E(X) = \frac{300}{7} - \alpha$

3) تعيين أكبر قيمة لـ α حتى تكون اللعبة في صالح اللاعب: (1)

اللعبة في صالح اللاعب معناه $E(X) > 0$

معناه $\frac{300}{7} - \alpha > 0$ معناه $\frac{300}{7} > \alpha$

إذن أكبر قيمة لـ α حتى تكون اللعبة في صالح اللاعب هي $\alpha = 42$

(لأن $\frac{300}{7} \approx 42,86$)

DZPEN.COM | منصة القلم الجزائري
Scanné avec CamScanner

- حل التمرين الثاني: (6)

① - بيّن أن H مرجح النقطتين A و B:

(1) لدينا $2\vec{AH} = 3\vec{AC}$ معناه $\vec{AH} = \frac{3}{2}\vec{AC}$

معناه $2\vec{AH} - 3\vec{AC} = \vec{0}$

معناه $2\vec{AH} - 3\vec{AH} - 3\vec{HC} = \vec{0}$

معناه $-\vec{AH} - 3\vec{HC} = \vec{0}$

معناه $\vec{HA} - 3\vec{HC} = \vec{0}$

ومنه $1-3 = -2 \neq 0$ إذن H مرجح النقطتين A و B المرفقتين بالمعاملين 1 و -3 على الترتيب

② - 1 - حساب إحداثيات النقطة G:

(1) $x_G = \frac{1\times1 + (-1)(-8) + (-3)(3)}{1-1-3} = \frac{9-9}{-3} = \frac{0}{-3} = 0$

$y_G = \frac{1\times2 + (-1)(-1) + (-3)(4)}{1-1-3} = \frac{-9}{-3} = 3$

ومنه إحداثيتا G هي $G(0,3)$

ب - تبيين أن النقط B، H و G في استقامية:

لدينا G مرجح الجملة $\{(A,1);(B,-1);(C,-3)\}$

و H مرجح الجملة $\{(A,1);(1,-3)\}$ (0,5)

حسب خاصية التجميع فإن G مرجح الجملة

$\{(H,1-3),(B,1)\}$

إذن النقط B، H و G على استقامية.

③ - 1 - التعبير عند $\vec{MG}$ بدلالة $\vec{MA}$:

لدينا G مرجح الجملة $\{(A,1),(B,-1),(C,-3)\}$

(1) فإنه من أجل كل نقطة M من المستوي لدينا

$\vec{MA} - \vec{MB} - 3\vec{MC} = (1-1-3)\vec{MG}$

$= -3\vec{MG}$

ب - تعيين قيم k حتى تكون (Γ_1) دائرة ونصف قطرها:

لدينا $\|\vec{MA} - \vec{MB} - 3\vec{MC}\| = 3(k+1)^2$

معناه $\|-3\vec{MG}\| = 3(k+1)^2$

معناه $3MG = 3(k+1)^2$

معناه $MG = (k+1)^2$

(1) ومنه (Γ_1) دائرة مركزها النقطة G

ونصف قطرها $(k+1)^2$

إذن $(k+1)^2 = 1$

أي $k+1 = 1$ أو $-k-1 = 1$

أي $k = 0$ أو $k = -2$

إذن قيم k هي $k = \{0, -2\}$. $-2 \neq 0$

④ - تعيين (Γ_2) مجموعة القيم M:

(1) لدينا $2\|\vec{MA} - \vec{MB} - 3\vec{MC}\| = 3\|\vec{MA} - 3\vec{MC}\|$

ولدينا H مرجح الجملة $\{(A;1);(C;-3)\}$

ومنه من أجل كل نقطة M لدينا

$\vec{MA} - 3\vec{MC} = (1-3)\vec{MH} = -2\vec{MH}$

إذن $2\|-3\vec{MG}\| = 3\|-2\vec{MH}\|$


$2 \times 3 \times MG = 3 \times 2 \times MH$

$6MG = 6MH$

$MG = MH$

ومنه المجموعة (Γ_2) هي محور قطعة المستقيم [HG]

(0,5) - الإنشاء:



DZPEN.COM | منصة القلم الجزائري
Scanné avec CamScanner

حل التمرين الثالث : (08)

$$f(x)=\frac{x^2+3x+6}{x+2}$$

① - تعيين الأعداد الحقيقية a ، b ، c حيث :
$f(x)=ax+b+\frac{c}{x+2}$

(0,5) لدينا من أجل $x\neq -2$

$$f(x)=ax+b+\frac{c}{x+2}$$
$$=\frac{(ax+b)(x+2)+c}{x+2}$$
$$=\frac{ax^2+(b+2a)x+2b+c}{x+2}$$

بالمطابقة نجد $\begin{cases}a=1\\b=1\\c=4\end{cases}$ أي $\begin{cases}a=1\\b+2a=3\\2b+c=6\end{cases}$

أي $f(x)=x+1+\frac{4}{x+2}$

② - حساب نهايات الدالة f :

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{x}=\lim_{x\to+\infty} x=+\infty$$
$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2}{x}=\lim_{x\to-\infty} x=-\infty$$ (0,5)

لدينا

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$	

$\lim_{x\to-2} f(x)=-\infty$

لأن $x\to -2$ فإن $x^2+3x+6\to 4$ و $x+2\to 0^-$

$\lim_{x\to-2} f(x)=+\infty$

لأن $x\to -2$ فإن $x^2+3x+6\to 4$ و $x+2\to 0^+$

3 - نتحقق أنه من أجل $x\neq -2$: $f'(x)=\frac{x(x+4)}{x+2}$

(0,5) الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}-\{-2\}$

$$f'(x)=\frac{(2x+3)(x+2)-(x^2+3x+6)}{(x+2)^2}$$

$$=\frac{2x^2+4x+3x+6-x^2-3x-6}{(x+2)^2}$$

$$=\frac{x^2+4x}{(x+1)^2}=\frac{x(x+4)}{(x+1)^2}$$

④ - إشارة $f'(x)$ ثم تغيرات الدالة f :

(0,5) لدينا $f'(x)=0$ معناه $x(x+4)=0$

معناه $x=0$ أو $x=-4$

x	$-\infty$		-4		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$		

(0,5) ومنه الدالة f متزايدة تماماً على المجال $[0,+\infty[$ و المجال $]-\infty,-4]$

(0,5) ومتناقصة تماماً على مجال $[-4,-2[$

و المجال $]-2,0]$

• جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$		-4		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$		
$f(x)$	$-\infty$ ↗		-5 ↘		$+\infty$ ↘		3 ↗		$+\infty$

⑤ أ- نتحقق أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين :

(0,5) وحيث سابقاً $\lim_{x\to-2} f(x)=-\infty$

و $\lim_{x\to-2} f(x)=+\infty$

ومنه (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x=-2$

é avec CamScanner
DZPEN.COM | منصة القلم الجزائري

ولدينا $\lim_{|x|\to+\infty}(f(x)-y)=\lim_{|x|\to+\infty}(f(x)-(x+1))$

$=\lim_{|x|\to+\infty}\frac{4}{x+2}=0$

وعليه المستقيم (Δ) ذو معادلة $y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$ و بجوار $-\infty$.

ب- دراسة وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ):

- ندرس إشارة الفرق: $f(x)-y$

$f(x)-y=x+1+\frac{4}{x+2}-(x+1)=\frac{4}{x+2}$

وعليه إشارة الفرق هي إشارة $x+2$

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$x+2$	$-$	0 $+$	
$f(x)-y$	$-$	$\|$ $+$	
وضع المنحنى	(C_f) تحت (Δ)	$\|$	(C_f) فوق (Δ)

(1)

ج- التحقق أن $A(-2,-1)$ هي نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين:

لدينا معادلة المستقيم المقارب الشاقولي هي $x=-2$

ومعادلة المستقيم المائل $y=x+1$ (0,5)

نجد $x=-2$ و $y=-2+1=-1$

إذن نقطة تقاطع المستقيمين هي $A(-2,-1)$

- نبين أن $A(-2,-1)$ مركز تناظر لـ (C_f):

لدينا من أجل $x\neq-2$ ، $-2+x\neq-2$ و $-2-x\neq-2$

$f(-2+x)+f(-2-x)=$ (0,5)


$=-2+x+1+\frac{4}{-2+x+2}-2-x+1+\frac{4}{-2-x+2}$

$=-x+\frac{4}{x}-\frac{4}{x}$

$=-4+2=-2=2(-1)$

وعليه النقطة $A(-2,-1)$ مركز تناظر لـ (C_f)

د- رسم المستقيمات المقاربة والمنحنى (C_f):



(1)

انتهى

Scanné avec CamScanner
DZPEN.COM | منصة القلم الجزائري