

## ← التمرين الأول (05 نقاط)

نعتبر كثيري الحدود  $P$  و  $Q$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ:  $Q(x) = 3x^2 - 4x + 1$  و  $P\left(\frac{x}{3}\right) = Q(x)$

1 حل في  $\mathbb{R}$  المعادلة  $Q(x) = 0$  [00.50 ن]

2 احسب  $P(0)$  و  $P(1)$  [01.50 ن]

3 أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$ ،  $P(x) = 27x^2 - 12x + 1$  [01.50 ن]

4 حل في  $\mathbb{R}$  المعادلة:  $P(x) = 3Q(x)$ ، ثم عين إشارة  $\frac{P(x)}{3Q(x)}$  [01.50 ن]

## ← التمرين الثاني (09 نقاط)

I الدالة العددية  $g$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ:  $g(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 2$ ، وليكن  $(C_g)$  تمثيلها البياني في معلم المتعامد المتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1 أ- ادرس تغيرات الدالة  $g$  [01.00 ن]

ب- ماذا تستنتج بالنسبة لـ  $(C_g)$  [00.50 ن]

2 أ- احسب  $g(-2)$ ، ثم حل المعادلة  $g(x) = 0$  [01.50 ن]

ب- استنتج إشارة  $g(x)$  على  $\mathbb{R}$  [01.00 ن]

II نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R} - \{-1\}$  بـ:  $f(x) = \frac{2x^3 + 7x^2 + 8x + 2}{(x+1)^2}$ ،  $(C_f)$  تمثيلها البياني في المعلم السابق

1 أ- بين أنه من أجل كل  $x$  حقيقي يختلف عن  $-1$  لدينا،  $f'(x) = \frac{2g(x)}{(x+1)^3}$  [01.00 ن]

ب- استنتج تغيرات الدالة  $f$ ، ثم شكل جدول تغيراتها [01.00 ن]

2 أ-  $a, b, c$  ثلاث أعداد حقيقية، بين أن:  $f(x) = ax + b + \frac{c}{(x+1)^2}$  [01.00 ن]

ب- ادرس الوضع النسبي بين  $(C_f)$  والمستقيم  $(\Delta)$  ذو المعادلة  $y = 2x + 3$  [00.50 ن]

ج- أثبت أنه لا توجد أي مماسات لـ  $(C_f)$  توازي المستقيم  $(\Delta)$  [00.50 ن]

III نعتبر الدالة  $h$  المعرفة على  $\mathbb{R}^*$  بـ  $h(x) = \frac{2x^3 - 1}{x^2}$

1 تحقق أنه من أجل كل  $x$  حقيقي غير معدوم:  $h(x) + 1 = f(x - 1)$  [00.50 ن]

2 اشرح كيف يمكن إنشاء  $(C_h)$  منحنى الدالة  $h$  انطلاقاً من  $(C_f)$  [00.50 ن]


## ← التمرين الثالث (06 نقاط)

الدالة  $f$  معرفة وقابلة للاشتقاق على  $\mathbb{R} - \{-1\}$  بـ:  $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{(x+1)^2}$ ، حيث  $a, b, c$  أعداد حقيقية. و  $(C_f)$  التمثيل

البياني للدالة  $f$  في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

و  $(T_1)$  و  $(T_2)$  مماسين للمنحنى  $(C_f)$  في النقطتين  $A\left(1; \frac{1}{4}\right)$  و  $B(-2; -2)$ .

كما هو مبين في الشكل الآتي:



بقراءة بيانية، أجب على ما يلي:

- ① عيّن حلول المعادلة  $f'(x) = 0$
- ② شكّل جدول إشارة المشتقة  $f'$  ثم استنتج جدول تغيرات الدالة  $f$
- ③ عيّن:  $f(0)$ ،  $f(-2)$ ،  $f'(-2)$  و  $\lim_{h \rightarrow 0} \left( \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \right)$
- ④  $m$  وسيط حقيقي، ناقش بيانًا حسب قيم  $m$  عدد وإشارة حلول المعادلة  $f(x) = m$
- ⑤ مما سبق، عيّن عبارة  $(T_1)$ ،  $(T_2)$ ، و  $f(x)$

[00.50 ن]

[00.75 ن]

[01.75 ن]


[01.00 ن]

[02.00 ن]

### ← تمرين إضافي: (01+ نقطة)

إليك التمثيلان البيانيان  $(\Gamma)$  و  $(\Delta)$  أحدهما خاص بالدالة  $f$  والآخر لمشتقتها  $f'$   
 • أنسب (مع التبرير) كل تمثيل لدالته

[01.00 ن]



حكمة: مهما كان العلم متعباً، فلن يكون أشد إرهاقاً من الجهل



التمرين (1) :

(1) حل  $Q(x) = 0$

$$\Delta = (-4)^2 - 4(3)(1) \\ = 16 - 12 = 4 > 0$$

اذن يوجد جذران لـ  $Q(x)$  :

$$x = \frac{-(-4) - \sqrt{4}}{2(3)} = \frac{1}{3} \text{ أو } x = \frac{-(-4) + \sqrt{4}}{2(3)} = 1$$

اذن  $S = \left\{ \frac{1}{3}, 1 \right\}$

$$P(0) = P\left(\frac{0}{3}\right) = Q(0) = 1$$

$$P(1) = P\left(\frac{3}{3}\right) = Q(3) = 16$$

$$P\left(\frac{x}{3}\right) = Q(x) \quad \text{لدينا}$$

$$x = 3t \quad \text{نضع} \quad \frac{x}{3} = t$$

$$p(t) = Q(3t) \quad \text{اذن :}$$

$$p(t) = 3(3t)^2 - 4(3t) + 1$$

$$= 3(9t^2) - 12t + 1$$

$$p(t) = 27t^2 - 12t + 1$$

وكتب :

$$p(x) = 27x^2 - 12x + 1$$

$$p(x) = 3Q(x) \quad \text{لنسا}$$

$$27x^2 - 12x + 1 = 3(3x^2 - 4x + 1) \quad \text{اذن :}$$

$$27x^2 - 12x + 1 = 9x^2 - 12x + 3$$

$$18x^2 = 2$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{\frac{1}{9}}$$

$$|x| = \frac{1}{3}$$

$$x = -\frac{1}{3} \quad \text{او} \quad x = \frac{1}{3} \quad \text{اذن}$$

$$S = \left\{ -\frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right\}$$

ملاحظة :  $P(x) = Q(3x)$

$P(x) = Q(3x)$  لربنا

الكافى :  $\begin{cases} 3x = 1 \\ 3x = \frac{1}{3} \end{cases}$  و منه :  $\begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ x = \frac{1}{9} \end{cases}$

ادون  $\int P(x) = 0 = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{1}{9} \right\}$  وحليهم (370)

x	$-\infty$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	1	$+\infty$
$P(x)$	+	0	-	0	+
$Q(x)$	+	+	-	+	+
$\frac{P(x)}{Q(x)}$	+	0	-	-	+

التحليل 2 :

ك 1 : تغيير المتغير

لربنا  $g$  فاننا نلاحظ اننا قلنا :

$g(x) = 3x^2 + 6x + 3$

$$\Delta = 6^2 - 4(3)(3) = 0 \quad \text{لدينا}$$

$$x = \frac{-6}{2(3)} = -1 \quad \text{ومنه } g'(x) = 0 \quad \text{معناه}$$

$x$	$-\infty$	$-1$	$+\infty$
$g'(x)$		$+$ $\phi$ $+$	

اذن الدالة متزايدة خارج  $[-1, 1]$ .

ب/ الاستنتاج:

لدينا:  $g'(x)$  تتغير عند  $x = -1$  ولا

تغيراتها، منها  $(g)$  يقبل

نقطة انعطاف عند الفاصلة  $-1$ .

② - 7 - حساب  $g(-2)$ :

$8x+2$

$$g(-2) = -8 + 12 - 6 + 2 = 0$$

= حل المعادلة  $g(x) = 0$ .

لدينا:  $g(x) = (x+2)(ax^2 + bx + c)$

$(-4)$

	1	3	3	2
	-2	0	-2	2
	1	1	1	0

$$g(x) = (x+2)(x^2 + x + 1)$$

اذن

$$g(x) = 0 \quad \text{لدينا}$$

$$\begin{cases} x+2=0 \\ \text{أو} \end{cases} \quad \text{معناه}$$

$$x^2+x+1=0 \dots (Q(x))$$

$$x = -2 \quad \text{لدينا} \quad x+2=0 \quad \text{معناه}$$

لدينا،  $Q(x)=0$  لا تغير حلوله في  $\mathbb{R}$  لأن  $\Delta < 0$

$$S_{g(x)=0} = \{-2\}$$

بما أن  $f$  متزايدة على  $\mathbb{R}$  و  $g(-2)=0$  فإن

$x$	$-\infty$	$-2$	$+\infty$
$g(x)$	$-$	$0$	$+$

(II) لدينا  $f$  و  $g$  لا تتقاطعا على  $\mathbb{R}$ .

$$f'(x) = \frac{(6x^2+14x+8)(x+1)^2 - 2(x+1)(2x^3+7x^2+8x+2)}{(x+1)^4}$$

$$= \frac{(x+1) \left[ (6x^2+14x+8)(x+1) - 2(2x^3+7x^2+8x+2) \right]}{(x+1)^4}$$

$$= \frac{6x^3+14x^2+8x+6x^2+14x+8-4x^3-14x^2-16x-4}{(x+1)^3}$$

$$= \frac{2(x^3+3x^2+3x+2)}{(x+1)^3} = \frac{2g(x)}{(x+1)^3}$$

## بالتغيرات $f$ :

$$f'(x) = \frac{2g(x)}{(n+1)^3}$$

هنا

$$(n+1)^3 = (n+1)^2(n+1)$$


هنا

هنا:  $n+1 \neq 0$  و  $n \neq -1$  وعليه

$n$	$-\infty$	$-2$	$-1$	$+\infty$
$g(x)$	-	0	+	+
$(n+1)$	-	-	+	+
$f'(x)$	+	0	-	+

وعليه  $f$  متزايدة تمامًا على  $[-2, -1]$  و  $[0, +\infty)$  و متناقصة تمامًا على  $[-\infty, -2]$  و  $[-1, 0]$ .

جدول تغيرات  $f$



②، ايجاد a, b, c:

من اجل كل  $x$  حقيقي يضاف

عن  $-1$ ، لدينا:

$$ax+b + \frac{c}{(x+1)^2} = \frac{(a+b)(x+1)^2 + c}{(x+1)^2}$$

$$= \frac{(a+b)(x^2+2x+1) + c}{(x+1)^2}$$

$$= \frac{ax^3 + 2ax^2 + ax + bx^2 + 2bx + b + c}{(x+1)^2}$$

$$= \frac{ax^3 + x^2(2a+b) + x(a+2b) + (b+c)}{(x+1)^2}$$

بالقارنة مع  $f(x)$  نجد:

$$\begin{cases} a = 2 \end{cases}$$

$$2a + b = 7$$

$$a + 2b = 8$$

$$b + c = 2$$

$c = -1$  و  $b = 3$   $(a = 2)$  عند

$f(x) = 2x + 3 - \frac{1}{(x+1)^2}$  اذن

بالوضع النسبي :

هذا أجل كل  $x \neq -1$  لدينا :

$f(x) - (2x+3) = -\frac{1}{(x+1)^2} < 0$

وعلية :

$x$	$-\infty$	$-1$	$+\infty$
دالة $f(x)$	—		—
الوضع النسبي	$(\Delta)$		$(\Delta)$

تفريغ وجودها عند  $(c)$  بواسطة  $(\Delta)$  →

وننزل إلى تناقص

$f'(x) = 2$

لدينا :

$\frac{2f(x)}{(x+1)^3} = 2$

أي :

$$\frac{2(x^3 + 3x^2 + 3x + 2)}{(x+1)^3} = 2 \quad \text{ومن هنا:}$$

$$x^3 + 3x^2 + 3x + 2 = (x+1)^3 \quad \text{ومن هنا:}$$

$$x^3 + 3x^2 + 3x + 2 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1 \quad \text{ومن هنا:}$$

$$2 = 1 \quad \text{ومن هنا:}$$

وهذا مستحيل

اذن لا يوجد ايجاد صيغة لـ  $f(x)$  بواسطة  $(x)$

ثابت ان  $f(x-1) = h(x) + 1$  ①

لـ  $x=0$  لـ  $x$  لـ  $x$

$$f(x-1) = \frac{2(x-1)^3 + 7(x-1)^2 + 8(x-1) + 2}{(x-1+1)^2}$$

$$= \frac{2(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) + 7(x^2 - 2x + 1) + 8x - 8 + 2}{x^2}$$

$$= \frac{2x^3 - 6x^2 + 6x - 2 + 7x^2 - 14x + 7 + 8x - 6}{x^2}$$

$$= \frac{2x^3 + x^2 - 1}{x^2} = \frac{2x^3 - 1}{x^2} + \frac{x^2}{x^2} = h(x) + 1$$

$$f(x-1) = h(x) + 1 \quad \text{اذن}$$

$$h(x) + 1 = f(x-1) \quad \text{لدينا:}$$

$$h(x) = f(x-1) - 1 \quad \text{ومنه:}$$


ومنه  $(C_n)$  صولسو،  $(C_f)$  با لاسولك  
الذي شاعلة  $\vec{u}(\hat{1})$

التمرين 3:

$$f'(x) = 0 = \{ -2 \}$$

(1) (D)

(2)



$$f(0) = 2$$

$$f(-2) = -2$$

(3)

$$f'(-2) = 0$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left( \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \right) = f'(1)$$

$$= \frac{4 - \frac{1}{4}}{-4 - 1} = \frac{\frac{15}{4}}{-5} = -\frac{3}{4}$$

حلل المعادلة  $f(x) = m$

(4)

حيث عوامل نقطه تقاطع (مع) مع المستقيم ذات المعادلة

$$y = m$$

ما:  $m < -2$  لا يوجد حلول

ما:  $m = -2$  للمعادلة حل واحد سالب تمامًا

ما:  $-2 < m < -1$  للمعادلة حلان سلبان تمامًا

ما:  $m = -1$  حل واحد سالب تمامًا