الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

ث/ عياش مقلاتي الحاسي+ ث/تاكسلانت+ ث/كواوشة اسماعيل نقاوس	مديرية التربية لولاية باتنة
المستوى: السنة الثالثة	الشعبة: علوم تجريبية

اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات

يوم: 01 مارس 2021	المدة: 3 ساعات

التمرين الأول: 07,5 نقطة

الجزء الأول: g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=xe^{x+1}-1$.

1. أدرس تغيرات الدالة g.
2. أ) بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0,27<\alpha<0,29$.
   ب) استنتج حسب قيم x اشارة $g(x)$.

الجزء الثاني: f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعبارة: $f(x)=(x-1)(e^{x+1}-1)$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(o;\vec{i};\vec{j})$.

1. أحسب نهايات الدالة f عند الأطراف المفتوحة لمجموعة تعريفها.
2. أ) بين أنه من أجل $x\in\mathbb{R}$: $f'(x)=g(x)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f.
   ب) بين أن $f(\alpha)=-\dfrac{(\alpha-1)^2}{\alpha}$ ثم أعط حصرا لـ $f(\alpha)$.
3. أ) بين أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين احداثييها.
   ب) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=-x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$ ثم أدرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).
4. أ) بين أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) يطلب كتابة معادلة له.
   ب) عين احداثيات نقط تقاطع (C_f) مع حاملي محوري الاحداثيات.
5. أ) أنشئ كلا من (Δ) و (T) ثم أرسم (C_f) نأخذ $f(\alpha)=-1,87$.
   ب) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x)=-x+\ln m$.

التمرين الثاني: 07,5 نقطة

الجزء الأول: g الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بالعبارة: $g(x)=\dfrac{a+b\ln x}{x^2}$ بجدول تغيراتها المقابل.

x	0		$e^{\frac{-1}{2}}$		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	$\frac{1}{2}e$	↘	0

1. انطلاقا من جدول تغيرات الدالة g بين أن $a=b=1$.
2. أحسب $g(e^{-1})$ ثم استنتج اشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

الجزء الثاني: f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بالعبارة: $f(x)=\dfrac{2+\ln x}{x}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(o;\vec{i};\vec{j})$.

منـــصـــة الـقـلـم الـجـزائـــري | DZPEN.COM

1. أ) أحسب نهايات الدالة f عند الأطراف المفتوحة لمجموعة تعريفها.

ب) بين أنه من أجل $x \in]0;+\infty[$: $f'(x) = -g(x)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f.

2. أ) عين دون حساب $\lim\limits_{x \to e^{-1}} \dfrac{f(x)-e}{x-e^{-1}}$ ثم فسر النتيجة هندسيا.

ب) بين أن النقطة $\Omega\left(e^{-\frac{1}{2}};\dfrac{3}{2}\sqrt{e}\right)$ نقطة انعطاف لـ (C_f).

3. h الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $h(x) = \dfrac{2}{x}$ وليكن (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

أ) أحسب $\lim\limits_{x \to +\infty}[f(x)-h(x)]$ ثم فسر النتيجة بيانيا.

ب) أدرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (C_h).

4. أ) أحسب $f\left(e^{-2}\right)$ ثم أرسم (C_f).

5. أ) أدرس تغيرات الدالة k المعرفة على المجال $]-\infty;0[$ بـ: $k(x) = f(-x)$. (عبارة الدالة k غير مطلوبة).

ب) وضح كيف يمكن رسم (C_k) المنحني الممثل للدالة k انطلاقا من (C_f) ثم أرسمه في نفس المعلم السابق.

التمرين الثالث: 05نقاط

I. نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ:
$$\begin{cases} u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n^2 \\ u_0 = \dfrac{3}{2} \end{cases}$$

في الوثيقة المرفقة (C_f) هو التمثيل البياني للدالة f المعرفة على المجال $[0;2]$ بـ: $f(x) = \dfrac{1}{2}x^2$ و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$.

1. باستعمال الوثيقة المرفقة مثل على حامل محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 دون حسابها مبرزا خطوط الرسم.

2. أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 < u_n < 2$.

ب) بين أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما على N ثم استنتج أنها متقاربة و أحسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

II. (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \ln\left(\dfrac{1}{2}u_n\right)$.

1. بين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = 2$ يطلب تعيين حدها الأول.


2. أكتب كلا من v_n و u_n بدلالة n. ثم أستنتج مرة أخرى $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

$$S_n = v_0 + v_1 + \ldots\ldots + v_n$$

3. أحسب بدلالة n المجموعين S_n و S'_n حيث: $S'_n = \dfrac{1}{4}u_0^2 \times \dfrac{1}{4}u_1^2 \times \ldots\ldots \times \dfrac{1}{4}u_n^2$

منـــصـــة الـقـلـم الـجـزائـــري | DZPEN.COM

الوثيـــــــــــــقة المرفقـــــــــة	
الإسم:	اللقب:



DZPEN.COM | منـــصـــة الـقـــلـــم الـجـزائـــري