



## امتحان البكالوريا التجريبي

المدرسة العليا للأساتذة بورقلة  
مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية  
دورة أفريل 2025  
الشعبة: علوم تجريبية  
المادة: رياضيات  
المدة: 3 ساعات و 30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:  
الموضوع الأول

### التمرين الأول (4 ن)

المتتالية العددية  $(U_n)$  معرفة بـ:  $U_0 = 1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي  $n$ :  $U_{n+1} = \frac{U_n}{e^n U_n + e}$

- أحسب كلاً من  $U_1$  و  $U_2$
- أ. برهن بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي  $n$ ،  $U_n > 0$   
ب. بين أن  $(U_n)$  متناقصة تماماً ثم استنتج أنها متقاربة.
- المتتالية العددية  $(V_n)$  معرفة على  $\mathbb{N}$  كما يلي:  $V_n = \frac{e^{-n}}{U_n}$   
أ. بين أن المتتالية  $(V_n)$  حسابية أساسها  $e^{-1}$  ثم استنتج عبارة  $V_n$  بدلالة  $n$   
ب. أكتب عبارة  $U_n$  بدلالة  $n$  ثم استنتج  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$
- من أجل كل عدد طبيعي  $n$  نضع:  $S_n = U_0 V_0 + U_1 V_1 + \dots + U_n V_n$   
أحسب  $S_n$  بدلالة  $n$  ثم استنتج أن  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{e}{e-1}$

### التمرين الثاني (4 ن)

- صندوق غير شفاف به 5 كريات متماثلة لا نفرّق بينها عند اللمس، منها كرتين خضراوين تحملان الرقمين: 0 و 1، كرتين حمراوين تحملان الرقمين: 1 و 2، وكريّة بيضاء تحمل الرقم: 2.
- نسحب عشوائياً من الصندوق كرتين في آن واحد.
- أحسب احتمال كلاً من الحدثين الآتيين.  
أ.  $A$ : "الحصول على كرتين مختلفتين في اللون".  
ب.  $B$ : "الحصول على كريّة بيضاء على الأقل".
  - نعتبر  $X$  المتغير العشوائي الذي يُرفق بكل سحب مجموع الرقمين المحصل عليهما.  
أ. برّر أنّ مجموعة قيم المتغير العشوائي  $X$  هي  $\{1; 2; 3; 4\}$ ، ثمّ عرّف قانون احتمالها.  
ب. استنتج احتمال الحدث  $(C_X^2 = 1)$
  - نضيف إلى الصندوق  $k$  كريّة تحمل الرقم 1 حيث  $k \in \mathbb{N}^*$ ، ونسحب عشوائياً كرتين على التوالي بدون إرجاع.  
• عين قيمة  $k$  التي يكون من أجلها احتمال الحصول على عددين جداؤهما معدوم هو  $\frac{1}{15}$

## التمرين الثالث ( 5 ن )

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{u}, \vec{v})$   
أجب بصحيح أو خاطئ مع التبرير في كل حالة من الحالات الآتية.

1. المعادلة  $z + i - i = 0$  تقبل حلاً وحيداً في مجموعة الأعداد المركبة  $\mathbb{C}$
2. مجموعة النقط  $M$  من المستوي ذات اللاحقة  $z$  حيث  $z + \bar{z} = 0$  هي حامل محور الفواصل.

3. العدد المركب  $\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{1962}$  يساوي  $i$

4. إذا كان  $z = 1 + i$  فإن المتتالية العددية  $(U_n)$  المعرفة على  $\mathbb{N}^*$  بـ  $U_n = \log |z|^n$  هي متتالية حسابية.

5. إذا كان  $z$  عدداً مركباً حيث  $|z| = 1$  فإن  $|z - 4| = |4\bar{z} - 1|$

## التمرين الرابع ( 7 ن )

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| $x$    | 0         | $+\infty$ |
| $g(x)$ | $-\infty$ | $+\infty$ |

(I) الجدول المقابل هو جدول تغيرات الدالة  $g$  المعرفة

$$g(x) = x + \frac{2 \ln x - 1}{x} \text{ على } ]0; +\infty[ \text{ كما يلي}$$

• أحسب  $g(1)$  ثم استنتج إشارة  $g(x)$  على  $]0; +\infty[$

(II) الدالة العددية  $f$  معرفة على المجال  $]0; +\infty[$  كما يلي :  $f(x) = \ln x - \frac{\ln x}{x^2}$

و  $(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  حيث  $\|\vec{i}\| = 1 \text{ cm}$

1. أ. بين أن  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  وفسر النتيجة هندسياً ثم أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- ب. بين أنه: من أجل كل  $x$  من  $]0; +\infty[$  ،  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$  ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة  $f$
2. أ. أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \ln x]$  ثم فسر النتيجة هندسياً.

ب. أدرس الوضع النسبي لـ  $(C_f)$  و  $(\gamma)$  المنحنى الممثل للدالة  $\ln$

3. أنشئ كلاً من  $(\gamma)$  و  $(C_f)$

4. نعتبر  $\lambda$  عدداً حقيقياً حيث  $\lambda > 1$  ، نرمز بـ  $\mathcal{S}(\lambda)$  إلى مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنيين  $(C_f)$  و  $(\gamma)$  والمستقيمين ذوا المعادلتين  $x = \lambda$  و  $x = 1$

- أ. باستعمال الكاملة بالتجزئة بين أن  $\int_1^\lambda \frac{\ln x}{x^2} dx = 1 - \frac{1}{\lambda} - \frac{\ln \lambda}{\lambda}$

ب. استنتج أن  $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{S}(\lambda) = \mathcal{S}(e^{-1}) \text{ cm}^2$

5. الدالة العددية  $h$  معرفة على  $]0; +\infty[$  كما يلي :  $h(x) = \frac{|\ln x|}{x^2} - |\ln x|$

• اشرح كيفية إنشاء المنحنى الممثل للدالة  $h$  انطلاقاً من  $(C_f)$  . ( لا يُطلب الإنشاء )

انتهى الموضوع الأول

## الموضوع الثاني

## التمرين الأول (4 ن)

في المدرسة العليا للأساتذة بورقلة يُراد تشكيل لجنة لتمثيل الطلبة تضم رئيساً، نائباً وكاتباً، من بين خمسة طلبة ذكور، وأربع طالبات إناث إحداهن اسمها يسرى.

- أحسب احتمال كُلاً من الحدثين الآتين.  
أ. الحدث  $A$ : " أعضاء اللجنة من جنسين مختلفين ".  
ب. الحدث  $B$ : " يسرى رئيساً للجنة ".
- بين أن  $P(\bar{A} \cap B) = \frac{1}{84}$  ثم استنتج  $P_{\bar{A}}(B)$  احتمال الحدث  $B$  علماً أن  $\bar{A}$  محقق.
- نعتبر  $X$  المتغير العشوائي الذي يرفق كل لجنة بعدد الذكور فيها.  
أ. بين أن  $P(X=1) = \frac{5}{14}$  و  $P(X=2) = \frac{10}{21}$   
ب. عرّف قانون احتمال المتغير العشوائي  $X$   
ج. أحسب  $E(X)$  الأمل الرياضي للمتغير العشوائي  $X$  ثم استنتج  $E(1962X - 1245)$

## التمرين الثاني (4 ن)

عين الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة من الحالات الآتية مع التبرير.

- الدالة العددية  $h$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  ب:  $h(x) = 2x + \ln(1 + e^{-4x})$  هي دالة  
أ) زوجية.      ب) فردية.      ج) لا زوجية ولا فردية.
- مجموعة حلول المعادلة  $\log(x - \sqrt{3}) + \log(x + \sqrt{3}) = 0$  ذات المجهول الحقيقي  $x$  هي  
أ)  $\{-2; 2\}$       ب)  $\{2\}$       ج)  $\{-10; 10\}$
- قيمة العدد الحقيقي  $\beta$  الذي يحقق  $\int_0^\beta x e^x dx = 1$  هي  
أ) 1      ب)  $e$       ج) -1
- حلّ المعادلة التفاضلية  $y' - 1962y = 2025$  الذي يحقق  $y(0) = 0$  هو دالة  
أ) متناقصة تماماً على  $\mathbb{R}$       ب) ثابتة على  $\mathbb{R}$       ج) متزايدة تماماً على  $\mathbb{R}$

## التمرين الثالث (5 ن)

الدالة العددية  $f$  معرفة على المجال  $[0; +\infty[$  كما يلي:  $f(x) = \frac{x}{2x+1}$   
ونعتبر المتتالية العددية  $(U_n)$  المعرفة على  $\mathbb{N}$  ب:  $U_0 = 1$  ومن أجل كل عدد طبيعي  $n$  ب:  $U_{n+1} = f(U_n)$

- شكّل جدول تغيرات الدالة  $f$ .
- أ. برهن بالتراجع أنّه: من أجل كل عدد طبيعي  $n$ ،  $U_n > 0$   
ب. أدرس اتجاه تغير  $(U_n)$  ثم استنتج أنّها متقاربة.

$$3. \text{ أ. بين أنه: من أجل كل } n \text{ من } \mathbb{N}^* , f\left(\frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n+1}$$

$$\text{ب. بين أنه: من أجل كل } n \text{ من } \mathbb{N}^* , U_n \leq \frac{1}{n}$$

$$\text{ج. أحسب } \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$$

$$4. \text{ من أجل كل } n \text{ من } \mathbb{N}^* \text{ نضع: } S_n = \frac{2}{U_1} + \frac{2}{U_2} + \dots + \frac{2}{U_n}$$

$$\cdot \text{ بين أنه: من أجل كل } n \text{ من } \mathbb{N}^* , S_n \geq n(n+1) \text{ ثم استنتج } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$$

### التمرين الرابع (7 ن)

(I) الدالة العددية  $g$  معرفة على  $\mathbb{R}$  ب:  $g(x) = e^x + x$

1. أدرس اتجاه تغير الدالة  $g$  على  $\mathbb{R}$

2. أ. بين أن المعادلة  $g(x) = 2$  تقبل حلًا وحيدًا  $\alpha$  حيث  $0,4 < \alpha < 0,5$

ب. استنتج حسب قيم العدد الحقيقي  $x$  إشارة  $g(x) - 2$

(II) الدالة العددية  $f$  معرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي:  $f(x) = (x-1)(e^{-x} - 1)$

و  $(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  حيث  $\|\vec{j}\| = 1 \text{ cm}$ .

1. أ. أحسب كلاً من  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

ب. بين أنه من أجل كل  $x$  من  $\mathbb{R}$ :  $f'(x) = \frac{2-g(x)}{e^x}$

ج. استنتج أن  $f$  متزايدة تماماً على  $]-\infty; \alpha]$  ومتناقصة تماماً على  $[\alpha; +\infty[$  ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. أ. بين أن المستقيم  $(\Delta)$  ذو المعادلة  $y = -x + 1$  مقارب مائل للمنحنى  $(C_f)$  عند  $+\infty$

ب. أدرس الوضع النسبي لـ  $(C_f)$  و  $(\Delta)$

3. أكتب معادلة للمماس  $(T)$  للمنحنى  $(C_f)$  في النقطة  $O$

4. أ. أنشئ كلاً من  $(\Delta)$ ،  $(T)$  و  $(C_f)$

ب. عين بياناً قيم الوسيط الحقيقي  $m$  التي من أجلها تقبل المعادلة  $f(x) = x \ln m$  حلين بالضبط.

5. نعتبر  $\lambda$  عدداً حقيقياً حيث  $\lambda > 1$ ، نرمز بـ  $A(\lambda)$  إلى مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى  $(C_f)$  والمستقيمتين

ذات المعادلات:  $y = -x + 1$ ،  $x = 0$  و  $x = \lambda$

• باستعمال المكاملة بالتجزئة أحسب  $\int_1^\lambda x e^{-x} dx$  ثم استنتج أن  $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda) = e^{-1} \text{ cm}^2$

انتهى الموضوع الثاني

