الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: رياضيات

دورة: 2021

اختبار في مادة: الرياضيات — المدة: 04 سا و30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

المتتالية العددية (u_n) معرّفة بـ: $u_0 = -\frac{3}{2}$ و من أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{11u_n + 4}{-4u_n + 1}$

1) أ . تَحقَّق أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_{n+1} = -\frac{11}{4} + \frac{27}{4(-4u_n + 1)}$

ب. برهن بالتراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n: $-2 < u_n < -1$

جـ. بيّن أنّ المتتالية (u_n) متناقصة تماما ثمّ استنتج أنّها متقاربة.

2) المتتالية العددية (v_n) معرّفة من أجل كلّ عدد طبيعي n بِـ: $v_n = \frac{2u_n + 1}{u_n + 2}$

أ . بيّن أنَّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها 3 ثمّ احسب حدّها الأول.

ب. اكتب v_n بدلالة n ثمّ استنتج أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_n = \frac{3}{2 + 4 \times 3^n} - 2$

جـ. احسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$

3) أ . تَحقَّق أنَّه من أجل كلّ عدد طبيعي n: $\frac{3}{u_n + 2} - 2 = -v_n$

ب. نضع من أجل كلّ عدد طبيعي n: $S_n = \ln\left(\frac{3}{u_0 + 2} - 2\right) + \ln\left(\frac{3}{u_1 + 2} - 2\right) + \cdots + \ln\left(\frac{3}{u_n + 2} - 2\right)$

احسب S_n بدلالة n

التمرين الثاني: (04 نقاط)

كيس به 12 كريّة متماثلة لا نفرّق بينها باللمس.

كلّ من الكريّات الاثنتي عشرة تحمل رقما من بين الأعداد التالية: 1 ، 2 ، 3 ، 4

نسحب عشوائيا كريّة واحدة من الكيس.

نرمز بِـ: p_i إلى احتمال سحب كريّة رقمها i، حيث: $p_1 = \frac{1}{3}$ ، $p_2 = \frac{1}{6}$ ، $p_3 = \frac{1}{4}$ و $p_4 = \frac{1}{4}$

1) وزّع الكريّات الاثنتي عشرة حسب الأرقام 1 ، 2 ، 3 ، 4

2) احسب احتمال كلّ من الحوادث A ، B و C الآتية:

A " سحب كريّة تحمل رقما فرديا "

B " سحب كريّة تحمل رقما من أرقام نظام التّعداد ذي الأساس 4 "

C " سحب كريّة رقمها حلّ للمعادلة: $x^2 = 2^x$ "

DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com

3) المتغيّر العشوائي X يرفق بكلّ سحب لكريّة الرّقم الذي تحمله.
عيّن مجموعة قيم المتغيّر العشوائي X ثمّ احسب $E(X)$ أمله الرّياضياتي.

التمرين الثالث: (05 نقاط)

1) نعتبر المعادلة ذات المجهول $(x;y)$: $(E)\cdots 42x-y=38$ ، حيث x و y عددان صحيحان.
حلّ المعادلة (E) علما أنّ الثّنائية $(1;4)$ حلّ لها.

2) a ، b و c أعداد طبيعية حيث a غير معدوم.
العدد الطبيعي N يُكتب $\overline{ab0cb}$ في نظام تعداد أساسه 5 و يُكتب $\overline{a7c5}$ في نظام تعداد أساسه 8
أ . بيّن أنّ الأعداد a ، b و c تُحقّق: $113a=3(c-42b+151)$ ثمّ استنتج أنّ: $a=3$
ب. جِدْ العددين الطبيعيين b و c ثمّ اكتب العدد N في النّظام العشري.

3) أ . ادرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 6
ب. بيّن أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n : $2021^{2n}+1441^n+4$ مضاعف للعدد 6
جـ. نضع: $A_n=2021^{2n}+1441^n+2\times 1442^n$
جِدْ قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $A_n\equiv 0[6]$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

I) الدّالة العددية g معرّفة على $\mathbb{R}$ بِـ: $g(x)=(x^2-3)e^x+3$

1) ادرس تغيّرات الدّالة g ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

2) أ . بيّن أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α يُحقّق: $1,53<\alpha<1,54$
ب. احسب $g(0)$ ثمّ استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$

II) الدّالة العددية f معرّفة على $\mathbb{R}$ بِـ: $f(x)=3x+1+(x^2-2x-1)e^x$
(C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O\,;\vec{i}\,,\vec{j}\,)$

1) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$

2) أ . بيّن أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x : $f'(x)=g(x)$
ب. استنتج أنّ f متزايدة تماما على كلّ من $]-\infty\,;0]$ و $[\alpha\,;+\infty[$ ومتناقصة تماما على $[0\,;\alpha]$
جـ. شكّل جدول تغيّرات الدّالة f

3) أ . بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=3x+1$ مقارب مائل لـ (C) عند $-\infty$
ب. ادرس وضعية (C) بالنّسبة إلى (Δ)
جـ. بيّن أنّ (C) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β تُحقّق: $2,03<\beta<2,04$
د. بيّن أنّ (C) يقبل مماسين (T) و (T') موازيين لِـ (Δ) (لا يُطلب كتابة معادلة لِـ (T) و (T'))

4) ارسم (Δ) ، (T) ، (T') و (C) على $\left]-\infty\,;1+\sqrt{2}\,\right]$
(نأخذ: $\alpha\simeq 1,53$ ، $f(\alpha)\simeq -2,3$ ، $f(\sqrt{3})\simeq -2,1$ و $f(-\sqrt{3})\simeq -3,2$)

5) الدّالة العددية h معرّفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=f\left[\ln(x)\right]$
أ . احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}h(x)$
ب. ادرس اتجاه تغيّر الدّالة h ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

انتهى الموضوع الأول

DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

المتتالية العددية (u_n) معرّفة بِـ: $u_0=1$ و من أجل كلّ عدد طبيعي n : $u_{n+1}=\sqrt{2+\frac{1}{2}u_n^2}$

1) أ . برهن بالتراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n : $0<u_n<2$

ب. بيّن أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تماما ثمّ استنتج أنّها متقاربة.

2) المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بِـ: $v_n=u_n^2-4$

أ . بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ يُطلب حساب حدّها الأوّل.

ب. اكتب عبارة v_n بدلالة n ثمّ استنتج أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n : $u_n=\sqrt{4-3(\frac{1}{2})^n}$

جـ. احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$

3) نضع من أجل كلّ عدد طبيعي n : $S_n=u_0^2+u_1^2+\cdots+u_n^2$

أ . بيّن أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n : $S_n=\frac{n\times 2^{n+2}+3}{2^n}-2$

ب. بيّن أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n : $PGCD(2^n;3+n\times 2^{n+2})=PGCD(2^n;3)$

جـ. استنتج أنّ: $PGCD(2^n;3+n\times 2^{n+2})=1$

د. جِدْ قيمة العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $S_n=\frac{83}{8}$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

يُراد عشوائيا تشكيل لجنة تضمّ رئيسا ونائبا له من بين ثلاثة رجال H_1 ، H_2 ، H_3 و أربع نساء F_1 ، F_2 ، F_3 ، F_4

1) بيّن أنّ عدد اللّجان التي يمكن تشكيلها هو 42

2) نعتبر الحوادث الآتية: A " اللّجنة من نفس الجنس" B " اللّجنة من جنسين مختلفين"

C " H_1 هو الرئيس" E " اللّجنة لا تضم كلاّ من H_1 و F_1 "

أ . احسب $P(A)$ احتمال الحدث A ثمّ استنتج $P(B)$

ب. احسب $P(C)$ و $P(E)$

3) المتغيّر العشوائي X يرفق بكلّ لجنة عدد الرّجال فيها.

عيّن قانون احتمال X ثمّ احسب $E(X)$ أمله الرّياضياتي.

التمرين الثالث: (05 نقاط)

1) نعتبر المعادلة ذات المجهول $(x;y)$: $(E)\cdots 7x-6y=1$ ، حيث x و y عددان صحيحان.

أ . حلّ المعادلة (E) علما أنّ الثّنائية $(1;1)$ حلّ لها.

ب. تَحقَّق أنّه إذا كانت الثّنائية $(x;y)$ حلاّ للمعادلة (E) فإنّ xy عدد طبيعي غير معدوم.

2) أ . ادرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 4^n على 7

ب. بيّن أنّ العدد $4\times 2019^{2021}+2022^{2022}$ يقبل القسمة على 7

DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com

3) برهن بالتراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي غير معدوم n : $4^n \equiv 4[6]$


4) نفرض أنّ الثّنائية $(a\,;b)$ حلٌّ للمعادلة (E)

A عدد طبيعي يُكتب في نظام التّعداد ذي الأساس 4 على الشّكل: $\overline{333\cdots330}$ (عدد أرقامه $a\times b$)

أ . بيّن أنّ: $A=4^{ab}-4$

ب. تَحقّق أنّ: $A\equiv 0[6]$ ثمّ عيّن كلّ الثّنائيات $(a\,;b)$ التي من أجلها يكون A قابلا للقسمة على 42

التمرين الرابع: (07 نقاط)



I) المستوي منسوب إلى معلم متعامد متجانس.

في الشّكل المقابل (C) و (Γ) هما على التّرتيب التّمثيلان البيانيان للدّالتين العدديتين المعرّفتين على المجال $]-1\,;+\infty[$ بـ:

$x\mapsto 1+x^2$ و $x\mapsto 2x(1+x)\ln(1+x)$

(C) و (Γ) يتقاطعان في نقطة وحيدة فاصلتها α تُحقّق: $0{,}78<\alpha<0{,}79$

الدّالة العددية g معرّفة على المجال $]-1\,;+\infty[$ بـ:

$$g(x)=1+x^2-2x(1+x)\ln(1+x)$$

1) بقراءة بيانية، حدّد حسب قيم x من المجال $]-1\,;+\infty[$ وضعية (C) بالنسبة إلى (Γ)

2) استنتج حسب قيم x من المجال $]-1\,;+\infty[$ إشارة $g(x)$

II) الدّالة العددية f معرّفة على المجال $]-1\,;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{\ln(1+x)}{1+x^2}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة: $2cm$)

1) أ . احسب $\lim\limits_{x\to-1^{>}} f(x)$ و بيّن أنّ: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$

ب. فسّر النّهايتين هندسيا.

2) أ . بيّن أنّه من أجل كلّ x من المجال $]-1\,;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)(1+x^2)^2}$

ب. استنتج اتجاه تغيّر الدّالة f ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

جـ. بيّن أنّ: $f(\alpha)=\dfrac{1}{2\alpha(1+\alpha)}$ ثمّ استنتج حصرا لِـ $f(\alpha)$

د. اكتب معادلة لِـ (T) مماس المنحنى (C_f) عند المبدأ O

3) ارسُم (T) و (C_f) (نأخذ: $f(\alpha)\simeq 0{,}36$)

4) الدّالة العددية h معرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=\dfrac{\ln(1+|x|)}{1+x^2}$ و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

أ . بيّن أنّ الدّالة h زوجية.

ب. بيّن أنّ الدّالة h غير قابلة للاشتقاق عند الصفر ثمّ فسّر ذلك بيانيا.

جـ. اشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ثمّ ارسمه.

انتهى الموضوع الثاني

DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com

عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
التمرين الأول: (04 نقاط)		
1) أ. التحقق : $u_{n+1}=-\frac{11}{4}+\frac{27}{4(-4u_n+1)}$	0.25	01.25
ب. البرهان بالتراجع : $-2<u_n<-1$	0.50	
جـ. (u_n) متناقصة تماما ، (u_n) متقاربة.	0.25+0.25	
2) ا. (v_n) هندسية أساسها 3 : $v_{n+1}=v_n\times 3$	0.50	02.00
حدّها الأول $v_0=-4$	0.25	
ب. $v_n=-4\times 3^n$	0.50	
استنتاج: $u_n=\frac{3}{2+4\times 3^n}-2$	0.50	
جـ . $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=-2$	0.25	
3) أ. التَحقق: $\frac{3}{u_n+2}-2=-v_n$	0.25	0.75
ب. $S_n=(n+1)\ln 4+\frac{(n+1)n}{2}\ln 3$	0.50	
التمرين الثاني: (04 نقاط)		
1) توزيع الكريّات الاثنتي عشرة حسب الأرقام 1 ، 2 ، 3 ، 4 عدد الكريات التي تحمل الرقم 1 هو 4 ، عدد الكريات التي تحمل الرقم 2 هو 2 عدد الكريات التي تحمل الرقم 3 هو 3 ، عدد الكريات التي تحمل الرقم 4 هو 3	0.25x4	01
2) $p(A)=\frac{7}{12}$ ، $p(B)=\frac{3}{4}$ ، $p(C)=\frac{5}{12}$	3x0.75	02.25
3) مجموعة قيم المتغيّر العشوائي X هي $1,2,3,4$	0.25	0.75
$E(X)=\frac{29}{12}$	0.50	
التمرين الثالث: (05 نقاط)		
1) حلّ المعادلة (E) $k\in\mathbb{Z}$ $(x,y)=(k+1,42k+4)$	01.00	01
2) أ .تبيان أن الأعداد a ، b و c تُحقّق: $113a=3(c-42b+151)$	0.50	02.75
استنتاج أنّ: $a=3$	0.50	
ب. $a=3$ و $113a=3(c-42b+151)$ تكافئ $42b-c=38$	0.25	
$b=1$ و $c=4$ ، $N=2021$.	3x0.50	
3) أ . بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 6	0.50	01.25


n	2k	2k+1
الباقي	1	5

ب. $4+1441^n+2021^{2n}$ مضاعف للعدد 6	0.50	
جـ. $A_n\equiv 0[6]$ يعني: n فردي	0.25	

DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
التمرين الرابع: (07 نقاط)		
I) 1) دراسة تغيّرات الدّالة g $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=3$ $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$	0.25+0.25	01.50
$g'(x)=(x^2+2x-3)e^x$	0.25	
اشارة $g'(x)$: $g'(x)>0$ على $]-\infty;-3[$ و $]1;+\infty[$ و $g'(x)<0$	0.25	
على $]-3;1[$ و $g'(x)=0$ من أجل $x=-3$ أو $x=1$		
g متزايدة تماما على كلّ من $]-\infty;-3]$ و $[1;+\infty[$ ومتناقصة تماما على $[-3;1]$	0.25	
جدول التغيّرات.	0.25	
2) أ . g مستمرة و متزايدة تماما ، $g(1.53)\times g(1,54)<0$	0.50	01.00
ب. $g(0)=0$	0.25	
إشارة $g(x)$: $g(x)>0$ على $]0;+\infty[$ و $]-\infty;0[$ و $g(x)<0$ على $]0;\alpha[$	0.25	
$g(x)=0$ لما $x=0$ أو $x=\alpha$		
II) 1) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$	0.25+0.25	0.50
2) أ . تبيان أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x : $f'(x)=g(x)$	0.25	0.75
ب. استنتاج اتجاه تغير الدالة f	0.25	
جـ. جدول تغيّرات الدّالة f	0.25	
3) أ . تبيان أنّ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=3x+1$ مقارب مائل لـ (C) عند $-\infty$	0.25	01.25
ب. وضعية (C) بالنّسبة إلى (Δ) : (C) أعلى (Δ) على $]-\infty;1-\sqrt{2}[$ و $]1+\sqrt{2};+\infty[$ و (C) أسفل (Δ) على $]1-\sqrt{2};1+\sqrt{2}[$	0.25	
(C) يقطع (Δ) عند $H(1-\sqrt{2};-3\sqrt{2}+4)$ و $H'(1+\sqrt{2};3\sqrt{2}+4)$		
جـ. تبيان أنّ (C) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β	0.25	
تُحقّق: $2,03<\beta<2,04$		
د. تبيان أنّ (C) يقبل مماسين (T) و (T') موازيين لِـ (Δ)	0.50	

DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
4) رسم (Δ) ، (T) ، (T') رسم (C) على $\left]-\infty\,;\,1+\sqrt{2}\right[$ 	0.25x3 0.25	01.00
5) أ . $\lim\limits_{x \to +\infty} h(x) = +\infty$ و $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} 0} h(x) = -\infty$ **ب.** h متزايدة تماما على كلّ من $\left[1\,;0\right[$ و $\left]e^{\alpha}\,;+\infty\right[$ ومتناقصة تماما على $\left]1\,;e^{\alpha}\right[$ جدول تغيّراتها. x: 0 | 1 | e^{α} | $+\infty$ $h'(x)$: + 0 − 0 + $h(x)$: $-\infty$ ↗ $f(0)$ ↘ $f(\alpha)$ ↗ $+\infty$	0.25+0.25 0.25 0.25	01.00

DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
التمرين الأول: (04 نقاط)		
1) أ . البرهان بالتراجع : $0 < u_n < 2$	0.50	01.25
ب. (u_n) متزايدة تماما ، (u_n) متقاربة.	0.25+0.50	
2) أ . (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ، $v_0 = -3$	0.25+0.25	01.25
ب. $v_n = -3(\frac{1}{2})^n$ ، $u_n = \sqrt{4-3(\frac{1}{2})^n}$	0.25+0.25	
جـ. $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2$	0.25	
3) أ . تبيان أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n : $S_n = \frac{n\times 2^{n+2}+3}{2^n} - 2$	0.50	01.50
ب. تبيان أنّ : $PGCD(2^n ; 3+n\times 2^{n+2}) = PGCD(2^n ; 3)$	0.25	
جـ. استنتاج أنّ: $PGCD(2^n ; 3+n\times 2^{n+2}) = 1$	0.25	
د. إيجِادْ قيمة العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $S_n = \frac{83}{8}$	0.25	
يعني $S_n = \frac{83}{8}$ $99\times 2^n = 8(3+n\times 2^{n+2})$	0.25	
نجد: $n = 3$		
التمرين الثاني: (04 نقاط)		
1) عدد اللّجان التي يمكن تشكيلها هو 42	0.50	0.50
2) أ . $P(A) = \frac{18}{42} = \frac{3}{7}$ و $P(B) = 1 - P(A) = \frac{4}{7}$	0.50+0.50	02
ب. $P(C) = \frac{6}{42} = \frac{1}{7}$ و $P(E) = \frac{20}{42} = \frac{10}{21}$	0.50+0.50	
3) قانون احتمال		
مجموعة قيم X هي: $\{0;1;2\}$	0.25	01.50

x_i	0	1	2
$P(X=x_i)$	$\frac{12}{42}$	$\frac{24}{42}$	$\frac{6}{42}$



	0.75	
أمله الرّياضياتي: $E(X) = \frac{6}{7}$	0.50	

DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
التمرين الثالث: (05 نقاط)		
1) أ . حلّ المعادلة (E): $(x\,;y)=(6k+1,7k+1)\ k\in\mathbb{Z}$	0.75	01.25
ب. التحقق أنّ xy عدد طبيعي غير معدوم يكفي أن نثبت $(6k+1)(7k+1)>0$	0.50	
2) أ . بواقي قسمة 4^n على 7 (جدول: n | 3k | 3k+1 | 3k+2 ؛ بواقي قسمة 4^n على 7 | 1 | 4 | 2)	0.75	01.25
ب. $4\times 2019^{2021}+2022^{2022}$ يقبل القسمة على 7	0.50	
3) البرهان بالتراجع $4^n\equiv 4[6]$	0.50	0.50
4) أ. تبيان أنّ: $A=4^{ab}-4$	0.50	02
$A=0\times 4^0+3\times 4^1+\cdots+3\times 4^{ab-1}=3\times(4^1+\cdots+4^{ab-1})$	0.50	
ب. التحقّق أنّ: $A\equiv 0[6]$ ($4^n\equiv 4[6]$ و $ab\in\mathbb{N}^*$)		
تعيين الثّنائيات $(a\,;b)$ التي من أجلها يكون A قابلا للقسمة على 42		
$A\equiv 0[42]$ يعني $A\equiv 0[7]$ و منه $4^{k+1}\equiv 4[7]$ أي $k=3h\ h\in\mathbb{N}$	01	
و منه : $(a\,;b)=(18p+1;21p+1)\ p\in\mathbb{N}$		
التمرين الرابع: (07 نقاط)		
I 1) (C) أعلى (Γ) على $]-1;\alpha[$ و (C) أسفل (Γ) على $]\alpha;+\infty[$	0.75	0.75
(C) يتقاطعان (Γ) في $H(\alpha\,;\alpha^2+1)$		
2) إشارة $g(x)$	0.75	0.75
$g(x)>0$ على $]-1;\alpha[$ و $g(x)<0$ على $]\alpha;+\infty[$		
$g(x)=0$ لما $x=\alpha$		
II 1) أ . $\lim\limits_{x\to-1^{>}} f(x)=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$	0.25+0.25	0.75
ب. $x=-1$ و $y=0$ معادلتا مستقيمان مقاربان للمنحني (C_f)	0.25	
2) أ . تبيان أنّ $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)(1+x^2)^2}$	0.50	01.50
ب. f متزايدة تماما على $]-1\,;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha\,;+\infty[$	0.50	
جدول تغيّراتها الدالة f .	0.50	

x	-1		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$ ‖	↗	$f(\alpha)$	↘	0

DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
جـ. $f(\alpha)=\dfrac{1}{2\alpha(1+\alpha)}$ $0.35<f(\alpha)<0.36$ **د.** معادلة لِـ (T) : $y=x$	0.25 0.25 0.25	0.75
5) رسم (T) رسم (C_f) 	0.25 0.50	0.75
أ . الدّالة h زوجية. **ب.** $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}\dfrac{h(x)}{x}=1$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}0}\dfrac{h(x)}{x}=-1$ ، h غير قابلة للاشتقاق من أجل الصفر التفسير: وجود نصفي مماسين في المبدأ **جـ.** (C_h) ينطبق على (C_f) على $]0;+\infty[$ ثمّ نتم الرسم بالتناظر بالنسبة الى حامل محور التراتيب . رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) 	0.25 0.25+0.25 0.25 0.25 0.50	01.75

DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com