الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
دورة: 2020

الشعبة: رياضيات

اختبار في مادة: الرياضيات — المدة: 04 سا و 30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأوّل: (04 نقاط)

الدالة العددية f معرّفة على المجال $[1;4]$ بـ: $f(x)=\dfrac{4x+4}{9-x}$.

1) أ . ادرس اتّجاه تغيّر الدالة f على المجال $[1;4]$.

ب. أثبت أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[1;4]$ فإن: $f(x)\in[1;4]$.

2) المتتالية العددية (u_n) معرّفة بحدها الأول u_0 حيث: $u_0=2$ و من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.

أ . برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $1<u_n<4$.

ب. ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) و استنتج أنّها متقاربة.

3) المتتالية العددية (v_n) معرّفة من أجل كل عدد طبيعي n، كما يلي: $v_n=\dfrac{u_n-1}{u_n-4}$.

أ . برهن أنّ المتتالية (v_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدّها الأول v_0 .

ب. عبّر عن الحد العام v_n بدلالة n ، ثمّ استنتج الحد العام u_n بدلالة n واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.


4) المجموع S_n معرف بـ: $S_n=v_0+8v_1+8^2v_2+\ldots+8^nv_n$. احسب S_n بدلالة n.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

صندوق به 5 كريات بيضاء و 3 كريات حمراء (كل الكريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس).

نسحب من الصندوق كرية واحدة حيث: إذا ظهرت كرية حمراء نُعيدها إلى الصندوق ونُضيف له كرية بيضاء وإذا ظهرت كرية بيضاء نُعيدها إلى الصندوق ونُضيف له كرية حمراء، ثم نُكرّر العملية مرّة ثانية.

1) انقل شجرة الاحتمالات المقابلة التي تُنمذج هذه التجربة ثم أكملها.



2) بيّن أنّ احتمال أن يوجد في الصندوق 7 كريات بيضاء هو $\dfrac{1}{8}$.

3) احسب احتمال أن يوجد في الصندوق 4 كريات حمراء على الأقل.

4) ليكن X المتغير العشوائي الذي يأخذ كقيمة عدد الكريات البيضاء الموجودة في الصندوق بعد العملية الثانية.

أ . برّر أنّ قيم المتغير العشوائي X هي: 5، 6 و 7.

ب. عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ، ثمّ احسب $E(X)$ أمله الرياضياتي.

DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com

التمرين الثالث: (05 نقاط)

ليكن n عددا طبيعيا أكبر تماما من 1.

نعتبر الأعداد الطبيعية a ، b و c حيث : $a=4n+1$ ، $b=6n+1$ و $c=3n+2$.

1) أثبت أنّ العددين a و b أوليان فيما بينهما.

2) نسمي α القاسم المشترك الأكبر للعددين a و c .

أثبت أنّ α يقسم 5 ، ثمّ عين الأعداد الطبيعية n بحيث يكون: $\alpha=5$.

3) نسمي β القاسم المشترك الأكبر للعددين a و bc .

أ . أثبت أنّ α يقسم β .

ب. أثبت أنّ العددين β و b أوليان فيما بينهما ثمّ استنتج أنّ: $\alpha=\beta$.

4) نعتبر العددين الطبيعيين A و B حيث: $A=4n^2-3n-1$ و $B=18n^3-3n^2-13n-2$.

أ . بيّن أنّ كلا من العددين A و B مضاعف للعدد الطبيعي $(n-1)$.

ب. نضع: $d=PGCD(A;B)$. عبّر حسب قيم α عن d بدلالة n . (لاحظ أنّ: $bc=18n^2+15n+2$)

التمرين الرابع: (07 نقاط)

I) الدّالتان العدديتان g و h معرفتان على المجال $]-\infty;0]$ كما يلي: $g(x)=-2e^x$ و $h(x)=x(e^x+1)$.

حدّد إشارة كل من $h(x)$ و $g(x)$ على المجال $]-\infty;0]$.

II) الدالة العددية f معرّفة على المجال $]-\infty;0]$ بِـ: $f(x)=(x-3)e^x+\frac{1}{2}x^2$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ . بيّن أنّه من أجل كل x من المجال $]-\infty;0]$: $f'(x)=h(x)+g(x)$

ب. استنتج اتجاه تغيّر الدالة f على المجال $]-\infty;0]$.

2) احسب $f(0)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ثمّ شكّل جدول تغيّرات الدالة f .

3) بيّن أنّ المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-\infty;0]$ ثمّ تَحقّق أنّ : $-1.5<\alpha<-1.4$.

4) (P) هو التمثيل البياني للدالة: $x\mapsto\frac{1}{2}x^2$ على المجال $]-\infty;0]$.

أ . احسب $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-\frac{1}{2}x^2\right]$ ثمّ فسّر النتيجة بيانيا.

ب. ادرس الوضع النسبي للمنحنيين (P) و (C_f).

جـ. أنشئ (P) ثم المنحنى (C_f) على المجال $]-\infty;0]$.

5) ليكن m وسيطا حقيقيا، ناقش بيانيا وحسب قيم m عدد حلول المعادلة: $|f(x)|=e^m$ في $]-\infty;0]$.

انتهى الموضوع الأول

DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

1) حل المعادلة: $3x-5y=2$ ذات المجهول $(x;y)$ حيث x و y عددان صحيحان.

2) أ. ادرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الإقليدية للعدد الطبيعي 9^n على 7.

ب. ادرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الإقليدية للعدد الطبيعي 4^n على11.

3) عيّن الأعداد الطبيعية n بحيث يكون: $14\times 4^n+11\times 9^n-4\equiv 0[77]$.

4) ليكن n عددا طبيعيا غير معدوم، نضع: $u_n=3\times 4^n+4\times 9^n$ و $S_n=u_1+u_2+u_3+...+u_{15n}$

أ . عبّر عن S_n بدلالة n.

ب. أثبت أنّ S_n مضاعف للعدد 77.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

يحتوي صندوق على كريات متماثلة منها: n كرية بيضاء تحمل العدد π (n عدد طبيعي و $n\geq 2$)

و 4 كريات حمراء تحمل الأعداد $\frac{\pi}{2}$ ، $\frac{\pi}{2}$ ، $\frac{\pi}{3}$ و π و كريتين خضراوين تحملان العددين $\frac{\pi}{2}$ و $\frac{\pi}{3}$.

نسحب عشوائيا كريتين في آن واحد من هذا الصندوق.

1) أ . احسب احتمال كل من A و B حيث:

A : "سحب كريتين من نفس اللون" و B : "سحب كريتين تحملان نفس العدد علما أنهما من نفس اللون"

ب. عيّن العدد الطبيعي n حتّى يكون: $P(A)=\frac{17}{55}$.

2) نفرض في ما يلي: $n=5$ و نسمي α و β العددين الظاهرين على الكريتين المسحوبتين .

نعتبر X المتغيّر العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة سحب العدد: $\cos(\alpha)\cos(\beta)$

أ . برّر أنّ قيم المتغيّر العشوائي X هي: $-\frac{1}{2}$ ، 0 ، $\frac{1}{4}$ ، 1.

ب. بيّن أنّ: $P(X=0)=\frac{27}{55}$.

جـ. عيّن قانون احتمال المتغيّر العشوائي X واحسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

التمرين الثالث: (05 نقاط)

المتتاليتان العدديتان (u_n) و (v_n) معرفتان على $\mathbb{N}$ بـ:

$$\begin{cases} u_0=-1 \\ u_{n+1}=3\alpha u_n+(1-3\alpha)v_n \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} v_0=3 \\ v_{n+1}=3\alpha v_n+(1-3\alpha)u_n \end{cases} \quad (\alpha \text{ عدد حقيقي})$$

المتتالية العددية (w_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ : $w_n=v_n-u_n$

DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com

1) أ . احسب w_0 ثمّ احسب w_1 بدلالة α.

ب. بيّن أنّ (w_n) متتالية هندسية أساسها $(6\alpha-1)$.

جـ. اكتب عبارة w_n بدلالة n و α ، ثمّ عيّن قيم α حتّى تكون: $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$.

نفرض في كلّ ما يلي: $\frac{1}{6} < \alpha < \frac{1}{3}$

2) أ . أثبت أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تماما و أنّ (v_n) متناقصة تماما.

ب. استنتج أنّ (u_n) و (v_n) متقاربتان نحو نفس النهاية ℓ.

3) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n + v_n = 2$ ، واستنتج قيمة ℓ.

4) احسب بدلالة α المجموع S حيث: $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{2020}$.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

الدالة العددية f معرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \ln\left(\sqrt{9x^2+1} + 3x\right)$.

ليكن (C_f) المنحنى البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1) أ . احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثمّ بيّن أنّ : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

ب. بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $f'(x) = \frac{3}{\sqrt{9x^2+1}}$.

جـ. استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

2) نعتبر الدالة g المعرّفة على المجال $[0;+\infty[$ كما يلي: $g(x) = f(x) - x$.

أ . بيّن أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$.

ب. بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0;+\infty[$: $g'(x) = \frac{-9x^2+8}{\left(\sqrt{9x^2+1}\right)\left(3+\sqrt{9x^2+1}\right)}$

جـ. ادرس اتجاه تغيّر الدالة g على المجال $[0;+\infty[$ ثمّ شكّل جدول تغيّراتها. (نأخذ $g\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right) \approx 0{,}8$)

3) أ . بيّن أنّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $\left[\frac{2\sqrt{2}}{3};+\infty\right[$ ثمّ تَحقّق أنّ: $2.83 < \alpha < 2.84$.

ب. استنتج إشارة $g(x)$ على $[0;+\infty[$.

جـ. حدّد الوضع النسبي للمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$ و المنحنى (C_f) على المجال $[0;+\infty[$.

4) نعتبر الدالة k المعرّفة على $[0;+\infty[$ بـ : $k(x) = \ln(6x)$ و ليكن (γ) منحنيها البياني في المعلم السابق.

أ . بيّن أنّ (γ) هو صورة منحنى الدالة: $x \mapsto \ln x$ بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيينه.



ب. احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-k(x)\right]$ ثمّ فسّر النتيجة بيانيا.

5) أ . بيّن الدالة f فردية.

ب. انشئ كلا من (Δ) ، (γ) و (C_f) على المجال $[0;+\infty[$ ثمّ استنتج انشاء المنحنى (C_f) على $\mathbb{R}$.

انتهى الموضوع الثاني


DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com

عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
التّمرين الأول: (04 نقاط)		
1) أ. لدينا: $f'(x)=\frac{40}{(9-x)^2}$ ومنه f متزايدة تمامًا على $[1;4]$.	2×0.25	0.75
ب. من أجل: $x\in[1;4]$ يكون $f(x)\in[f(1);f(4)]$	0.25	
2) أ. البرهان بالتّراجع.	2×0.25	1.25
ب. لدينا : $u_{n+1}-u_n=\frac{(u_n-1)(u_n-4)}{9-u_n}$ ونجد أنّ (u_n) متناقصة تمامًا.	2×0.25	
الاستنتاج: (u_n) متناقصة تمامًا و محدودة من الأسفل فهي متقاربة.	0.25	
3) أ. لدينا: $v_{n+1}=\frac{5}{8}v_n$ ومنه (v_n) هندسية أساسها $\frac{5}{8}$ و $v_0=-\frac{1}{2}$.	2×0.25	1.25
ب. عبارة v_n و عبارة u_n : $v_n=\frac{-1}{2}\left(\frac{5}{8}\right)^n$ ، $u_n=\frac{4\left(\frac{5}{8}\right)^n+2}{\left(\frac{5}{8}\right)^n+2}$.	2×0.25	
حساب: $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=1$	0.25	
4). نجد: $S_n=\frac{-1}{8}\left(5^{n+1}-1\right)$	0.75	0.75
التّمرين الثاني: (04 نقاط)		
1) شجرة الاحتمالات: 	0.25x5	1.25
2) احتمال أن يوجد في الصّندوق 7 كريات بيضاء: $\frac{3}{8}\times\frac{3}{9}=\frac{1}{8}$	0.5	0.5
3) احتمال أن يوجد في الصّندوق 4 كريات حمراء على الأقل: $1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$	0.75	0.75
4) أ . تبرير أنّ قيّم المتغير العشوائي X هي: 5 ، 6 و 7	0.5	1.50
ب. تعريف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي. 	0.75	
$E(X)=\frac{52}{9}$	0.25	
التّمرين الثالث: (05 نقاط)		
1) لدينا: $3a-2b=1$ ، إذن حسب بيزو a و b أوليان فيما بينهما	0.75	0.75
2) لدينا: ($\alpha\mid a$ و $\alpha\mid c$) ومنه: $\alpha\mid(4c-3a)$ أي $\alpha\mid 5$.	0.75	1.5
$\alpha=5$ معناه ($a\equiv 0[5]$ و $c\equiv 0[5]$) أي $n\equiv 1[5]$ ومنه $n=5k+1$ ، $k\in\mathbb{N}$	0.75	

DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com

عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
3) أ . إثبات أنّ α يقسم β . لدينا ($\alpha \mid a$ و $\alpha \mid c$) ومنه ($\alpha \mid bc$ و $\alpha \mid a$) وبالتّالي $\alpha \mid p\gcd(a,bc)$ أي $\alpha \mid \beta$ **ب.** إثبات أنّ β و b أوليان فيما بينهما: نفرض أنّ d قاسم مشترك لـ β و b ($d \mid b$ و $d \mid \beta$) ومنه($\alpha \mid b$ و $d \mid a$) وبالتّالي $d \mid p\gcd(a,b)$ أي: $d=1$ **ملاحظة:** يمكن استعمال مبرهنة بيزو استنتاج أنّ: $\alpha = \beta$: ($\beta \mid bc$ و $\beta \wedge b = 1$) ومنه($\beta \mid c$ و $\beta \mid a$) وعليه $\beta \mid \alpha$ ($\beta \mid \alpha$ و $\alpha \mid \beta$) معناه $\alpha = \beta$	0.5 0.5 0.5	1.5
4) أ . لدينا : $A=(n-1)(4n+1)$ و $B=(n-1)bc$ إذن كلاّ من A و B مضاعف لـ $(n-1)$ **ب.** لدينا $d=PGCD(A,B)$ ومنه $d=(n-1)PGCD(a,bc)$ ومنه $d=(n-1)\beta=(n-1)\alpha$ وعليه من أجل $\alpha=1$: $d=n-1$ ، من أجل $\alpha=5$: $d=5n-5$	0.5 0.25x3	1.25
التّمرين الرابع : (07 نقاط)		
I) من أجل $x \in]-\infty;0]$: $h(x) \le 0$ و $g(x)<0$	0.25×2	0.5
II) 1) أ. من أجل كل x من $]-\infty;0]$: $f'(x)=x(e^x+1)+(-2e^x)=h(x)+g(x)$ ب. f متناقصة تمامًا على المجال $]-\infty;0]$.	0.5+0.25 0.5	1.25
2) نجد: $f(0)=-3$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(xe^x-3e^x+\frac{1}{2}x^2)=+\infty$ جدول التّغيرات	0.25×2 0.5	1
3) f مستمرة ومتناقصة تمامًا على المجال $]-\infty;0]$ وتأخذ قيمها في $[-3;+\infty[$ ومنه $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $]-\infty;0]$. التّحقق أن $\alpha \in]-1,5;-1,4[$: $f(-1,5)\simeq 0,121$ ، $f(-1,4)\simeq -0,105$	0.75 0.25	1
4) أ . نجد: $\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)-\frac{1}{2}x^2)=0$ ، إذن: (P) منحنى مقارب لـ (C_f) بجوار $-\infty$ **ب.** من أجل كل x من $]-\infty;0]$: $f(x)-\frac{1}{2}x^2=(x-3)e^x$ ومنه $f(x)-\frac{1}{2}x^2<0$ وبالتالي (C_f) أسفل (P) على المجال $]-\infty;0]$	0.5×2 0.5+0.25	1.75

DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com

عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل)	العلامة	
	مجزأة	مجموعة
جـ. إنشاء (P) و (C_f) : 	**0.25** **0.5**	**0.75**
5) المناقشة البيانية وحسب قيم m عدد حلول المعادلة: $\lvert f(x)\rvert = e^m$ في $]-\infty\,;0]$ من أجل $m \leq \ln 3$ المعادلة تقبل حلّين مختلفين. من أجل $m > \ln 3$ المعادلة تقبل حلّ واحد	**0.25×3**	**0.75**

DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com

عناصر الإجابة (الموضوع الثّاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
التّمرين الأول: (04 نقاط)		
1) $(x;y)=(5k-1;3k-1)$ حيث $k\in Z$	**1**	**1**
2) أ) بواقي القسمة الاقليدية للعدد 9^n على 7 $(k\in\mathbb{N})$ ب) بواقي القسمة الاقليدية للعدد 4^n على 11 $(k'\in\mathbb{N})$	**0.5** **0.5**	**1**
3) بما أن 7 و 11 أوليان فيما بينهما فإنّ: $\begin{cases}14\times4^n+11\times9^n-4\equiv0[7]\\14\times4^n+11\times9^n-4\equiv0[11]\end{cases}$ يعني $\begin{cases}11\times9^n-4\equiv0[7]\\14\times4^n-4\equiv0[11]\end{cases}$ ومنه $\begin{cases}9^n\equiv1[7]\\4^n\equiv5[7]\end{cases}$ أي: $n=3\alpha=5\beta+2$ ومنه $3\alpha-5\beta=2$ (α ، β عددان طبيعيان) ومنه $n=15p-3$. $(\alpha;\beta)=(5p-1;3p-1)$ حيث $(p\in\mathbb{N}^*)$	**0.25×3** **0.25**	**1**
4) أ. $S_n=4\left(4^{15n}-1\right)+\frac{9}{2}\left(9^{15n}-1\right)$. **ب.** إثبات أنّ S_n مضاعف للعدد 77 . $S_n\equiv0[77]$ يعني $2S_n\equiv0[77]$ أي $8\left(4^{15n}-1\right)+9\left(9^{15n}-1\right)_n\equiv0[77]$ أي $\begin{cases}8\left(4^{15n}-1\right)+9\left(9^{15n}-1\right)\equiv0[7]\\8\left(4^{15n}-1\right)+9\left(9^{15n}-1\right)\equiv0[11]\end{cases}$ أي $\begin{cases}4^{15n}-1\equiv0[7]\\9^{15n}-1\equiv0[11]\end{cases}$ أي $\begin{cases}\left(4^3\right)^{5n}-1\equiv0[7]\\\left(9^5\right)^{3n}-1\equiv0[11]\end{cases}$ أي $\begin{cases}(1)^{5n}-1\equiv0[7]\\(1)^{3n}-1\equiv0[11]\end{cases}$ محققة دوما	**0.5** **0.5**	**1**
التّمرين الثاني: (04 نقاط)		
1) أ . $P(A)=\frac{n^2-n+14}{(n+5)(n+6)}$ ، $P(B)=\frac{n^2-n+2}{n^2-n+14}$ **ب.** $P(A)=\frac{17}{55}$ يعني $n=5$	**0.5×2** **0.5**	**1.5**
2) أ . بعد الحساب نجد قيم المتغيّر العشوائي X $-\frac{1}{2}$ ، 0 ، $\frac{1}{4}$ ، 1 . **ب.** $P(X=0)=\frac{C_3^1\times C_8^1+C_3^2}{C_{11}^2}=\frac{27}{55}$	**0.5** **0.5**	**1**

DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com

عناصر الإجابة (الموضوع الثّاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
جـ. قانون احتمال X : $E(X)=\frac{37}{220}$	1 0.5	1.5
التّمرين الثالث: (05 نقاط)		
1) أ . $w_0=4$ ، $w_1=4(6\alpha-1)$	2×0.25	2
ب. (w_n) : $w_{n+1}=(6\alpha-1)w_n$ متتالية هندسية أساسها $(6\alpha-1)$.	0.5	
جـ. $w_n=4(6\alpha-1)^n$.	0.5	
$\lim\limits_{n\to+\infty} w_n=0$ يعني $-1<6\alpha-1\leq 1$ ومنه $0<\alpha\leq\frac{1}{3}$.	0.5	
2) أ . $u_{n+1}-u_n=-(3\alpha-1)w_n$ ومنه المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا .	0.5	1.75
$v_{n+1}-v_n=(3\alpha-1)w_n$ ومنه المتتالية (v_n) متناقصة تمامًا.	0.5	
ب. بما أن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا و المتتالية (v_n) متناقصة تمامًا و $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n-u_n)=0$	0.5	
فإنهما متجاورتان وبالتالي متقاربتان نحو نفس النّهاية ℓ .	0.25	
3) لدينا $u_{n+1}-u_n=-(3\alpha-1)w_n$ و $v_{n+1}-v_n=(3\alpha-1)w_n$ إذا	0.5	0.75
$u_{n+1}+v_{n+1}=u_n+v_n=u_0+v_0=2$		
استنتاج قيمة ℓ : $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n+v_n)=2$ ومنه $\ell=1$	0.25	
4) نجد: $S=2021-\frac{(6\alpha-1)^{2021}-1}{3\alpha-1}$.	0.5	0.5
التّمرين الرابع: (07 نقاط)		
1) أ . $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$. (مع التّبرير)	2×0.25	1.75
اثبات أنّ : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$.	0.25	
ب. من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=\frac{3}{\sqrt{9x^2+1}}$.	0.5	
جـ. من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)>0$ ، إذن f متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.	0.25	
جدول تغيّرات الدالة f .	0.25	
2) أ . تبيان أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$	0.5	1
ب. تبيان أنّ من أجل كل $x\geq 0$ ، $g'(x)=\frac{-9x^2+8}{\left(\sqrt{9x^2+1}\right)\left(3+\sqrt{9x^2+1}\right)}$	0.5	

DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com

عناصر الإجابة (الموضوع الثّاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
جـ. إشارة $g'(x)$ هي من إشارة $\left(-9x^2+8\right)$. g متزايدة تمامًا على $\left[0;\frac{2\sqrt{2}}{3}\right]$ و متناقصة تمامًا على المجال $\left[\frac{2\sqrt{2}}{3};+\infty\right[$ جدول تغيّرات الدّالة g	0.25 0.25 0.25	0.75
3) أ. g مستمرة ورتيبة تمامًا على $\left[\frac{2\sqrt{2}}{3};+\infty\right[$ وتأخذ قيمها في المجال $\left]-\infty;g\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)\right]$. التّحقق من أنّ $2,83<\alpha<2,84$: $g(0.84)\approx -0.005$ و $g(0.83)\approx 0.001$ **ب.** استنتاج إشارة $g(x)$: **جـ.** الوضع النّسبي : (C_f) فوق (Δ) على المجال $]0;\alpha[$ (C_f) تحت (Δ) على المجال $]\alpha;+\infty[$ (C_f) و (Δ) متقاطعان في نقطتين فاصلتاهما 0 و α	0.5 0.25 0.25 0.5	1.5
4) أ. لدينا $k(x)=\ln 6+\ln x$ إذن (γ) هو صورة المنحني الممثل للدّالة $x\mapsto \ln x$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}(0;\ln 6)$. **ب.** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-k(x)\right)=0$. نستنتج أنّ (γ) منحني مقارب لـ (C_f) بجوار $+\infty$.	0.25 2×0.25	0.75
5. أ. إثبات أنّ الدّالة f فردية. **ب.** رسم كل من (γ)،على المجال $]0;+\infty[$ و رسم (C_f) و (Δ) على المجال $[0;+\infty[$. استنتاج الرسم للمنحني (C_f) على $\mathbb{R}$.	0.25 3×0.25 0.25	1.25

DZPEN.COM | موقع القلم الجزائري | www.dzpen.com