



**الجزء الأول، (12 نقطة)**  
**التمرين الأول، (03 نقاط)**

- 1 أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 5474 و 7038.
- 2 اكتب العبارة  $A = 3\sqrt{252} - 2\sqrt{112} + \sqrt{7}$  على الشكل  $a\sqrt{7}$  حيث  $a$  عدد طبيعي يطلب تعيينه.
- 3 اكتب  $\frac{7+\sqrt{32}}{\sqrt{7}}$  على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.

**التمرين الثاني، (03 نقاط)**

اليك العبارة  $B$  الآتية:  $B = (3x - 2)^2 - (x + 1)^2$

- 1 تحقق بالنشر أن:  $B = 8x^2 - 14x + 3$ .
- 2 حل المعادلة الآتية:  $(2x - 3)(4x - 1) = 0$
- 3 حل المتراجحة:  $B \leq 8x^2 + 4$  ثم مثل حلولها بيانياً.

**التمرين الثالث، (03 نقاط) (وحدة الطول هي السنتيمتر: cm)**

الشكل المقابل غير مرسوم بأبعاده الحقيقية (وحدة الطول هي السنتيمتر: cm)

$$OR = 28 \quad , \quad OS = 36 \quad , \quad OV = 21 \quad , \quad OT = 27$$

1 بين أن المستقيمين  $(RV)$  و  $(TS)$  متوازيان.

2 احسب الطول  $TS$  علماً أن  $RV = 35 \text{ cm}$ .

3 احسب  $\sin \widehat{STO}$  ثم استنتج قياس الزاوية  $\widehat{STO}$ .


**التمرين الرابع، (03 نقاط) (وحدة الطول هي السنتيمتر: cm)**

المستوي منسوب الى معلم متعامد ومتجانس مبدؤه  $O$ . (الوحدة هي  $1 \text{ cm}$ ).

1 علم النقط:  $A(0;4)$  ;  $B(-3;1)$  ;  $C(3;1)$ .

2 احسب مركبتي الشعاع  $\overline{AB}$  ، ثم استنتج الطول  $AB$ .

3 أنشئ النقطة  $D$  حيث  $\overline{AB} = \overline{CD}$  (يطلب تعيين احداثيتها بيانياً).



## الجزء الأول (12 نقطة)

## التمرين الأول (03 نقاط)

① القاسم المشترك الأكبر للعددين 5474 و 7038 هو 782.

$$7038 = 5474 \times 1 + 1564$$

$$5474 = 1564 \times 3 + 782$$

$$1564 = 782 \times 2 + 0$$

$$\text{PGCD}(7038; 5474) = 782 \text{ ومنه:}$$

② كتابة العبارة  $A = 3\sqrt{252} - 2\sqrt{112} + \sqrt{7}$  على الشكل  $a\sqrt{7}$ .

$$A = 3\sqrt{252} - 2\sqrt{112} + \sqrt{7} = 3\sqrt{36 \times 7} - 2\sqrt{16 \times 7} + \sqrt{7} = 3\sqrt{36} \times \sqrt{7} - 2\sqrt{16} \times \sqrt{7} + \sqrt{7}$$

$$A = 3 \times 6\sqrt{7} - 2 \times 4\sqrt{7} + \sqrt{7} = 18\sqrt{7} - 8\sqrt{7} + \sqrt{7} = (18 - 8 + 1)\sqrt{7}$$

$$A = 11\sqrt{7}$$

③ كتابة  $\frac{7 + \sqrt{32}}{\sqrt{7}}$  على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.

$$\frac{7 + \sqrt{32}}{\sqrt{7}} = \frac{(7 + \sqrt{32})\sqrt{7}}{\sqrt{7} \times \sqrt{7}} = \frac{7\sqrt{7} + \sqrt{32}\sqrt{7}}{7} = \frac{7\sqrt{7} + \sqrt{224}}{7}$$

## التمرين الثاني (03 نقاط)

① التحقق بالنشر أن:  $B = 8x^2 - 14x + 3$

$$B = (3x - 2)^2 - (x + 1)^2$$

$$B = ((3x)^2 - 2 \times 3x \times 2 + 2^2) - (x^2 + 2 \times x \times 1 + 1^2)$$

$$B = (9x^2 - 12x + 4) - (x^2 + 2x + 1)$$

$$B = 9x^2 - 6x + 4 - x^2 - 2x - 1$$

$$B = 8x^2 - 14x + 3$$

② حل المعادلة:  $(2x - 3)(4x - 1) = 0$

$$(2x - 3)(4x - 1) = 0$$

$$\begin{cases} 2x - 3 = 0 \\ 4x - 1 = 0 \end{cases} \dots \dots \dots \begin{cases} 2x = 3 \\ 4x = 1 \end{cases} \dots \dots \dots \begin{cases} x = \frac{3}{2} \\ x = \frac{1}{4} \end{cases}$$

ومنه للمعادلة حلين هما:  $\frac{3}{2}$  و  $\frac{1}{4}$

③ حل المتراجحة:  $B \leq 8x^2 + 4$  ثم تمثل حلولها بيانيا.

$$B \leq 8x^2 + 4$$

$$(3x - 2)^2 - (x + 1)^2 \leq 8x^2 + 4$$

$$8x^2 - 14x + 3 \leq 8x^2 + 4$$

$$8x^2 - 8x^2 - 14x \leq 4 - 3$$

$$-14x \leq -1$$

$$x \geq \frac{-1}{-14} \dots \dots \dots x \geq \frac{1}{14}$$

ومنه حلول المتراجحة هي قيم  $x$  الأكبر من او تساوي  $\frac{1}{14}$

تمثيل حلول المتراجحة على مستقيم مدرج

## التمرين الثالث (03 نقاط)

1 تبيان أن  $(ST) // (RV)$

لدينا النقاط  $R, O, S$  والنقاط  $V, O, T$  في استقامة وبنفس الترتيب

ومن جهة أخرى:  $\frac{OR}{OS} = \frac{OV}{OT} = \frac{28}{36} = \frac{21}{27}$  أي:  $28 \times 27 = 36 \times 21$  وبالتالي:  $\frac{OR}{OS} = \frac{OV}{OT}$

حسب الخاصية العكسية لخاصية طالس نستنتج أن:  $(ST) // (RV)$

2 حساب الطول  $TS$

لدينا:  $(ST) // (RV)$  والنقاط  $R, O, S$  والنقاط  $V, O, T$  في استقامة وبنفس الترتيب ومنه المثلثان  $ROV$  و  $TOS$  في

وضعية طالس:  $\frac{OR}{OS} = \frac{OV}{OT} = \frac{RV}{TS}$  نعوض في تناسب:  $\frac{OV}{OT} = \frac{RV}{TS}$  فنجد:  $\frac{21}{27} = \frac{35}{TS}$  أي:  $TS = \frac{27 \times 35}{21}$  ومنه:  $TS = 35$

ومنه الطول  $TS$  يساوي  $45cm$ . **ملاحظة:** يمكن أيضا استعمال خاصية فيثاغورس في المثلث  $TOS$  لحساب الطول  $TS$

3 حساب  $\sin \widehat{STO}$  ثم استنتج قياس الزاوية  $\widehat{STO}$ .

في المثلث  $OTS$  لدينا:  $\sin \widehat{STO} = \frac{OS}{TS}$  أي  $\sin \widehat{STO} = \frac{36}{45}$  ومنه  $\sin \widehat{STO} = 0.8$

وبالتالي:  $\widehat{STO} = \sin^{-1} 0.8 = 53.13^\circ$  ومنه قياس الزاوية  $\widehat{STO}$  هو  $53.13^\circ$ .

## التمرين الرابع (03 نقاط)

1 تعليم النقاط

2 حساب مركبي الشعاع  $\overrightarrow{AB}$  . استنتج الطول  $AB$


$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} \dots \dots \dots \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -3 - 0 \\ 1 - 4 \end{pmatrix} \dots \dots \dots \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

استنتج الطول  $AB$

$$AB = \sqrt{(-3)^2 + (-3)^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18}$$

3 انشاء النقطة  $D$  حيث  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$  (يطلب تعيين احداثيتها ببيانها).

احداثيات  $D$  هما  $0$  و  $-2$  أي  $D(0; -2)$



## الجزء الثاني، (08 نقاط)

### الوضعية الإدماجية، (08 نقاط) الجزء الأول

① مساعدة هشام حسابيا:

• التعبير عن  $P_1$  بدلالة  $x$ : الثمن المدفوع بالصيغة الأولى:  $P_1(x) = 50x$

• التعبير عن  $P_2$  بدلالة  $x$ : الثمن المدفوع بالصيغة الثانية:  $P_2(x) = 25x + 150$

**تكون الصيغة الأولى افضل من الصيغة الثانية اذا كان  $P_1(x) < P_2(x)$**

$$P_1(x) < P_2(x)$$

$$50x < 25x + 150$$

$$50x - 25x < 150$$

$$25x < 150$$

$$x < 6$$

و عليه تكون الصيغة الأولى افضل من الصيغة الثانية  
اذا كان عدد الحصص أصغر تماما من 6 حصص أي  
ان  $x < 6$ .

**تكون الصيغة الثانية افضل من الصيغة الأولى اذا كان  $P_1(x) > P_2(x)$**

$$P_1(x) > P_2(x)$$

$$50x > 25x + 150$$

$$50x - 25x > 150$$

$$25x > 150$$

$$x > 6$$

و عليه تكون الصيغة الثانية افضل من الصيغة الأولى  
اذا كان عدد الحصص أكبر تماما من 6 حصص أي ان  
 $x > 6$ .

**تكون الصيغتان متساويتين اذا كان  $P_1(x) = P_2(x)$**

$$P_1(x) = P_2(x)$$

$$50x = 25x + 150$$

$$50x - 25x = 150$$

$$25x = 150$$


$$x = 6$$

تكون الصيغة الأولى مساوية للصيغة الثانية اذا كان  
عدد الحصص يساوي 6 حصص أي ان  $x = 6$ .

### الجزء الثاني

\* مثل بيانيا الدالتين  $f$  و  $g$  بحيث:  $f(x) = 50x$  ،  $g(x) = 25x + 150$

( نأخذ 1 cm على محور الفواصل يمثل حصتين ، 1 cm على محور الترتيب يمثل 100 DA )



التفسير بقراءة بيانية متى تكون أي الصيغتين  
افضل (مساعدتك السابقة لهشام).

- تكون الصيغة الأولى افضل من الصيغة الثانية  
اذا كان عدد الحصص أصغر تماما من 6  
حصص أي ان  $x < 6$ .
- تكون الصيغة الأولى مساوية للصيغة الثانية  
اذا كان عدد الحصص يساوي 6 حصص أي ان  
 $x = 6$ .
- تكون الصيغة الثانية افضل من الصيغة الأولى  
اذا كان عدد الحصص أكبر تماما من 6  
حصص أي ان  $x > 6$ .



## شبكة التقويم للجزء الثاني

العلامة	التنقيط	المؤشرات	الشرح	المعيار	
03	0 1 2 3	0 نقطة لعدم وجود أي مؤشر. 01 نقطة لوجود مؤشرين أو ثلاث. 02 نقطة لوجود 4 إلى 6 مؤشرات. 03 نقطة لوجود أكثر من 6 مؤشرات.	- التعبير عن $P_1$ بدلالة $x$ . - التعبير عن $P_2$ بدلالة $x$ . - استعمال المتراجحة $P_1(x) < P_2(x)$ او $P_1(x) > P_2(x)$ او المعادلة $P_1(x) = P_2(x)$ للمقارنة بين الصيغتين. - التعبير عن المطلوب بمتراجحة او معادلة. - استخلاص الإجابة لغويا. - التمثيل البياني للدالة $f(x)$ . - التمثيل البياني للدالة $g(x)$ . - القراءة الصحيحة للبيان لتحديد متى تكون أي الصيغتين أفضل. - استخلاص الإجابة لغويا.	ترجمة الوضعية الى صيغة رياضياتية سليمة (اختيار المجاهيل المناسبة والعلاقات المناسبة بينها)	م 1 التفسير المليو للوضية
03	0 1 2 3	0 نقطة لعدم وجود أي مؤشر. 01 نقطة لوجود مؤشر أو مؤشرين. 02 نقطة لوجود 3 إلى 4 مؤشرات. 03 نقطة لوجود أكثر من 4 مؤشرات.	- حل المتراجحة $P_1(x) < P_2(x)$ او $P_1(x) > P_2(x)$ او المعادلة $P_1(x) = P_2(x)$ بشكل صحيح حتى و ان كانت عبارتي $P_1(x), P_2(x)$ خاطئتين - الحل الصحيح للمتراجحة او المعادلة حتى وان كانت غير مناسبة. - الترجمة السليمة لحل المتراجحة او المعادلة المنحصل عليها. - التمثيل الصحيح لبيان الدالة $f(x)$ . - التمثيل الصحيح لبيان الدالة $g(x)$ . - القراءة الصحيحة للبيان لتحديد متى تكون أي الصيغتين أفضل.	نتائج العمليات صحيحة حتى وان كانت هذه العمليات لا تناسب الحل	م 2 الاستعمال الصحيح للأدوات الرياضية
1	0 0.5 1	0 نقطة لعدم وجود أي مؤشر. 0.5 نقطة لوجود مؤشر واحد. 01 نقطة لوجود مؤشرين أو أكثر.	- التسلسل المنطقي - معقولة النتائج. - احترام وحدات القياس.	تسلسل منطقي للمراحل والنتائج معقولة والوحدات محترمة	م 3 انجام الإجابة
1	0 1	0 نقطة لوجود اقل من مؤشرين. 01 نقطة لوجود مؤشرين أو أكثر.	- عدم التشطيب - النتائج بارزة - مقرونية الكتابة	الورقة نظيفة ومنظمة ومكتوبة بخط واضح	م 4 تنظيم وتقديم الورقة